

Eta Invariants and Chern-Simons Invariants

京大 理学部 坪井 堅二

§0. Introduction

定義

- 1) $M: C^\infty$ -manifold, $g, g': M$ 上の Riemannian metrics
 $g \sim g':$ conformally related
 $\Leftrightarrow_{\text{def.}} \exists f: M \rightarrow \mathbb{R}_+: C^\infty$ s.t. $g' = f \cdot g$
- 2) $(M, g), (M', g'): \text{Riemannian manifolds}$
 $(M, g) \cong (M', g'): \text{conformally isomorphic}$
 $\Leftrightarrow_{\text{def.}} \exists \varphi: M \xrightarrow{\cong} M': C^\infty$ -diffeomorphism s.t. $g \sim \varphi^* g'$
- 3) $(M, g): \text{Riemannian manifold}$
 $g_0: \text{standard metric on } \mathbb{R}^N$
 $\varphi: M \rightarrow \mathbb{R}^N: \text{Conformal immersion}$
 $\Leftrightarrow_{\text{def.}} \varphi: C^\infty$ -immersion $\exists \lambda > 0$ $g \sim \varphi^* g_0$

“conformal” は “isometric” よりも当然 弱い条件である。ただし $\text{isometric} \Rightarrow \text{conformally isomorphic}$,

conformal に immerse できない \Rightarrow isometric に immerse できない etc..

Example

$$S^n - \{\text{one point}\} \cong \mathbb{R}^n$$

これは、よく知られており、stereographic projection による。

$M = (M, g)$: Riemannian manifold が ある codimension の Euclid 空間に \hookrightarrow isometric (又は conformal) に immerse できるかという問題を考える。一般に“十分大きい”codimension となる isometric に immerse できる (従って conformal にも immerse できる) ということはわかるが、“あまり大きくない”codimension では、isometric に immerse できるかどうかは、入ることも入らないこともわからない場合が多い。Chern, Simons は [3], [9] において、Chern-Simons invariant 又は S -character と呼ばれる conformal invariant を定義して、それを用いて M が ある codimension の Euclid 空間に conformal に immerse できるための必要条件 (従って isometric に immerse できるための必要条件でもある) を与えた。Chern-Simons invariant は正定曲率の standard metric を与えた Lens space に対して、


計算されている (Millson [7]) 他、bi-invariant metric を与えた globally symmetric space に対する Donnelly [4] の結果があるが、一般には具体的に計算することは困難な場合が多い。一方 Atiyah, Patodi, Singer は [1] において、closed oriented $4k-1$ -dimensional Riemannian manifold M に対して、その Eta invariant と呼ばれる実数を定義した。Eta invariant は manifold の種類、metric の種類という両面において、Chern-Simons invariant よりも広い計算の可能性をもっている。そこで、Chern-Simons invariant と Eta invariant とを結びつけることにより、closed oriented $4k-1$ -dimensional Riemannian manifold M がある codimension の Euclid 空間に conformal に immerse できるための必要条件を Eta invariant によって表現し、それを用いて新しい "nonvanishing Chern-Simons invariant" の例をつくることがここにおける話題である。

§1. Chern-Simons invariant

以下 $M = (M, g)$: closed oriented $4k-1$ -dimensional Riemannian manifold とする。 $\dim M \not\equiv 0 \pmod{4}$ であるから、よく知られているように、 M は $2M = M \cup M$ は oriented cobordism の意味において、zero-cobordant

である。そこで以下簡単のため、 M : zero-cobordant とする。 M : not zero-cobordant の場合は M の代りに $2M$ をとることにより、以下の議論は全く同様に成り立つ。

W : compact oriented $4k$ -dimensional manifold with boundary M とする。 W には $\partial W = M$ の適当な collar neighborhood $M \times [0, 1]$ で M の metric g と $[0, 1]$ の standard metric dt^2 の product $g + dt^2$ に存在するような metric \hat{g} を任意にひとつとる。(partition of unity により、上のような \hat{g} をつくることは可能である。)



P_i : i -th Pontrjagin polynomial

$Q = Q(a_1, \dots, a_k)$: \mathbb{Z} -coefficient polynomial of weight k (i.e. $Q(a_1^4, a_2^8, \dots, a_k^{4k})$: homogeneous of degree $4k$) とする。このとき、

$Q(P(\hat{g})) = Q(P_1(\hat{g}), \dots, P_k(\hat{g}))$: $4k$ -form on W

定義

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z} \ni SQ(P_1, \dots, P_k)(M, g) \stackrel{\text{def}}{=} \int_W Q(P(\hat{g}))$$

(\equiv は mod \mathbb{Z} reduction)


これを $Q(P_1, \dots, P_k)$ に対する (M, g) の Chern-Simons invariant と呼ぶ。

claim 1


$SQ(P_1, \dots, P_k)(M, g)$ は W , W における M の collar neighborhood のとき, collar neighborhood における product metric の W への拡張 \hat{g} のとき $depend$ せず, (M, g) によって決まる。

(proof)

(W', \hat{g}') : another pair とする。



$N \equiv W \cup_M (-W')$: closed oriented $4k$ -dimensional manifold とするとき, \hat{g}, \hat{g}' に対する境界条件より, \hat{g}, \hat{g}' をつなぐことにより N 上の smooth な Riemannian metric $\hat{g} \cup \hat{g}'$ が定義される。



このとき,

$$\begin{aligned} & \int_W Q(P(\hat{g})) - \int_{W'} Q(P(\hat{g}')) \\ &= \int_N Q(P(\hat{g} \cup \hat{g}')) : N \text{ の Pontryagin } Q\text{-number} \\ & \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

$$\text{従って, } \overline{\int_W Q(P(\hat{g}))} = \overline{\int_{W'} Q(P(\hat{g}'))}$$

Q. E. D.

claim 2

$SQ(P_1, \dots, P_k)(M, g) \neq (M, g)$ の conformal structure
 のみに depend する。すなわち、 g, g' が M 上の conformally
 related な metrics とするときは、 $SQ(P_1, \dots, P_k)(M, g)$
 $= SQ(P_1, \dots, P_k)(M, g')$ である。

(proof)


$f: M \rightarrow \mathbb{R}_+ : C^\infty$ s.t. $g' = f \cdot g$ とする。

1st. step

$M \times [0, 4]$ の metric \tilde{g} を次のように定める。

$M \times [0, 4] \ni \forall (x, t) \mapsto \tilde{g}(x, t)$

$$\tilde{g}(x, t) \stackrel{\text{def}}{=} \{ \phi(t) + (1 - \phi(t)) f(x) \} (g(x) + dt^2)$$

(ただし、 $\phi: [0, 4] \rightarrow [0, 1] : C^\infty$ 

すなわち、 $\tilde{g} \sim g + dt^2$: conformally related である。

Pontryagin forms は conformal invariant である (c.f.

[3]) 参照。

$$\begin{aligned} & \int_{M \times [0, 4]} Q(P_1(\tilde{g}), \dots, P_k(\tilde{g})) \\ &= \int_{M \times [0, 4]} Q(P_1(g + dt^2), \dots, P_k(g + dt^2)) \end{aligned}$$

(\because $q: M \times [0, 4] \rightarrow M$: projection とし、

$P_i(g + dt^2) = q^* P_i(g)$ であるから、

$Q(P(g + dt^2)) = q^* Q(P(g)) = 0$ ($\because \deg Q(P(g)) > \dim M$))

= 0

2nd. Step

$M \times [0, 4]$ の metric \tilde{g} を次のように定義する。

$M \times [0, 4] \ni \forall (x, t)$ に対して。

$$\tilde{g}(x, t) \stackrel{\text{def.}}{=} f(x)g(x) + \{(1-\phi(t)) + \phi(t)f(x)\} dt^2$$

このとき、 $\forall i$ に対して $P_i(\tilde{g})$ は dt を含まない。

$$\text{従って} \int_{M \times [0, 4]} Q(P(\tilde{g})) = 0$$

⊙ $4k = n$, $(1-\phi(t)) + \phi(t)f(x) = \gamma(x, t) (> 0)$ と置く。

$M \supset U$, $X_1, \dots, X_{n-1} : U$ 上の $g = f \cdot g$ に関する orthonormal vector fields, $X_n = \frac{1}{\sqrt{\gamma(x, t)}} \frac{\partial}{\partial t}$ とする。このとき、

$\{X_1, \dots, X_{n-1}, X_n\}$ は \tilde{g} に関する $U \times [0, 4]$ 上の orthonormal vector fields である。この local basis に関して。

$\tau : U \times [0, 4] \longrightarrow O(M \times [0, 4])$ を $M \times [0, 4]$ の orthonormal frame bundle $O(M \times [0, 4])$ への local section とする。このとき、 $\{X_1^*, \dots, X_n^*\} : \text{dual 1-forms of } \{X_1, \dots, X_n\}$ とし、 $\tau^* \Omega_{ij} = \sum_{k < l} R_{ijkl} X_k^* \wedge X_l^*$ であった。
 (こゝで、 $\Omega = (\Omega_{ij}) : \tilde{g}$ に対する curvature form
 $R_{ijkl} : \text{curvature tensor の成分}$)

Lemma

$$1 \leq i, j, k \leq n-1 \quad \text{のとき} \quad R_{ijkn} = 0$$

(proof of Lemma)

$$(*) \quad 1 \leq i \leq n-1 \Rightarrow \nabla_{X_i} X_n = 0$$

$$① \quad X_i = \sum_{m=1}^{n-1} \xi_i^m(x) \frac{\partial}{\partial x^m} \quad (x_1, \dots, x_{n-1}: U \cap \Sigma \text{ の local coordinate})$$

とする。 \langle, \rangle は $\tilde{\Sigma}$ による内積として。

$$\begin{aligned} \langle \nabla_{X_i} X_n, X_k \rangle &= \frac{1}{2} \{ X_i \langle X_n, X_k \rangle + X_n \langle X_i, X_k \rangle - X_k \langle X_i, X_n \rangle \\ &+ \langle [X_i, X_n], X_k \rangle + \langle [X_k, X_i], X_n \rangle + \langle [X_k, X_n], X_i \rangle \} \end{aligned}$$

case 1 $1 \leq k \leq n-1$ の場合

$$\langle \nabla_{X_i} X_n, X_k \rangle = \frac{1}{2} \{ \langle [X_i, X_n], X_k \rangle + \langle [X_k, X_n], X_i \rangle \}$$

$$(\because \because [X_i, X_n] = \left\{ \sum_{m=1}^{n-1} \xi_i^m(x) \frac{\partial}{\partial x^m} \left(\frac{1}{\sqrt{f(x,x)}} \right) \right\} \frac{\partial}{\partial x^k} \text{ であるから})$$

$$= 0$$

case 2

$$\langle \nabla_{X_i} X_n, X_n \rangle = -\langle X_n, \nabla_{X_i} X_n \rangle \quad (\text{従って}) = 0$$

以上で (*) が示された。

$$R_{ijkn} = -R_{ijnk} = -\langle \nabla_{X_i} \nabla_{X_j} X_n - \nabla_{X_j} \nabla_{X_i} X_n - \nabla_{[X_i, X_j]} X_n, X_k \rangle = 0 \quad \text{Lemma Q.E.D.}$$

Lemma による。次の 2つがわかる。($\tau^* \Omega \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ と

書くことにする)

$$(i) \quad 1 \leq i, j \leq n-1 \Rightarrow \Omega_{ij} \text{ は } dt \text{ を含まない。}$$

$$(ii) \quad \Omega_{in} = \sum_{k=1}^{n-1} R_{inkn} X_k^* \wedge X_n^* = \left(\sum_{k=1}^{n-1} R_{inkn} X_k^* \right) \wedge X_n^*$$

$$\text{従って } \Omega_{in} \wedge \Omega_{jn} = 0 \quad \text{for } 1 \leq i, j \leq n$$

$$\begin{aligned} \text{すなわち } (\mathbb{Z}\pi)^i P_i(\tilde{\Sigma}) &= \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_{2i} \leq n} \sum_{\tau \in \mathcal{S}(2i)} \text{sgn}(\tau) \Omega_{j_1 j_{\tau(1)}} \wedge \dots \\ &\wedge \Omega_{j_{2i} j_{\tau(2i)}} = (\text{dt を含まない項}) + \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_{2i-1} \leq n-1} \sum_{\tau \in \mathcal{S}(2i)} \text{sgn}(\tau) \end{aligned}$$

Key Theorem

M^n codimension d で \mathbb{R}^{4k-1+d} に conformal に
immerse できる。 $\Rightarrow SQ(P_1^\perp, \dots, P_k^\perp)(M, g) = 0$
for $\forall s \geq \lfloor \frac{d}{2} \rfloor + 1$ & $\forall Q: \mathbb{Z}$ -coeff. poly. of weight k

Key Theorem の一番強い形として $s=k$ とおいて
次の corollary が出る。

Corollary

M^n codimension $2k-1$ で \mathbb{R}^{6k-2} に conformal に
immerse できる。 $\Rightarrow SP_k^\perp(M, g) = 0$

§2. Eta invariant定義

L_k : Hirzebruch L -polynomial の weight k term
 $\text{Sign}(W)$: cup product によって定義される symmetric
bilinear form $H^{2k}(W, \mathcal{O}W; \mathbb{R}) \otimes H^{2k}(W, \mathcal{O}W; \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ の
signature とする。

$\mathbb{R} \ni \eta(M) (= \eta(M, g)) \stackrel{\text{def.}}{=} \int_M L_k(P_1(\hat{g}), \dots, P_k(\hat{g})) - \text{Sign}(W)$
を $\forall g, (M, g)$ の Eta invariant と呼ぶ。

claim

$\eta(M)$ は (M, g) の conformal structure のみで決まる。

(proof)

記号は §1. claim 1 の (proof) と同じとする。

 (W', \hat{g}') : another pair とする。 $N = (W \cup_M (-W'), \hat{g} \cup \hat{g}')$: closed oriented $4k$ -dimensional
である。 Hirzebruch Signature Theorem による。

$$\int_N L_k(P(\hat{g} \cup \hat{g}')) = \text{sign}(N)$$

$$\text{一方 } \int_N L_k(P(\hat{g} \cup \hat{g}')) = \int_W L_k(P(\hat{g})) - \int_{W'} L_k(P(\hat{g}'))$$

$$\text{sign}(N) = \text{sign}(W) - \text{sign}(W') \quad \text{である。}$$

$$\int_W L_k(P(\hat{g})) - \text{sign}(W) = \int_{W'} L_k(P(\hat{g}')) - \text{sign}(W')$$

conformal structure の \hat{g} で決まることは §1. claim 2
と同様にして示せる。 Q. E. D.

この定義のままでは、Eta invariant は $\text{sign}(W)$
という項が分た"け、 χ による Chern-Simons
invariant よりも計算が困難になってしまう。しかし、
ここで、Atiyah, Patodi, Singer [1] による次の結果がある。

Theorem $\Gamma = C^\infty(M, \bigoplus \Lambda^{2p} T^*M)$: even forms on M $D: \Gamma \rightarrow \Gamma$: first order self-adjoint elliptic
differential operator defined by

$$D\phi = (-1)^{k+p+1} (*d - d*)\phi \quad \text{for } 2p\text{-form } \phi$$

(こゝに $*$: Hodge's star operator)

λ : eigenvalue of D with finite multiplicity $m(\lambda)$
 とする。 $\forall s \in \mathbb{C}$ に対して $\zeta(s) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{\lambda \neq 0} \text{sign}(\lambda) \cdot m(\lambda) |\lambda|^{-s}$
 ($\text{sign}(\lambda) = 1$ if $\lambda > 0$, -1 if $\lambda < 0$) とおくと、
 $\text{Re}(s)$ が十分大なるとき $\zeta(s)$ は絶対収束して、
 holomorphic function を表わす。 さらに $\zeta(s)$ は meromorphic
 function として全平面に解析接続され $0 \in \text{pole}$ にわたる。
 このとき $\zeta(M, g) = \zeta(0)$ が成り立つ。

上の Theorem により $\zeta(M)$ には Chern-Simons invariant
 による計算の可能性が開ける。 例えば、 M が
 orientation-reversing isometry を持つ Riemannian
 manifold を有限群の free action で割った形をしている
 場合には $\zeta(M)$ は Atiyah, Singer の η -signature
 formula により計算されることを [5] で示された。

Example

$P \geq 1$, q_1, \dots, q_{2k} : relatively prime to P として
 $M = L(P; q_1, \dots, q_{2k}) = S^{4k-1}/\sim$: Lens space
 $(\mathbb{C}^{2k} \cap S^{4k-1}) \ni (z_1, \dots, z_{2k}) \sim (e^{\frac{2\pi i j q_1}{P}} z_1, \dots, e^{\frac{2\pi i j q_{2k}}{P}} z_{2k})$
 とする。 M の metric g は次の条件を満たす限り任意で
 よいとする。(正定曲率の standard metric ならば
 S^{4k-1} の standard metric が induce された metric

は条件を \mathbb{R}^{3k-1} に $\mathbb{Z}/2$ (2113.)

(*) $\gamma: S^{4k-1} \rightarrow M$: covering projection $\tau(2)$.

(S^{4k-1}, γ^*g) は orientation-reversing isometry $\varepsilon \in \mathbb{Z}$.

このとき.

$$(**) \eta(M) = \frac{(-1)^k}{P} \sum_{s=1}^{P-1} \prod_{j=1}^{2k} \cot \frac{s q_j \pi}{P}$$

とある. (c.f. [10] §1)

§3. Eta invariants and Chern-Simons invariants

定義

$$N_k \stackrel{\text{def}}{=} \min \{ n \in \mathbb{N} \mid n \cdot L_k : \mathbb{Z}\text{-coeff. poly.} \}$$

$$= \prod_{\substack{p: \text{prime}, \\ 3 \leq p \leq 2k+1}} p^{\lfloor \frac{2k}{p-1} \rfloor}$$

$$(N_1=3, N_2=45 \text{ etc})$$

$$(1+P_1+\dots+P_i+\dots)(1+P_1^\perp+\dots+P_i^\perp+\dots)=1$$

$$\Rightarrow P_i = -P_i^\perp - P_{i-1}^\perp P_i - \dots - P_1^\perp P_{i-1}$$

で表す. induction による. $\exists Q_k: \mathbb{Z}\text{-coeff. poly.}$
of weight k s.t. $N_k \cdot L_k(P_1, \dots, P_k) = Q_k(P_1^\perp, \dots, P_k^\perp)$

このとき.

$$\begin{aligned} \overline{NQ_k(P_1^\perp, \dots, P_k^\perp)}(M, g) &= \overline{\int_W Q_k(P_1^\perp(\hat{g}), \dots, P_k^\perp(\hat{g}))} \\ &= \overline{N_k \int_W L_k(P_1(\hat{g}), \dots, P_k(\hat{g}))} \\ &= \overline{N_k \{ \int_W L_k(P(\hat{g})) - \text{sign}(W) \}} = \overline{N_k \cdot \eta(M)} \end{aligned}$$

従って Key Theorem に依り、次の結果が出る。

Proposition

M が n codimension l で \mathbb{R}^{4k} に conformal に immerse できる $\Rightarrow \overline{N_k \cdot \eta(M)} = 0$ i.e. $N_k \cdot \eta(M) \in \mathbb{Z}$

(\times) l codimension l には あまり おも(3)くないので、
 $\epsilon > 0$ codimension $\in \mathbb{Z}$ とする ことを考える。

$$Q_k(P_1^\perp, \dots, P_k^\perp) = n_k P_k^\perp + (\text{decomposable part of } P_1^\perp, \dots, P_{k-1}^\perp) \quad (\exists n_k \in \mathbb{Z})$$

$$\left(P_i^\perp = -P_i - P_{i-1} P_1^\perp - \dots - P_1 P_{i-1}^\perp \text{ であるから } \right)$$

(induction に依り)

$$= n_k P_k^\perp + \underbrace{(\text{decomposable part of } P_1, \dots, P_{k-1})}_{\otimes}$$

$$\text{よって } \overline{N_k \cdot \eta(M)} = \int Q_k(P_1^\perp, \dots, P_k^\perp)(M, g)$$

$$= n_k \cdot \int P_k^\perp(M, g) + \int (\otimes)(M, g)$$

定義

(M, g) : partially Pontrjagin flat

$\Leftrightarrow R(P_1(\Omega), \dots, P_l(\Omega)) = 0$ as differential

$4l$ -form on M for $\forall R$: monomial of weight

$l \geq \lfloor \frac{4l+1}{2} \rfloor$ (= ∞ , $P_i(\Omega)$: M の metric g に \times した

M 上の i -th Pontrjagin form)

Lemma (c.f. [10] §3)

(M, g) : partially Pontrjagin flat $\tau \neq \emptyset$.

(i) $\pi: O(M) \rightarrow M$: orthonormal frame bundle $\tau \neq \emptyset$.

$\pi^*: H^{4k-1}(M; \mathbb{R}/\mathbb{Z}) \rightarrow H^{4k-1}(O(M); \mathbb{R}/\mathbb{Z})$: injective

$$\Rightarrow \mathcal{S}(\otimes)(M, g) = 0$$

(ii) $H^{4i}(M; \mathbb{Z}) \ni P_i(TM)$: i -th Pontrjagin class of TM $\tau \neq \emptyset$. $\exists c \in \mathbb{N}$ s.t. $c P_i(TM) = 0$ for $1 \leq i \leq [\frac{k}{2}]$

$$\Rightarrow c \cdot \mathcal{S}(\otimes)(M, g) = 0$$

Remarks

1) (M, g) : conformally flat i.e. flat \neq Euclid 空間 τ local に conformally isomorphic

$\Rightarrow P_i(\Omega) = 0$ for $\forall i \geq 1 \Rightarrow (M, g)$: partially Pontrjagin

flat

2) M : parallelizable $\Rightarrow \pi^*: H^q(M; A) \rightarrow H^q(O(M); A)$

: injective for $\forall q$, $\forall A$: abelian group

3) M : stably parallelizable $\Rightarrow P_i(TM) = 0$ for $\forall i \geq 1$

key Theorem の Corollary 及び 上の Lemma による.

以下の結果が導出される。

Theorem 1

(M, g) : partially Pontrjagin flat $\tau \neq \emptyset$

$\pi^* : H^{4k-1}(M; \mathbb{R}/\mathbb{Z}) \rightarrow H^{4k-1}(O(M); \mathbb{R}/\mathbb{Z}) : \text{injective}$

と仮定する。このとき、

M が codimension $2k-1$ で \mathbb{R}^{6k-2} に conformal に immerse できる。

$$\Rightarrow \begin{cases} N_k \cdot \eta(M) \in \mathbb{Z} & \text{if } M : \text{zero-cobordant} \\ 2N_k \cdot \eta(M) \in \mathbb{Z} & \text{if } M : \text{not zero-cobordant} \end{cases}$$

特に $k=1$ ならば $\dim M=3$ の場合を考える。

よく知られたように、 M^3 は zero-cobordant, parallelizable で Theorem 1 の仮定を満たす。 $N_1=3$ である。

Corollary

3-dimensional closed oriented Riemannian manifold M が \mathbb{R}^4 に conformal に immerse できる。

$$\Rightarrow 3 \cdot \eta(M) \in \mathbb{Z}$$

一方, Hirsh - Smale theory によらず M は smooth には必ず \mathbb{R}^4 に immerse できる。

Theorem 2

M : partially Pontryagin flat かつ $\exists C \in \mathbb{N}$
 s.t. $C \cdot p_i(TM) = 0$ for $1 \leq i \leq [\frac{k}{2}]$ と仮定する。

このとき.

M が \mathbb{R}^{6k-2} に conformal に immerse できる。

$$\Rightarrow \begin{cases} \langle N_k \chi(M) \rangle \in \mathbb{Z} & \text{if } M: \text{zero-cobordant} \\ 2 \langle N_k \chi(M) \rangle \in \mathbb{Z} & \text{if } M: \text{not zero-cobordant} \end{cases}$$

(注 k : even のときは. M : not zero-cobordant である) $\langle N_k \chi(M) \rangle \in \mathbb{Z}$ であることがいえる。

§4. Examples

Example 1

3次元正定曲率空間は完全に分類されており、 S^3 を巡回群、たいてい意味での複多面体群 または S^1 の直積で割ったものしかない。 S^3 を巡回群で割ったものすなわち、

lens space については Millson が [7] において、その Chern-Simons invariant を調べているので、ここでは、複多面体群で割ったものについて調べてみる。 metric も正定曲率の standard metric を含む、もう少し一般的な metric を考えることにする。

$S^3 =$ Lie group of length one quaternions

$$\alpha: S^3 \cong SU(2)$$

$$z_1 + z_2 j \mapsto \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\bar{z}_2 & \bar{z}_1 \end{pmatrix} \quad (z_1, z_2 \in \mathbb{C}, |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1)$$

$S^3 \supset G$: finite subgroup G of S^3 right

multiplication により作用するものとす。

商空間 S^3/G には次の条件を満たす metric g を任意に与え得る。 S^3 の standard metric α が induce される 正定曲率の metric なる $\theta \in \mathfrak{g}$ に対してこの条件を満たす。

$\gamma: S^3 \rightarrow S^3/G$: covering projection として

(S^3, γ^*g) は orientation-reversing isometry $\theta \in \mathfrak{g}$

$\mathfrak{g} \ni h \neq 0$ に対し $e^{\theta(h)}, e^{-\theta(h)}$: eigenvalues of $\alpha(h)$

とすれば、 $(S^3/G, g)$ の Eta invariant は次の式で計算される。

$$\textcircled{*} \eta(S^3/G) = \frac{1}{|G|} \sum_{h \neq 1} \cot^2\left(\frac{\theta(h)}{2}\right) \quad (|G|: \text{order of } G)$$

G として次の3つを考える。(cf. 中国[8])

$$O^* = \left\{ \text{generated by } P=i, Q=j, B=-\frac{1+i+j+k}{2}, R=\frac{i-k}{\sqrt{2}} \right\}$$

$$\cong \text{複素8面体群} \quad (|O^*| = 48)$$

$$T^* = \left\{ \text{subgroup of } O^* \text{ generated by } P, Q, B \right\}$$

$$\cong \text{複素4面体群} \quad (|T^*| = 24)$$

$$I^* = \left\{ \text{generated by } U = \frac{\sqrt{5}-1}{4} + \frac{1}{2}i + \frac{\sqrt{5}+1}{4}j, V = -i \right\}$$

$$\cong \text{複素20面体群} \quad (|I^*| = 120)$$

このとき、 $\textcircled{*}$ により $\eta(S^3/T^*), \eta(S^3/O^*), \eta(S^3/I^*)$ を計算本幾で求めることができる。

$$\eta(S^3/T^*) = 1.36111 \dots, \quad \eta(S^3/O^*) = 1.68055 \dots$$

$$, \quad \eta(S^3/I^*) = 2.00555 \dots$$

従って Theorem 1 の Corollary によらず S^3/T^* , S^3/O^* , S^3/I^* は いずれも \mathbb{R}^4 に conformal に immerse できない。

Example 2

$$L^{15} = L(137; 1, 10, 100, 41, 136, 127, 37, 96)$$

: 15-dimensional Lens space とおく。

これは Millson が [7] にあつて、正定曲率の standard metric を与えた Lens space の Chern-Simons invariant を調べたときに用いた Example である。ここでは、

L^{15} の metric g は次の条件をみたす限り任意である。(standard metric は明らかにこの条件をみたす)

(i) $\gamma: S^{15} \rightarrow L^{15}$: covering projection とし、

(S^{15}, τ^*g) : orientation-reversing isometry をもつ

(ii) g : partially Pontrjagin flat

このとき、 $\eta(L^{15})$ は §2 の一番最後の formula で計算できる。一方 Ewing, Moolgavkar, Smith, Stong [6] の

結果によらず L^{15} : stably parallelizable とおける。従って

$\eta_i(TL^{15}) = 0$ for $\forall i \geq 1$ として Theorem 2 として $C=1$ とおける。

$N_4 = 14175$ であるから、 $2CN_4 \eta(L^{15}) \bmod \mathbb{Z} = 0.8759 \dots$

従って L^{15} は codimension 7 で \mathbb{R}^{22} に conformal に

immerse できない。一方 L^{15} は stably parallelizable であるから、

Hirsh-Smale theory によらず \mathbb{R}^{16} に smooth に immerse できる。

References

- [1] M. F. Atiyah, V. K. Patodi and I. M. Singer,
Spectral asymmetry and Riemannian geometry I,
Math. Proc. Cambridge Philos. Soc. 77(1975), 43-69.
- [2] M. F. Atiyah and I. M. Singer,
The index of elliptic operators III,
Ann. of Math. 87(1968), 546-604.
- [3] S. S. Chern and J. Simons,
Characteristic forms and geometric invariants,
Ann. of Math. 99(1974), 48-69.
- [4] H. Donnelly, Chern-Simons invariants of
reductive homogeneous spaces,
Trans. Amer. Math. Soc. Vol. 227(1977), 141-164.
- [5] H. Donnelly, Eta invariants for G -spaces,
Indiana Univ. Math. J. 27(1978), 889-918.
- [6] J. Ewing, S. Moolgavkar, L. Smith and R. E. Stong,
Stable parallelizability of Lens spaces,
J. Pure Appl. Algebra 10(1977), 177-191.
- [7] J. J. Millson, Examples of nonvanishing Chern-Simons invariants,
J. Differential Geometry 10(1974), 589-600.

- [8] 中岡稔, 不動点定理とその周辺, 岩波書店 (1977)
- [9] J. Simons, Characters associated to a connection, preprint
- [10] K. Tsuboi, Eta invariants and conformal immersions, preprint