

可解リーベルの単項表現について

九大・理 藤原英徳

ここでは主として exponential group の単項表現に関し、琉球大学理学部の山上 滋氏と筆者が最近興味を抱いている問題を取り上げ、例を挙げながら解説してみたい。

§ 1. Preliminaries

リーベル G (常に σ -compact 仮定) の Hilbert 空間 \mathcal{H}_π (separable 仮定) への unitary 表現 π に対し、 C^∞ -vector の空間を \mathcal{H}^∞ 、その antidual space を $\mathcal{H}_\pi^{-\infty}$ で表わし $\mathcal{H}_\pi^{-\infty}$ の要素を π の generalized vector と呼ぶことにしよう。 G の作用は、duality により $\mathcal{H}_\pi^{-\infty}$ に拡張されるが、 G の閉部分群 H とその指標 $c : H \rightarrow \mathbb{C}^*$ に対し、

$$(\mathcal{H}_\pi^{-\infty})^{H, c} = \{ a \in \mathcal{H}_\pi^{-\infty} ; \pi(h)a = c(h)a \text{ for } \forall h \in H \}$$

とおく。又 $\langle a, b \rangle$ ($a \in \mathcal{H}_\pi^{\pm\infty}$, $b \in \mathcal{H}_\pi^{\mp\infty}$) で a の b における値を表わす。

今 G 及び H の module をそれぞれ Δ_G , Δ_H で表わし、 H 上

$$(\mathcal{H}_\pi^{-\infty})^{H, c} = \mathcal{H}_\pi^{-\infty}$$

$$G/H \xrightarrow{F} \mathbb{C}$$

$\Delta_{G/H} = \Delta_H / \Delta_G$ とおく。G 上関数等式 $F(gh) = \Delta_{G/H}(h)F(g)$ ($g \in G, h \in H$) をみたし、mod H で compact support をもつ \mathbb{C} -valued continuous function F のなす空間上には G-invariant positive linear form $\nu_{G/H}$ が scalar 倍を除いて unique に存在する。記法

$$\nu_{G/H}(F) = \int_{G/H} F(g) d\nu_{G/H}(g)$$

を用いよう。 $G/H \xrightarrow{\downarrow \chi} \mathcal{H} = \Gamma(G/H, L_X)$

H の unitary character χ から誘導された G の unitary 表現、いわゆる 単項表現 $\tau = \text{ind}_H^G \chi$ に関し、特別な generalized vector

$$a_\tau \in \mathcal{H}_\tau^{-\infty} : a_\tau : \mathcal{H}_\tau^\infty \ni \Phi \mapsto \overline{\Phi(e)} \in \mathbb{C} \quad (e: G の 単位元)$$

$$a_\tau = \int$$

を考えると、 $\mathcal{H}_\tau^\infty \subset C^\infty(G)$ より a_τ は意味を持ち

$$a_\tau \in (\mathcal{H}_\tau^{-\infty})^H, \chi \Delta_{G/H}^{1/2} \quad \begin{aligned} a_\tau \pi(h) a_\tau &= \chi(h) \cdot \Delta_{G/H}(h) a_\tau \\ \langle a_\tau, \pi(h) \bar{a}_\tau \rangle &= \chi(h) \Delta_{G/H}(h) \langle a_\tau, \bar{a}_\tau \rangle \end{aligned}$$

G を I 型としよう。 τ の canonical central decomposition に応じて generalized vector a_τ も分解される。これが τ に対する Penney の Plancherel theorem である。

さて $G = \exp G$ をリー環 \mathfrak{g} をもつ exponential group、即ち exponential map $\exp: \mathfrak{g} \rightarrow G$ が diffeomorphism なるもの、 \mathfrak{g}^* を \mathfrak{g} の dual vector space とする。 $f \in \mathfrak{g}^*$ に対し $B^f(X, Y) = f([X, Y])$ なる \mathfrak{g} 上の antisymmetric bilinear form を考え、その radical を $\mathfrak{g}(f) = \{X \in \mathfrak{g}; B^f(X, Y) = 0 \text{ for } \forall Y \in \mathfrak{g}\}$ で表す。G は \mathfrak{g}^* に coadjoint action で作用するが、 $\mathfrak{g}(f)$ はこの作用に関する f の stabilizer $G(f)$ のリー環に他ならない。 $S(f, g) = \{h \in \mathfrak{g}; \text{部分リー環}, B^f | h \times h = 0\}$ とおく。

我々の興味の対象は $h \in S(f, g)$ から出発し、対応する analytic

$$S(f, g) = \left\{ h \in \mathfrak{g} \mid f([h, h]) = 0 \right\}$$

$$\begin{array}{ccccc}
 G > H & \xrightarrow{\chi_f} & S^1 & \Rightarrow & L_{X_f} \\
 \text{射影} \uparrow & & \uparrow e & & \downarrow \\
 \text{射影} \uparrow & & \xrightarrow{\pi_f} & & \\
 \text{射影} \uparrow & & \mathbb{R} & &
 \end{array}$$

subgroup $H = \exp h$ の unitary character χ_f , $\chi_f(\exp X) = e^{\sqrt{-1}f(X)}$ ($X \in h$)、を用いて構成された誘導表現 $\tau(f, h) = \text{ind}_H^G \chi_f$ である。この時 exponential group $G = \exp g$ の任意の既約 unitary 表現は単項表現に、i.e. 適当な $f \in g^*$, $h \in S(f, g)$ を用いて構成された上記 $\tau(f, h)$ に同値である事が知られている。

そこで $\tau(f, h)$ がいつ既約になるかを調べると、その判定条件としていわゆる Pukanszky condition を得る：

$$\tau(f, h) \text{ が既約} \Leftrightarrow h \in I(f, g) \equiv \{h \in M(f, g); H.f = f + h^\perp\}$$

ここに $M(f, g) = \{h \in S(f, g); 2 \dim h = \dim g + \dim g(f)\}$ 、
 $h^\perp = \{l \in g^*; l \mid h = 0\}$ 。一般に $f \in g^*$ に対し、

$$\phi \neq I(f, g) \subsetneq M(f, g) \subsetneq S(f, g).$$

$$\begin{array}{c}
 S(f, g) \\
 \cup \\
 M(f, g) \\
 \cup \\
 I(f, g)
 \end{array}$$

次に $h_1, h_2 \in I(f, g)$ とすると $\tau(f, h_1) \cong \tau(f, h_2)$ (unitary equivalent) が示され、 $g^* \ni f \mapsto \theta(f) = \tau(f, h) \in G^\wedge$ なる surjection が $h \in I(f, g)$ を媒介にして定義される。但し G^\wedge は G の unitary dual, i.e. G の既約 unitary 表現の同値類の集合を表し、その要素はしばしば代表元と同一視される。

更に $f_1, f_2 \in g^*$ とすると

$$\theta(f_1) = \theta(f_2) \Leftrightarrow G.f_1 = G.f_2$$

が示され、 θ は quotient に移って G の coadjoint action による orbit space g^*/G から G^\wedge 上への bijection $\overline{\theta}$ を与える。 $\pi \in G^\wedge$ に対応する orbit $\overline{\theta}^{-1}(\pi)$ を $\Omega(\pi)$ とも書こう。

ここで分解定理を2つ与えておく。 $G = \exp g$: exponential group, $f \in g$, $h \in M(f, g)$ とし $H = \exp h$ の unitary character χ_f から $\tau(f, h)$ を構成する。affine space $f + h^\perp$ とその開集合で交わ

る G の coadjoint orbit の集合を $U(f, \mathfrak{h})$ で表し、 $\Omega \in U(f, \mathfrak{h})$ に対し $(f + \mathfrak{h}^\perp) \cap \Omega$ に含まれる H -orbit の数を $m(f, \mathfrak{h}, \Omega)$ とおく。

定理1 (M.Vergne[10]) . $U(f, \mathfrak{h})$ は有限集合で、 $\forall \Omega \in U(f, \mathfrak{h})$ に対し $m(f, \mathfrak{h}, \Omega) < +\infty$ となり

$$\tau(f, \mathfrak{h}) \simeq \sum_{\Omega \in U(f, \mathfrak{h})} m(f, \mathfrak{h}, \Omega) \bar{\theta}(\Omega).$$

次により一般の $\mathfrak{h} \in S(f, \mathfrak{g})$ から構成された単項表現 $\tau(f, \mathfrak{h})$ の canonical central decomposition

$$\tau(f, f) \simeq \int_{\widehat{\mathfrak{g}}}^{\oplus} m(\pi) \pi d\nu(\pi)$$

を考えよう。

定理2 (L.Corwin, F.P.Greenleaf and G.Grelaud[3]). \mathfrak{g} が巾零の時、測度 ν の class は affine space $f + \mathfrak{h}^\perp$ 上の Lebesgue measure class の Kirillov map θ による image であり、他方 multiplicity $m(\pi)$ は $(f + \mathfrak{h}^\perp) \cap \theta^{-1}(\pi)$ に含まれる H -orbit の数である。

§ 2. Questions

ここに幾つかの問題を挙げてみよう。断わらない限り $G = \exp \mathfrak{g}$ はリ一環 \mathfrak{g} を持つ exponential group とする。

問1 (cf.[4]) . $f \in \mathfrak{g}^*$ 、 $\mathfrak{h}_j \in I(f, \mathfrak{g})$ 、 $H_j = \exp \mathfrak{h}_j$ ($j=1, 2$) とおく。

- ① 積集合 $H_1 H_2$ は G の閉集合であろうか？
- ② $\tau_1 = \tau(f, \mathfrak{h}_1)$ と $\tau_2 = \tau(f, \mathfrak{h}_2)$ の間の intertwining operator, i.e. $\tau_2(g) T_{21} = T_{21} \tau_1(g)$ for $\forall g \in G$ なる unitary isomorphism $T_{21}: \mathcal{H}_{\tau_1} \rightarrow \mathcal{H}_{\tau_2}$ の具体的な形を求めよ。 \mathcal{H}_{τ_1}

の適当な dense subspace 上

$$(T_{21} \gamma)(g) = \oint_{H_2/H_1 \cap H_2} \gamma(gh) \chi_f(h) \Delta_{G/H}(h)^{-\frac{1}{2}} d\nu_{H_2/H_1 \cap H_2}(h)$$

で与えられるか?

問2 (cf. [1], [6]). $\pi \in G^\wedge$ を $\pi = \tau(l, \ell)$, $l \in g^*$, $\ell \in I(l, g)$ と実現する。 g における ℓ の coexponential basis をとると generalized vector $a \in \mathcal{H}_\pi^{-\infty}$ はこれらの座標に関する distribution と思える。今 $f \in g^*$, $h \in S(f, g)$ とし $H = \exp h$ の unitary character χ_f を以前通り $\chi_f(\exp X) = e^{\frac{1}{2}f(X)}$ ($X \in h$) で与え、又 $c: H \rightarrow \mathbb{R}^*$ を H の real character とする。この時 $a \in (\mathcal{H}_\pi^{-\infty})^{H, \chi_f c}$ に対し a の台 $\text{supp } a$ は $\overline{\{g \in G; g.(l + f^\perp) \cap (f + h^\perp) = \phi\}}$ に含まれる? 特に $\Omega(\pi) \cap (f + h^\perp) = \phi$ なら $(\mathcal{H}_\pi^{-\infty})^{H, \chi_f c} = \{0\}$?

$f \in g^*$, $h \in S(f, g)$ とし $\tau(f, h)$ の canonical central decomposition を

$$\tau(f, h) \simeq \int_{\widehat{G}}^{\oplus} m(\pi) \pi d\nu(\pi) \quad (*)$$

とする。

問3 (cf. [1], [3]). ν の measure class と multiplicity function $m(\pi)$ を求めよ。特に exponential group に対しても定理2は成立するであろうか?

問4 (cf. [1], [6], [7], [9]). $\tau(f, h)$ に対し Frobenius reciprocity が成立するか? 即ち (*)において

$$m(\pi) = \dim(\mathcal{H}_\pi^{-\infty})^{H, \chi_f c}$$

にとれるであろうか？

問5 (cf. [6], [9]) . $\tau = \tau(f, h)$ に対する Plancherel formula を書け。即ち τ の分解 (*) に即して generalized vector $a_\tau \in (\mathbb{C}^\infty)_{\tau}^{H, \chi_f} \Delta_{H/H}^{\nu_2}$ の分解を具体的に与えよ。

問6 (cf. [5]) . G をリー環 \mathfrak{g} をもつ連結、単連結可解リー群、 $f \in \mathfrak{g}^*$ 、 $h \in M(f, g)$ とし、 h は $G(f)$ -invariant と仮定する。 h に対する G の analytic subgroup を H° とし、 $H = G(f)H^\circ$ は G の閉部分群であるとする。他方 $G(f)$ の unitary character η_f で $d\eta_f = \sqrt{|f|} |g(f)|$ なるものが存在し、 η_f は $d\chi_f = \sqrt{|f|} |h|$ なる H の unitary character χ_f に unique に拡張されると仮定しよう。この時、单項表現 $\text{ind}_H^G \chi_f$ を分解せよ。

§ 3. Examples and one theorem

G 上 compact support をもつ \mathbb{C} -valued continuous (resp. C^∞) function の空間を $\mathcal{H}(G)$ (resp. $\mathcal{V}(G)$) で表す。

例1. $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_2 = \mathbb{R}e_1 + \mathbb{R}e_2 : a x + b$ algebra とする、i.e. $[e_1, e_2] = e_2$. $f = e_2^* \in \mathfrak{g}^*$ 、 $h = \mathbb{R}e_1 \in M(f, g)$ にとり $G = \exp \mathfrak{g}$ の2つの open coadjoint orbit $\pm G \cdot e_2^*$ に対応する $\pi_\pm \in \widehat{G}$ を $\hat{\phi}(t) = \phi(\exp t e_1)$ により $L^2(\mathbb{R})$ 上に実現する。又 $H = \exp h$ 上の左 Haar 測度 dh を用いて $F \in \mathcal{O}(G)$ に対し

$$\widetilde{F}(g) = \int_H F(gh) \chi_f(h) \Delta_{G/H}^{-\nu_2}(h) dh \in \mathcal{H}_{\tau}^{\infty}$$

とおく。但し $g \in G$ 、 $\tau = \text{ind}_H^G \chi_f = \text{ind}_H^G \mathbf{1}_H$ ($\mathbf{1}_H : H$ の trivial character) 。 $h = \exp t e_1$ に対し $dh = dt$ にとると

$$\tilde{F}(e) = \int_{\mathbb{R}} F(\exp te_1) e^{-t/2} dt$$

他方 $\psi \in \mathcal{H}_{\pi_{\pm}}^{\infty}$ に対し,

$$a_{\pm}(\psi) = \int_{\mathbb{R}} \overline{\psi(\exp t e_1)} e^{-t/2} dt$$

とおくと、 $\psi \in \mathcal{H}_{\pi_{\pm}}^{\infty} \Rightarrow e^{-mt}\psi(t) \in L^2(\mathbb{R})$ for $\forall m: non-negative integer 故、$

$$\begin{aligned} |a_{\pm}(\psi)| &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t/2} \overline{\hat{\psi}(t)} dt \right| \\ &\leq \int_{-\infty}^0 |e^{-t/2} \hat{\psi}(t)| dt + \int_0^{\infty} |e^{-t/2} \hat{\psi}(t)| dt \\ &\leq \left(\int_0^{\infty} e^{-t} dt \right)^{1/2} \left(\int_0^{\infty} |\hat{\psi}(t)|^2 dt \right)^{1/2} \\ &\quad + \left(\int_{-\infty}^0 e^{-t} dt \right)^{1/2} \left(\int_{-\infty}^0 |e^{-t} \hat{\psi}(t)|^2 dt \right)^{1/2} \\ &= \left(\int_0^{\infty} |\hat{\psi}(t)|^2 dt \right)^{1/2} + \left(\int_{-\infty}^0 |e^{-t} \hat{\psi}(t)|^2 dt \right)^{1/2} \\ &\leq \|\hat{\psi}\|_{L^2(\mathbb{R})} + \|e^{-t} \hat{\psi}\|_{L^2(\mathbb{R})} \\ &= \|\psi\|_{\mathcal{H}_{\pi_{\pm}}} + \|e_2 \psi\|_{\mathcal{H}_{\pi_{\pm}}} \end{aligned}$$

従って a_{\pm} は連続、i.e. $a_{\pm} \in (\mathcal{H}_{\pi_{\pm}}^{\infty})^H$, $\chi_{\frac{1}{2}} \Delta \in H$ 。

さて G 上の左 Haar 測度を $g = \exp s e_1 \exp u e_2$ に対し $dg = ds du$ とし、

$$\pi_{\pm}(F) = \int_G F(g) \pi_{\pm}(g) dg, \quad F \in \mathcal{A}(G)$$

とおく。この時 $F \in \mathcal{O}(G)$, $\psi \in \mathcal{H}_{\pi_{\pm}}^{\infty}$ として

$$\begin{aligned}
\langle \pi_+(\mathbf{F}) a_+, \psi \rangle &= \int \overline{\mathbf{F}(g)} (\pi_+(g^{-1}) \psi) (\exp t e_1) e^{-t/2} dg dt \\
&= \int \mathbf{F}(g) \overline{\psi(\exp s e_1 \exp u e_2 \exp t e_1)} e^{-t/2} dt ds du \\
&= \int \mathbf{F}(\exp s e_1 \exp u e_2) \overline{\psi(\exp(s+t) e_1 \exp u e_2)} e^{-t/2} dt ds du \\
&= \int \mathbf{F}(\exp s e_1 \exp u e_2) e^{\sqrt{-1} u e^{-t}} \psi(\exp(s+t) e_1) e^{-t/2} dt ds du \\
\therefore (\pi_+(\mathbf{F}) a_+) (\exp t e_1) &= \int \mathbf{F}(\exp s e_1 \exp u e_2) e^{\sqrt{-1} u e^{-(t-s)}} e^{-(t-s)/2} \\
&\quad ds du \\
\langle \pi_+(\mathbf{F}) a_+, a_+ \rangle &= \int \mathbf{F}(\exp s e_1 \exp u e_2) e^{\sqrt{-1} u e^{s-t}} e^{-t+s/2} ds du dt \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} dv \int_{\mathbb{R}^2} \mathbf{F}(\exp s e_1 \exp u e_2) e^{\sqrt{-1} u v} e^{-v^2/2} ds du
\end{aligned}$$

同様にして

$$(\pi_-(\mathbf{F}) a_-) (\exp t e_1) = \int \mathbf{F}(\exp s e_1 \exp u e_2) e^{-\sqrt{-1} u e^{-(t-s)}} e^{-(t-s)/2} ds du$$

$$\langle \pi_-(\mathbf{F}) a_-, a_- \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dv \int_{\mathbb{R}^2} \mathbf{F}(\exp s e_1 \exp u e_2) e^{\sqrt{-1} u v} e^{-v^2/2} ds du$$

これより $(2\pi)^{-1/2} a_{\pm}$ を改めて a_{\pm} とおけば

$$\begin{aligned}
&\langle \pi_+(\mathbf{F}) a_+, a_+ \rangle + \langle \pi_-(\mathbf{F}) a_-, a_- \rangle \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} dv \int_{\mathbb{R}^2} \mathbf{F}(\exp s e_1 \exp u e_2) e^{-v^2/2} e^{\sqrt{-1} u v} ds du \\
&= \int_{\mathbb{R}} \mathbf{F}(\exp s e_1) e^{-s^2/2} ds = \widetilde{\mathbf{F}}(e) = \langle \tau(\mathbf{F}) a_{\tau}, a_{\tau} \rangle
\end{aligned}$$

但し $a \in (\mathcal{H}_\tau^\infty)_H^{\frac{1}{2}}$; $a_\tau : \mathcal{H}_\tau^\infty \ni \psi \rightarrow \overline{\psi(e)} \in \mathbb{C}$.
これが単項表現 τ に対する我々の Plancherel formula である。

例2 (cf. [1]). $G = \widetilde{E(\mathbb{R}^2)}$ を平面の運動群の universal cover とする。 G のリー環は $\mathfrak{g} = \mathbb{R}T + \mathbb{R}X + \mathbb{R}Y : [T, X] = Y, [T, Y] = -X$. この基底に関する第2種標準座標を用いて non-exponential group G を \mathbb{R}^3 と同一視すると、その積演算は

$$(\theta, a, b)(\theta', a', b') = (\theta + \theta', a + a \cos \theta - b \sin \theta, b + a \sin \theta + b \cos \theta).$$

今 $l = -sY \in \mathfrak{g}$ で polarization $\ell = RX + RY \in I(l, \mathfrak{g})$ をとり $B^\circ = \exp \ell$ 、 $B = 2B^\circ$ とおく。ここに $Z = G(l) = \exp 2\pi ZT : G$ の center. $G(l)$ の unitary character χ_α 、 $\chi_\alpha(\exp 2m\pi T) = e^{\sqrt{-1}2\pi m\alpha}$ 、を B の unitary character $\chi_\alpha(\exp 2m\pi Tb) = e^{\sqrt{-1}2\pi m\alpha} \chi_\alpha(b)$ ($m \in \mathbb{Z}, b \in B^\circ$) に拡張し、 G^\wedge の元 $\pi_{s, \alpha} = \text{ind}_B^\wedge \chi_\alpha$ を right translation で実現すると

$$(\pi_{s, \alpha}(g)(\phi))(t) = \phi((t + \theta, a \cos t - b \sin t, a \sin t + b \cos t))$$

$$= e^{-\sqrt{-1}\frac{b}{a}(\sin t + b \cos t)} e^{\sqrt{-1}\alpha(t+\theta)} \phi(\widehat{t+\theta})$$

但し $\phi \in L^2([0, 2\pi]), t \in [0, 2\pi], g = (\theta, a, b) \in G$ かつ $t + \theta = [t + \theta] + \widehat{t + \theta}$ with $[t + \theta] \in 2\pi\mathbb{Z}, \widehat{t + \theta} \in [0, 2\pi]$.

又この表現は $l = -sX \in \mathfrak{g}^*$ における polarization ℓ から同様にして構成され

$$(\pi_{s, \alpha}(g)(\phi))(t) =$$

$$e^{-\sqrt{-1}\frac{a}{b}(\cos t - b \sin t)} e^{\sqrt{-1}\alpha(t+\theta)} \phi(\widehat{t+\theta}). \quad \ell^\perp \cap G.l = -\Delta Y^* \sqcup \Delta Y^*$$

各々の line is H° -

orbit with $H^\circ = \exp \ell$

さて $\mathfrak{h} = \mathbb{R}X$ としてまず $\tau = \text{ind}_{H^\circ}^{\mathfrak{h}} \mathbf{1}_{H^\circ}, H^\circ = \exp \mathfrak{h}$ を考えると Benoistにより

$$\tau \simeq 2 \int_{\mathbb{R}_+ \times [0,1]}^{\oplus} \pi_{s,\alpha} ds d\alpha.$$

更にこの時 $\dim(\mathcal{H}_{\pi_{s,\alpha}}^{(-\infty)})^{H^\circ} = 2$ 、但し一般に $(\mathcal{H}_{\pi_{s,\alpha}}^{(-\infty)})^{K, L_K}$ を簡単の為 $(\mathcal{H}_{\pi_{s,\alpha}}^{(-\infty)})^K$ と書く、で $\pi_{s,\alpha}$ の第2の実現を用いる時

$$(\mathcal{H}_{\pi_{s,\alpha}}^{(-\infty)})^{H^\circ} = \mathbb{C} \delta_{-\frac{\pi}{2}} \oplus \mathbb{C} \delta_{\frac{\pi}{2}} \quad (\delta: \text{Dirac measureのconjugate}).$$

又第1の実現を用いる時

$$(\mathcal{H}_{\pi_{s,\alpha}}^{(-\infty)})^{H^\circ} = \mathbb{C} \delta_0 \oplus \mathbb{C} \delta_\pi$$

となる。他方 $\mathfrak{h}^\perp \cap G.1$ は2つの連結成分から成りそれぞれは H° -orbit でその次元は orbit $G.1$ の次元の半分。

今 $S = \{g \in G; g^{-1} \cdot (1 + f^\perp) \cap \mathfrak{h}^\perp \neq \emptyset\}$ を求めてみよう。 $g = (\theta, a, b) \in G$ として

$$g^{-1} \cdot (\alpha T^* + \beta Y^*)(X) = \beta \sin \theta, \quad g^{-1} \cdot (\alpha T^* + \beta Y^*)(Y) = \beta \cos \theta \\ (\alpha, \beta \in \mathbb{R})$$

より、 $l = -sX^*$ の時 $S = ((\mathbb{Z} + 1/2)\pi, \mathbb{R}, \mathbb{R})$ 又 $l = -sY^*$ の時 $S = (\mathbb{Z}\pi, \mathbb{R}, \mathbb{R})$ となり丁度 $(\mathcal{H}_{\pi_{s,\alpha}}^{(-\infty)})^{H^\circ}$ の元の support と一致する。

さて次に部分群 $H = ZH^\circ$ の unitary character $\rho_\gamma(\exp m\pi Th^\circ) = e^{\sqrt{-1}2\pi m\gamma} (m \in \mathbb{Z}, h^\circ \in H^\circ, \gamma \in [0, 1])$ からの誘導表現 $\tau = \text{ind}_H^G \rho_\gamma$ をやはり right translation で実現すると、 $\phi \in L^2([0, \pi] \times \mathbb{R}), g = (\theta, a, b) \in G$ として

$$(\tau(g)\phi)(t, \eta) = e^{2\sqrt{-1}[(t+\theta)]\gamma\pi} \phi(\widehat{t+\theta}, (-1)^{[t+\theta]}(\eta + a \sin t + b \cos t))$$

但し $t + \theta = [[t + \theta]]\pi + \widehat{t + \theta}$ with $[[t + \theta]] \in \mathbb{Z}$, $\widehat{t + \theta} \in [0, \pi)$.

Fourier変換

$$\Phi(t, \eta) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{\sqrt{-1}\eta y} \phi(t, y) dy$$

に移って得られる表現をやはり τ とかくと、 $(t, \eta) \in [0, \pi) \times \mathbb{R}$ として

$$(\tau(g)\Phi)(t, \eta) = e^{2\sqrt{-1}[[t+\theta]]\gamma\pi} e^{-\sqrt{-1}\eta(a \sin t + b \cos t)} \Phi(\widehat{t+\theta}, (-1)^{[[t+\theta]]}\eta).$$

最後に map $L^2([0, \pi) \times \mathbb{R}) \ni \Phi \leftrightarrow \widetilde{\Phi} \in L^2([0, 2\pi) \times \mathbb{R}_+)$;

$$\widetilde{\Phi}(t, \eta) = \begin{cases} \Phi(t, \eta), t \in [0, \pi) \\ e^{2\sqrt{-1}\gamma\pi} \Phi(t - \pi, -\eta), t \in [\pi, 2\pi] \end{cases}$$

により $L^2([0, 2\pi) \times \mathbb{R}_+)$ 上に表現 τ を実現すると

$$(\tau(g)\widetilde{\Phi})(t, \eta) = e^{2\sqrt{-1}[[t+\theta]]\gamma\pi} e^{-\sqrt{-1}\eta(a \sin t + b \cos t)} \widetilde{\Phi}(\widehat{t+\theta}, \eta).$$

以上により G の $L^2([0, 2\pi))$ への表現 $\tau_s (s > 0); F \in L^2([0, 2\pi))$ に対し、 $g = (\theta, a, b) \in G$ として

$$(\tau_s(g)F)(t) = e^{2\sqrt{-1}[[t+\theta]]\gamma\pi} e^{-\sqrt{-1}s(a \sin t + b \cos t)} F(\widehat{t+\theta})$$

を導入すると

$$\tau \cong \int_{\mathbb{R}_+}^\oplus \tau_s ds$$

而るに τ_s は以前の記号で既約表現 $\pi_{s, 2\gamma} \pmod{\mathcal{E}}$ に他ならない。即ち Benoist の結果が保証するように τ は multiplicity free である。

これは上図でみて $\mathcal{H} \cap G.1$ に含まれる 2 個の連結成分、各連結成分は

H° -orbit が $\exp \pi T \in H$ で結ばれる事に起因すると思われる。即ちこの場合、 $\mathfrak{h}^\perp \cap G.1$ に含まれる連結成分は依然として 2 個しかもそれぞれが丁度 G -orbit $G.1$ の次元の半分の次元をもつ smooth manifold であるが、 $\mathfrak{h}^\perp \cap G.1$ は唯一つの H -orbit となっている。

最後に $\pi_{s,\alpha}$ の第 2 の実現において

$$(\mathcal{H}_{\pi_{s,\alpha}}^{(-\infty)})^{H^\circ} \ni a = \xi \delta_{-\frac{\pi}{2}} + \eta \delta_{\frac{\pi}{2}}$$

が $(\mathcal{H}_{\pi_{s,\alpha}}^{(-\infty)})^{H, P_f}$ に属する為の条件は

$$\langle \exp \pi T \cdot a, \phi \rangle = \langle e^{2\pi \sqrt{-1}\gamma} a, \phi \rangle \quad \text{for } \phi \in \mathcal{H}_{\pi_{s,\alpha}}^{(\infty)}.$$

$$\text{左辺} = \langle a, \phi(t - \pi) \rangle = \xi \overline{\phi(-\frac{3}{2}\pi)} + \eta \overline{\phi(-\frac{\pi}{2})} = \xi e^{2\pi \sqrt{-1}\alpha} \overline{\phi(\frac{\pi}{2})} + \eta \overline{\phi(-\frac{\pi}{2})}.$$

$$e^{2\pi \sqrt{-1}\gamma} \xi = \eta, e^{2\pi \sqrt{-1}\gamma} \eta = \xi e^{2\pi \sqrt{-1}\alpha}, \text{i.e. } e^{4\pi \sqrt{-1}\gamma} \xi = e^{2\pi \sqrt{-1}\alpha} \xi.$$

こうして

$$(\mathcal{H}_{\pi_{s,\alpha}}^{(-\infty)})^{H, P_f} = \begin{cases} C(\delta_0 + e^{2\pi \sqrt{-1}\gamma} \delta_\pi) & \text{if } \alpha = 2\gamma, \\ 0 & \text{if } \alpha \neq 2\gamma. \end{cases}$$

同様にして第 1 の実現でやると

$$(\mathcal{H}_{\pi_{s,\alpha}}^{(-\infty)})^{H, P_f} = \begin{cases} C(\delta_0 + e^{2\pi \sqrt{-1}\gamma} \delta_\pi) & \text{if } \alpha = 2\gamma, \\ 0 & \text{if } \alpha \neq 2\gamma. \end{cases}$$

又これらの元の support はやはり以前あたえた集合 S に一致する。

例 3. $\mathfrak{g} = \mathbb{R}T + \mathbb{R}P + \mathbb{R}Q + \mathbb{R}E$; $[P, Q] = E$, $[T, E] = E$, $[T, P] = \frac{1}{2}P$, $[T, Q] = \frac{1}{2}Q$ (rank 1 の normal j-algebra) とし $G = \exp \mathfrak{g}$ を考えよう。 $f = E^* \in \mathfrak{g}^*$, $\mathfrak{h} = \mathbb{R}T + \mathbb{R}Q \in M(f, \mathfrak{g})$ にとり χ_r, H etc は以前通りの意味でもちいる。G は discrete series の表現 $\pi_t \in \mathfrak{g}^\wedge \rightarrow \pm G \cdot E^* \in \mathfrak{g}/\mathfrak{g}$ を持ち、定理 1 より

$$\tau = \text{ind}_H^G \chi, \cong \pi_+ + \pi_-.$$

まず $\ell = \mathbb{R}Q + \mathbb{R}E \in I(\pm E^*, g)$, $a \in (\mathcal{H}_{\pi_\pm}^{(-\infty)H, \chi \pm \Delta_{\ell H}})^{\frac{1}{2}}$ として、 $\psi \in \mathcal{H}_{\pi_\pm}^\infty$ に対し $\Psi(s, t) = \psi(\exp s T \exp t P)(s, t \in \mathbb{R})$ とおく。 $h = \exp x T \in H$ として $\langle \pi_x(h)a, \Psi \rangle = \langle a, \Psi(s+x, t) \rangle$, $h = \exp x Q \in H$ として $\langle \pi_x(h)a, \Psi \rangle = \langle a, \psi(\exp x Q \exp s T \exp t P) \rangle = \langle a, \psi(\exp s T \exp t P \exp(xe^{-\frac{t}{2}} Q - tx e^{-\frac{t}{2}} E)) \rangle = \langle a, e^{\pm \sqrt{-1}x t} e^{-\frac{t}{2}} \Psi(s, t) \rangle$ 。従って要求される semi-invariance は

$$\langle a, \Psi(s+x, t) \rangle = e^{\pm \sqrt{-1}x t} \langle a, \Psi \rangle,$$

$$\langle a, (1 - e^{\pm \sqrt{-1}x t} e^{-\frac{t}{2}}) \Psi(s, t) \rangle = 0 \quad (\forall x \in \mathbb{R}).$$

第2の式より $\text{supp } a \subset (\mathbb{R}, 0)$ 、更に第1の式を用いて

$$\langle a, \Psi \rangle = c \int_{\mathbb{R}} \overline{\Psi(s, 0)} e^{-\frac{s}{4}} ds \quad (c \in \mathbb{C}).$$

つまり Benoist[1] と Penney[9] からわかる如く

$$\dim(\mathcal{H}_{\pi_\pm}^{(-\infty)H, \chi \pm \Delta_{\ell H}})^{\frac{1}{2}} = 1.$$

次に $l = \alpha P^* + \beta Q^* \in \mathfrak{g}^*$ ($\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$) を通る G -orbit に対応する $\pi_{\alpha, \beta} \in \mathcal{H}_{\pi_\pm}^\infty$ を考えよう。 $\ell = \mathbb{R}P + \mathbb{R}Q + \mathbb{R}E \in I(l, g)$ を用いて $\pi_{\alpha, \beta}$ を実現し、 $\phi \in \mathcal{H}_{\pi_\pm}^\infty$ に対し $\Phi(s) = \phi(\exp s T)$ ($s \in \mathbb{R}$) とおく。 $a \in (\mathcal{H}_{\pi_\pm}^{(-\infty)H, \chi \pm \Delta_{\ell H}})^{\frac{1}{2}}$ として $h = \exp t T$ の時 $\langle \pi(h)a, \Phi \rangle = \langle a, \Phi(s+t) \rangle$, $h = \exp t Q$ の時 $\langle \pi(h)a, \Phi \rangle = \langle a, \phi(\exp t Q \exp s T) \rangle = \langle a, \phi(\exp s T \exp t e^{-\frac{t}{2}} Q) \rangle = \langle a, e^{-\sqrt{-1}\beta t} e^{-\frac{t}{2}} \Phi(s) \rangle$ 故、要求される semi-invariance は

$$\langle a, \Phi(s+t) \rangle = e^{\pm \sqrt{-1}\beta t} \langle a, \Phi \rangle,$$

$$\langle a, (1 - e^{-\sqrt{-1}\beta t} e^{-\frac{t}{2}}) \Phi(s) \rangle = 0 \quad (\forall t \in \mathbb{R}).$$

第2式より $\beta \neq 0 \Rightarrow a = 0$, i.e. $(\mathcal{H}_{\pi_{d,p}}^{(-\infty)})^H \chi_f \Delta_{fH}^{\frac{1}{2}} = \{0\}$. $\beta = 0$ の時、第1式より

$$\langle a, \Phi \rangle = c \int_{\mathbb{R}} \overline{\Phi(s)} e^{-\frac{s^2}{4}} ds \quad (c \in \mathbb{C})$$

となり、実際この a が $(\mathcal{H}_{\pi_{d,p}}^{(-\infty)})^H \chi_f \Delta_{fH}^{\frac{1}{2}}$ の non-zero element (for $c \neq 0$) を与える事は例1と同様にしてわかる。つまり

$$\dim(\mathcal{H}_{\pi_{d,p}}^{(-\infty)})^H \chi_f \Delta_{fH}^{\frac{1}{2}} = 1$$

となり、定理1の状況において、即ち exponential group の real polarization からの monomial 表現を考える時、exceptionalな表現 $\pi \in \hat{G}$ に関しては、この単項表現の分解におけるその multiplicity に一致しない $\dim(\mathcal{H}_{\pi_{d,p}}^{(-\infty)})^H \chi_f \Delta_{fH}^{\frac{1}{2}}$ を持つ事がある。

最後に $l = \alpha T^* \in \mathfrak{g}^*$ に対応する G の character についてはどうであろうか。この character を c_α で表わすと $\Delta_{G/H} \equiv 1$ より $(\mathcal{H}_{\pi_{d,p}}^{(-\infty)})^H \chi_f \Delta_{fH}^{\frac{1}{2}} = \{0\}$ 。

以上よりこの例に関しては少なくとも次は成立している：

$$\Omega(\pi) \cap (f + \mathfrak{h}^\perp) = \emptyset \text{ なる } \pi \in G^\wedge \text{ に対し } (\mathcal{H}_{\pi_{d,p}}^{(-\infty)})^H \chi_f \Delta_{fH}^{\frac{1}{2}} = \{0\}.$$

例4(cf.[2]). Bernat et al.[2]における一例を follow する事から始めよう。 $R \in \alpha \neq 0$ として $G = G_3(\alpha) = \exp g_3(\alpha)$ 、 $g = g_3(\alpha) = Rh + Ra + Ra'$; $[h, a] = a - \alpha a'$ 、 $[h, a'] = \alpha a + a'$ 、 $[a, a'] = 0$ とする。 $\forall f \in \mathfrak{g}^*$ において $f = Rh \in S(f, g)$ をとり単項表現 $\tau = \text{ind}_H^G \chi_f$ を分解しよう。 $\alpha = Ra + Ra'$ とおき bijection $\xi a + \eta a' \rightarrow \xi + \sqrt{-1}\eta$ により α を \mathbb{C} と同一視すると $[h, z] = (1 - \sqrt{-1}\alpha)z$ for $\forall z \in \mathbb{C}$. 群 G は $H = \exp Rh$ と $A = \exp \mathbb{C}$ との半直積で $\exp \xi h \exp z = \exp(e^{\xi(1-\sqrt{-1}\alpha)}z) \exp \xi h$ for $\xi \in \mathbb{R}$ 、 $z \in \mathbb{C}$ 。 $\lambda = f(h)$ とおく。 $\Delta_{G/H}(\exp \xi h) = e^{i\xi}$ 、 $\chi_f(\exp \xi h) = e^{\sqrt{-1}\xi \lambda}$

故 \mathcal{H}_τ は関数 $\gamma: G \rightarrow \mathbb{C}$ で

$$\gamma(\hat{g} \exp \xi h) = e^{\int_{\mathbb{R}}^{(1-\sqrt{-1})\lambda} \gamma(g)} \text{ for } (\xi, g) \in \mathbb{R} \times G$$

をみたすものからなる。map $\gamma \mapsto (\tilde{\gamma}: z \rightarrow \gamma(\exp z))$ により \mathcal{H}_τ を $L^2(\mathbb{C}) = L^2(\mathbb{R}^2)$ と同一視する。 $\xi_0 \in \mathbb{R}$, $z_0, z \in \mathbb{C}$, $\gamma \in \mathcal{H}_\tau$ として

$$[\tau(\exp \xi_0 \cdot h \exp z_0) \tilde{\gamma}] [z] = \gamma(\exp(-z_0) \exp -\xi_0 \cdot h \exp z)$$

$$= \gamma(\exp(z e^{-\xi_0(1-\sqrt{-1})} - z_0) \exp(-\xi_0 \cdot h)) = e^{\xi_0(\sqrt{-1}\lambda - 1)} (z e^{-\xi_0(1-\sqrt{-1})} - z_0).$$

ここで ϕ を $L^2(\mathbb{C})$ の Fourier 変換とし $\tau_1 = \phi \cdot \tau \cdot \phi^{-1}$ とおき、(1) を $\mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ の内積、 dz を \mathbb{R}^2 の Lebesgue measure とする。この時 $\hat{g} = \exp \xi_0 \cdot h \exp z_0 \in G$, $\psi \in \mathcal{K}(\mathbb{C})$, $v \in \mathbb{C}$ として

$$\begin{aligned} 2\pi [\phi(\tau(\hat{g}) \psi)](v) &= \int_{\mathbb{C}} (\tau(\hat{g}) \psi)(z) e^{\sqrt{-1}(v|z)} dz \\ &= \int_{\mathbb{C}} e^{\xi_0(\sqrt{-1}\lambda - 1)} \psi(z e^{-\xi_0(1-\sqrt{-1})} - z_0) e^{\sqrt{-1}(v|z)} dz \\ &= \int_{\mathbb{C}} e^{\xi_0(\sqrt{-1}\lambda + 1)} \psi(z') e^{\sqrt{-1}(v|e^{\xi_0(1-\sqrt{-1})}(z_0 + \xi)}) dz' \\ &= 2\pi e^{\xi_0(\sqrt{-1}\lambda + 1) + \sqrt{-1}(v|e^{\xi_0(1-\sqrt{-1})} z_0)} (\phi \psi)(e^{\xi_0(\sqrt{-1}\lambda + 1)} v). \end{aligned}$$

さて a, a' の dual basis を a^*, a'^* で表し α 同様 α^* を bijection $\alpha^* \ni \xi a^* + \eta a'^* \rightarrow \xi + \sqrt{-1}\eta \in \mathbb{C}$ により \mathbb{C} と同一視する。exp th. $(\xi a^* + \eta a'^*) = \xi' a^* + \eta' a'^*$ with $\xi' = e^{-t}(\xi \cos \alpha t + \eta \sin \alpha t)$ 、 $\eta' = e^{-t}(\xi \sin \alpha t - \eta \cos \alpha t)$ 故 $\xi = \cos \theta$ 、 $\eta = \sin \theta$ とおくと $\xi' = e^{-t} \cos(\theta - \alpha t)$ 、 $\eta' = e^{-t} \sin(\theta - \alpha t)$ となり $e^{\sqrt{-1}\theta}$ を通る coadjoint orbit は $e^{-t}(\cos(\theta - \alpha t) + i \sin(\theta - \alpha t)) = e^{-t + \sqrt{-1}(\theta - \alpha t)}$ 、かつ変数変換 $(\xi', \eta') \rightarrow (t, \theta)$ に関しては

$$\left| \det \begin{pmatrix} \frac{\partial \xi}{\partial t} & \frac{\partial \xi}{\partial \theta} \\ \frac{\partial \eta}{\partial t} & \frac{\partial \eta}{\partial \theta} \end{pmatrix} \right| = e^{-2t}.$$

以前同様 $\hat{g} = \exp \xi_0 h \exp z_0 \in \hat{G}$ に対し

$$\begin{aligned} (\tau_1(\hat{g})\varphi)(e^{-t+\sqrt{-1}(\theta-\alpha t)}) &= e^{\xi_0(\sqrt{-1}\lambda+1)+\sqrt{-1}(e^{-t+\sqrt{-1}(\theta-\alpha t)}|e^{\xi_0(1-\sqrt{-1}\alpha)}z_0)} \\ &\quad \times \varphi(e^{\xi_0(1+\sqrt{-1}\alpha)}e^{-t+\sqrt{-1}(\theta-\alpha t)}) \\ &= e^{\xi_0(\sqrt{-1}\lambda+1)+\sqrt{-1}(e^{-t+\sqrt{-1}(\theta-\alpha t)}|e^{\xi_0(1-\sqrt{-1}\alpha)}z_0)} \\ &\quad \times \varphi(e^{(-t+\xi_0)(1+\sqrt{-1}\alpha)+\sqrt{-1}\theta}). \end{aligned}$$

従って各 coadjoint orbit 上の L^2 -function は τ_1 で不変。そこでこの表現が $\cos \theta + i \sin \theta \in \mathfrak{o}^*$ から出発して構成される $\pi_\theta \in \hat{G}$ に他ならない事をみよう。

φ を π_θ の表現空間の元、 \hat{g} は上の通りとすると

$$\begin{aligned} (\pi_\theta(\hat{g})\varphi)(\exp x h) &= \varphi(\exp -z_0 \exp -\xi_0 h \exp x h) = \varphi(\exp -z_0 \exp(x - \xi_0) h) \\ &= \varphi(\exp(x - \xi_0) h \exp -e^{(\xi_0 - x)(1 - \sqrt{-1}\alpha)} z_0) \\ &= e^{\sqrt{-1}(e^{\sqrt{-1}\theta}|e^{(\xi_0 - x)(1 - \sqrt{-1}\alpha)} z_0)} \varphi(\exp(x - \xi_0) h). \end{aligned}$$

即ち π_θ は $L^2(\mathbb{R})$ に

$$(\pi_\theta(\hat{g})\varphi)(x) = e^{\sqrt{-1}\theta | e^{(\xi_0 - x)(1 - \sqrt{-1}\alpha)} z_0} \varphi(x - \xi_0)$$

で実現される。ここで $\Phi(x) = e^{(1 + \sqrt{-1}\lambda)x} \varphi(x)$ とおき map $\varphi \leftrightarrow \Phi$ により π_θ を

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-2x} |\Phi(x)|^2 dx < +\infty$$

なる Φ の space 上に実現したものを $\hat{\pi}_\theta$ とすると、

$$\begin{aligned} (\hat{\pi}_\theta(\hat{g}) \Phi)(x) &= e^{(1+\sqrt{-1}\lambda)x} \pi_\theta(\hat{g})(e^{-(1+\sqrt{-1}\lambda)x} \Phi(x)) \\ &= e^{(1+\sqrt{-1}\lambda)x} e^{\sqrt{-1}(e^{\sqrt{-1}\theta}|e^{(f_0-x)(1-\sqrt{-1}\alpha)}|z_0)} e^{-(1+\sqrt{-1}\lambda)(x-f_0)} \Phi(x-\xi_0) \\ &= e^{f_0(1+\sqrt{-1}\lambda)+\sqrt{-1}(e^{\sqrt{-1}\theta}|e^{(f_0-x)(1-\sqrt{-1}\alpha)}|z_0)} \Phi(x-\xi_0) \end{aligned}$$

而るに上記 τ_1 の $e^{\sqrt{-1}\theta}$ を通る coadjoint orbit 上への制限に関し $\Psi(t) = \gamma(e^{-t(1+\sqrt{-1}\alpha)+\sqrt{-1}\theta})$ ($t \in \mathbb{R}$) とおくと τ_1 は

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-2t} |\Psi(t)|^2 dt < +\infty$$

なる Ψ の space 上に実現され、今この表現を $\hat{\tau}$ と記すと明らかに

$$(\hat{\tau}(\hat{g}) \Psi)(t) = e^{f_0(1+\sqrt{-1}\lambda)+\sqrt{-1}(e^{\sqrt{-1}\theta}|e^{(f_0-t)(1-\sqrt{-1}\alpha)}|z_0)} \Psi(t-\xi_0).$$

以上より $\hat{\pi}_\theta = \hat{\tau}$ つまり

$$\tau \simeq \int_{[0, 2\pi]}^\oplus \pi_\theta d\theta$$

となり、 τ は multiplicity free かつその分解における measure は $f + h^\perp$ における Lebesgue measure の image measure である。

この note を終えるにあたり 1 つだけ定理を記しておこう。それは巾零群に対する Howe の結果 (cf. [7]) の拡張である。

定理3. $G = \exp G$: exponential group, $f \in g^*$, $\hbar \in I(f, g)$, $\pi \in \hat{G}$ とする。この時

$$\dim(\cap_{\pi}(-\infty)H, \chi_f \Delta_{g/H}^{\nu_2}) = \begin{cases} 1 & \text{if } \Omega(\pi) = G.f, \\ 0 & \text{if } \Omega(\pi) \neq G.f. \end{cases}$$

References

- [1] Y.Benoist, Espaces symétriques exponentiels, These 3^e cycle, Univ. Paris VII, 1983.
- [2] P.Bernat et al., Représentaions des groupes de Lie résolubles, Dunod, Paris 1972.
- [3] L.Corwin, F.P.Greenleaf and G.Grélaud, Direct integral decompositions and multiplicities for induced representations of nilpotent Lie groups, to appear.
- [4] H.Fujiwara, Certains opérateurs d'entrelacement pour des groupes de Lie résolubles exponentiels et leurs applications, Mem. Fac. Sci. Kyushu Univ. A, 36(1982), 13-72.
- [5] H.Fujiwara, Polarisations réelles et représentations associées d'un groupe de Lie résoluble, J. Func. Anal., 60(1985), 102-125.
- [6] H.Fujiwara, Représentaions monomiales des groupes de Lie nilpotents, to appear.
- [7] R.Howe, On a connection between nilpotent groups and oscillatory integrals associated to singularities, Pacific J. Math., 73(1977), 329-364.
- [8] A.A.Kirillov, Unitary representations of nilpotent Lie groups, Usp. Mat. Nauk 17(1962), 57-110.
- [9] R. Penney, Abstract Plancherel theorems and a Frobenius re-

- ciprocity theorem, J. Func. Anal., 18(1975), 177-190.
- [10] M.Vergne, Étude de certaines représentations induites d'un groupe de Lie résoluble exponentiel, Ann. scient. Éc. Norm. Sup., 3(1970), 353-384.