

閉測地線の密度定理

名大理 関田 篤

(Atsushi Katsuda)

§1. 教論の密度定理

幾何のモデル、参考になると思われる教論の密度定理を列挙しよう。

1. 素教定理 (Hadamard, de la Vallée-Poussin)

$\pi_N(x) = \#\{z: \text{素教}, z \leq e^x = u\}$ に対し。

$$\pi_N(x) \sim \frac{e^x}{x} = \frac{u}{\log u} \quad \text{as } x \rightarrow \infty$$

2. Dirichletの密度定理 (Dirichlet, Chebotarev)

乗法群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ に対し。 $\pi_N(x, \alpha) = \#\{z: \text{素教}, z \leq e^x, [z] \in \alpha \quad ([\cdot]: \mathbb{Z} \rightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \text{ 自然な射影}\}, \quad (\alpha \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times)$ とかく略。

$$\pi_N(x, \alpha) \sim \frac{1}{\#(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times} \frac{e^x}{x} \quad \text{as } x \rightarrow \infty$$

3. 双子素数予想 (Hardy-Littlewood, Heath-Brown)

$\pi_N^2(x) = \#\{ z; \text{素数}, z+2, \text{素数}, z < e^x \}$ に付し。

Hardy-Littlewood はこの予想を立てた。

$$\pi_N^2(x) \sim G \frac{e^x}{x^2} \quad \text{as } x \rightarrow \infty$$

$$\text{但し } G = 2\pi \left(1 - \frac{1}{(p-1)^2}\right) \text{ である。}$$

これが、今の所未解決と思われるが[”]。Heath-Brown は Dirichlet の L-関数の Siegel zero の存在を仮定すれば、予想が導かれる[”]ことを示した。(より詳しくて、mod q の real, primitive character χ に付し、 $\beta_0 \in \mathbb{R}$, $(1-\beta_0) < (3 \log q)^{-1}$, $L(\beta_0, \chi) = 0$ となる β_0 が存在すること) 今[”]は、この analogy を考えることは幾回ではされてない(双子素数の類似が気にいっている)が、多くの Th. A, B 等の証明において、L 関数の pole ($\frac{1}{as} \log L(s, \chi)$ の singularity という意味では zero も pole も同様) が、 $\chi = 1$ の pole に近づくという事実が、本質的である。何らかの共通点があるかもしれません[”]ので、あげておく。

§ 2. 幾何における密度定理。

基本的には、素数 \longleftrightarrow 素な閉測地線(他のものの何重かには $\gamma_1, \gamma_2, \dots$ など)の対応で考える。

一般的には Riemann 多様体に対しては、無限個の素な開測地線の存在を知られていないので、Category を制限して考える。

以下の図は、その関係、今のところの使われる道具、性質等を示すものである。(定義等は後述)

M: Riemann 面, $\dim M = 2$
断面曲率 $K_M \equiv -1$

M: hyperbolic 多様体
 $K_M \equiv -1$

(Selberg trace formula)
Selberg zeta function
Laplacian

M: 負曲率多様体
 $-b^2 \leq K_M \leq -a^2$

A) M: 非正曲率多様体
 $\text{rank}(M) = 1$

(Weak 形
幾何学的議論)

B) M: Anosov 型の geodesic flow をもつ。

Ruelle operator
その最大固有値が "
 $\lambda = 1$ の近傍上 real.

⑥

(X, φ_t) : Anosov flow
 $(\text{今までには } X = \overset{\text{unit sphere ball}}{\cup} M)$

(X, φ_t) : Axiom A flow

Ruelle L-function
Ruelle operator

定義等.


★ M : 非正曲率多様体の rank とは?

• $UM \ni v$ に対し. $r(v) : v$ の rank $\in v$ に沿う平行な Jacobi 場の 次元とし. $\text{rank}(M) = \min r(v)$ とかく。平行軸. 空間の場合は通常の t の $-3 \leq t \leq 3$ 。更に finite volume の場合は次の事がたりた。

• 定理. (Ballman, Burns-Spatzler) $\text{Vol}(M) < +\infty$, $0 \geq k_M \geq -\alpha^2$, とすれば M の universal covering \tilde{M} は rank 1 か. 幾何空間か. あるいはこれらの直積の「」である。

rank 1 の多様体で負曲率でないものは. 113113 ある。

例として



はこの例である。

* Anosov flow, Axiom A flowとは?

(i) 非遍走集合 $\Omega \equiv \{x \in X \mid \forall U : x_{\text{onbd}}, \forall T \geq 0, \exists t > T$
such that $U \cap \Psi_t(U) \neq \emptyset\}$ は有限個の singularity (双曲型の χ)。

閉軌道の χ 。

(ii) $\Lambda = X - \Omega \Rightarrow x$ に対し. 次の条件ア), イ) ウ) をみたす。

ア) $T_x X = L_x \oplus E_x^S \oplus E_x^U$ と x に関して連続に直和分解される。

イ) $(d\varphi_t)_x(E_x^S) = E_{\varphi_t(x)}^S, (d\varphi_t)_x(E_x^U) = E_{\varphi_t(x)}^U$

ウ) X 上に Riemann \tilde{g}^t . 正の定数 c, λ が存在して. $t > 0$ なら.

$$\|(d\varphi_t)_x(w)\| \leq c e^{-\lambda t} \|w\| \quad w \in E_x$$

$$\|(d\varphi_{-t})_x(w)\| \leq c e^{-\lambda t} \|w\| \quad w \in E_x$$

でア, イ, ウ。

(X, φ_t)

(i), (ii) が満たす flow を Axiom A flow, また $\Lambda = M \times \mathbb{T}$ を満たす flow を Anosov といふ。

さうして mixing という概念を仮に T_h を選べば、常に必要な T の代わりとなる。

flow (X, φ_t) が "mixing" とは、任意の開集合 $U, V \subset X$ に対して、
 $T > 0$ が存在して、 $t \geq T$ なる t に対して $\varphi_t(U) \cap V \neq \emptyset$ である。

幾何的密度定理。

1. 素開軌道定理, (Selberg, Margulis, Parry-Pollicott)

$\pi(x) = \#\{ \gamma : \text{素開軌道}; l(\gamma) = \text{長さ} \leq x \}$ に対する。

$$\pi(x) \sim \frac{e^{hx}}{hx} \quad \text{as } x \rightarrow \infty \quad \left(\begin{array}{l} \text{但し } h \text{ は} \\ (X, \varphi_t) \text{ の topological} \\ \text{entropy} \end{array} \right)$$

これは次の場合に成立していい。

① Margulis, M : cpt., 負曲率。

② Parry-Pollicott (X, φ_t) : cpt., Axiom A flow, mixing.

③ Selberg, Sarnak. M : finite volume, hyperbolic.

M が 非正曲率 rank 1 の場合は、約1行の結果 (Kuiper)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \log \pi(x) = h \quad \text{しかしながら } \pi(x) \text{ は増加する}.$$

* topological entropy とは。

(X, φ_t) の topological entropy h とは。

$$h = \sup_{\delta > 0} \overline{\lim}_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \log (\max \#A; A \text{ is } (T, \delta)\text{-separating})$$

set

$\therefore \exists T, X \ni Y \text{ が } (T, \delta) \text{ であるとは } (y, y' \in Y, y \neq y')$
 $\Rightarrow \exists t \text{ such that } 0 \leq t \leq T, d(\varphi_t y, \varphi_t y') \geq \delta)$
 ということである。更に、Mが非正曲率の場合は Manning
 により $h = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \log V(x)$, ($V(x)$ は半径 x の ball
 $\subset \tilde{M}$: universal covering の体積) が示されてる。

2. Dirichlet の密度定理の幾何学版

今 o Pt. 知られてる結果は 2通りに分かれる。仮に Bowen
 型と Sunada型と呼ぶ。

① Bowen型

(X, φ_t) に対し、 X の部分集合 A とり、 A 通過閉軌道が
 どれくらいあるかを調べた結果。——これについては足元
 の稿参照。

② Sunada型

X や M からきまる群 G (基本群, 1次 homology 群等)
 の coset, α を考へ、 $[\alpha]$ に属する閉軌道の閉測地線がどれく
 らいあるかを調べた結果。 (c) は conjugacy class)

$\pi(x, \alpha) = \#\{s : s \text{ は } \alpha \text{ に属する閉軌道}, l(s) \leq x, s \in [\alpha]\}$
 とおく。

(1) 有理指數の時.

(Adachi-Sunada, Parry-Pollicott).

(X, ψ_t) : Anosov flow, $G = X$ の 基本群. $G' \triangleleft G$,
 $\#^G/G' < \infty$, $\#G/G' \rightarrow \infty$. $L \neq \emptyset$

$$\pi(x, \alpha) \sim \frac{\#\{\alpha\}}{\#(G/G')} \frac{e^{hx}}{hx} \quad \text{as } x \rightarrow \infty$$

(2) 無理指數の時.

(Phillips-Sarnak, Katada-Sunada) (Th A)

M : compact Riemann 面, $K_M \equiv -1$, $G = H_1(M, \mathbb{Z})$

$G \ni \alpha \in \#L$ (g は genus)

$$\pi(x, \alpha) \sim (g-1)^g \frac{e^x}{x^{1+g}} \quad \text{as } x \rightarrow \infty$$

(C. Epstein)

M : hyperbolic, finite volume. $G = H_1(M, \mathbb{Z})$

$G \ni \alpha \in \#L$

$$\dim M = 2 \quad \pi(x, \alpha) \sim \binom{2p}{p} \frac{(2g+p-2)}{2^{g+2}} \frac{e^x}{x^{1+g+p}}$$

但 L. g = genus, $p = \#$ cusps.

$\dim M \geq 4$

$$\pi(x, \alpha) \sim C \frac{e^{(n-1)x}}{x^{1+\frac{r}{2}}} \quad \text{as } x \rightarrow \infty$$

(講演の時は分子を間違えて $x^{1+\frac{r}{2}+\frac{1}{2}}$ とがきました。訂正致しました。) ($r = \dim H^1(M, \mathbb{R})$)

($\dim M=3$ の時は C. Epstein の preprint には "complicated" 2-cusp の影響は $|x \log(\frac{1}{x})|^{1/2}$ とつながっています。)

(Katada - Sunada) (Th B)

M : compact, Anosov^型の geodesic flow をもつ。

$G = H_1(M, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^k$.

$$\pi(x, \alpha) \sim C \frac{e^{hx}}{x^{1+\frac{r}{2}}} \quad \text{as } x \rightarrow \infty$$

M が非正曲率, rank 1 の場合は大へん多い形の結果,

$$\frac{h}{2} \leq \liminf_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \log \pi(x, \alpha) \leq \limsup_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \log \pi(x, \alpha) \leq h$$

からしかねうれしいな。

重々の結果の証明等はすでに、教科書講究録 616 「Moduli 空間の幾何と多様体」に outline とかいてあるので重複をさけよう。

最後に rank ≥ 2 の非正曲率多様体 (= 実は局所的射影空間) の場合に、幾何を知らない人は密度定理を述べてか

<。 Selberg 以来, rank ≥ 2 の局所対称空間に対し L. zeta 関数を定義するという問題は考へられてきて「よしらしげ」。 たゞかしきくてよくわかるて「よしらしげ」から、一つの解答とみなすがもしくは「よしらしげ」。

(Ballman - Brin - Spatzier)

M : cpt, locally sym. sp of noncompact type, k -rank ≥ 2 . regular vector v に對し $L.$ から發す γ geodesic と regular geodesic γ' 。 k -flat とは γ が regular geodesic と γ' で $\gamma \neq \gamma'$ 。 Regular immersed k -torus F に對し $L.$ rsys(F) で F 上の regular γ の最短の閉測地線の長さを表す。

△. VRS(x) を

$$VRS(x) = \sum_{\text{rsys}(F) < x} \text{vol}(F) \quad F \text{ is } k\text{-torus}$$

で定義する。 T と T'

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \log VRS(x) = h$$

(h は topological entropy.) が成立する。

References

1. T. Adachi and T. Sunada, Twisted Perron-Frobenius theorem and L-functions, J. Funct. Analy. 71(1987), 1-46.
 2. W. Ballman, Nonpositively curved manifolds of higher rank, Ann. of Math. 122(1985), 597-609.
 3. W. Ballman, M. Brin and R. Spatzier, Structure of manifolds of nonpositive curvature. II, Ann. of Math. 122(1985), 205-235.
 4. K. Burns and R. Spatzier, Manifolds of nonpositive curvature and their buildings, in preparation.
 5. C. Epstein, Asymptotics for closed geodesics in a homology class, the finite volume case, preprint.
 6. D.R. Heath-Brown, Prime twins and Siegel zeros, Proc. London Math. Soc. (3) 47 (1983) no2, 193-224.
 7. A. Katsuda, Homology of closed geodesics in a nonpositively curved manifold of rank one, preprint.
 8. A. Katsuda and T. Sunada, Homology and closed geodesics in a compact Riemann surface, to appear in Amer. J. Math.
 9. A. Katsuda and T. Sunada, in preparation.
 10. G. Knieper, Das Wachstum der Äquivalenzklassen geschlossener Geodätischer in Kompakten Mannigfaltigkeiten, Arch. Math. 40(1983), 559-568.
 11. G.A. Margulis, Discrete groups of motions of non-positive curvature, (Russian), Proc. Int. Congr. Math. (Vancouver) vol 2, 21-34.
 12. W. Parry and M. Pollicott, An analogue of the prime number theorem for closed orbits of Axiom A flows, Ann. of Math. 118(1983), 573-591.
 13. W. Parry and M. Pollicott, The Chebotarev theorem for Galois coverings of Axiom A flows, preprint.
- / /

14. R. Phillips and P. Sarnak, Geodesics in homology classes, to appear in Duke Math. J.
15. P. Sarnak, Prime geodesic theorems, Ph.D. dissertation, Stanford University (1980).
16. A. Selberg, Harmonic analysis and discontinuous subgroups in weakly symmetric Riemannian spaces with applications to Dirichlet series, J. Indian Math. Soc. 20(1956), 47-87.
17. T. Sunada, L-functions in geometry and some applications, Proc. of Taniguchi Symp. (1985), 266-284, Springer Lect. Note in Math. 1201, 266-284.
18. T. Sunada, 幾何学における数論的方法について —zeta および L—関数の幾何学的類似とその応用一, 数学 38 (1986) , 289 - 301.