

# 樹木上の自己共役作用素

のみたす Green 関数, (欲理)青本和彦, (AOMOTO, K.)

局所有限な連結な樹木  $\Gamma$  に対して  $V(\Gamma)$ ,  $E(\Gamma)$  を各々頂点集合, 辺集合とする.  $l^2(\Gamma)$  を  $V(\Gamma)$  上の複素数値関数で, 絶対値 2 乗可積分な関数のなすヒルベルト空間とする.  $l^2(\Gamma)$  上の線型作用素  $A$  を

$$(1) \quad Au(\gamma) = \sum_{\langle \gamma, \gamma' \rangle} u(\gamma') a_{\gamma, \gamma'} + u(\gamma) a_{\gamma\gamma},$$

$a_{\gamma, \gamma'} = a_{\gamma', \gamma} \in \mathbb{R}$ ,  $a_{\gamma\gamma} \in \mathbb{R}$  によって定義する.

ここで  $\langle \gamma, \gamma' \rangle$  は  $\gamma'$  が  $\gamma$  に隣接している事を示すものとする.  $A$  に関して以下次の仮定を置く:

$$(1.1) \quad a_{\gamma, \gamma'} \neq 0 \quad \langle \gamma, \gamma' \rangle$$

(1.2)  $A$  の領域を  $\mathcal{D}(A) = \{ u(\gamma) \in l^2(\Gamma) ; Au \in l^2(\Gamma) \}$  とおくと,  $A$  は自己共役である:  $A = A^*$

このとき  $A$  の Green 核  $(\lambda - A)^{-1}_{\gamma, \gamma'} =$

$= G(\nu, \nu' | z)$  は  $\text{Im } z \neq 0$  なる任意の複素数  $z$  に対して存在し、且つ  $z$  について正則である.  $\Phi(\nu, \nu' | z)$  は 次のスペクトル表示を持つ:

$$(2) \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\Theta(\nu, \nu' | \lambda)}{z - \lambda} = G(\nu, \nu' | z)$$

ここで,  $d\Theta(\nu, \nu' | \lambda)$  は スペクトル密度を表わす. 特く  $\Theta(\nu, \nu' | \lambda)$  は 実軸上 増加関数でしかも 常数ではない. 従って  $G(\nu, \nu' | z)$  は  $\text{Im } z > 0$  のときは  $\text{Im } G(\nu, \nu' | z) < 0$  をみたす. 従って  $G(\nu, \nu' | z)^{-1} = W_\nu(z)$  は

$$(3) \quad \text{Im } W_\nu(z) \cdot \text{Im } z > 0$$

を  $\text{Im } z \neq 0$  に対してみたしている. 我々の主要な結果のひとつは,

[定理1]  $\{W_\nu(z)\}_{\nu \in V(\Gamma)}$  は 次の代数方程式の組

をみたす: 各  $\nu \in V(\Gamma)$  毎に

$$(4) \quad z - W_Y(z) - Q_{YY}$$

$$= \sum_{\langle Y, Y' \rangle} \frac{1}{2} \left( -W_Y + \sqrt{W_Y^2 + \frac{4Q_{YY'}^2}{W_{Y'}}} \right),$$

且つ  $W_Y(z)$  は  $\lim_{z \neq 0} K$  において正則  
 であるが,  $\lim_{z \rightarrow \pm\infty} K$  において漸近展開

$$(5) \quad W_Y(z) \sim z$$

を持つ.

この定理の証明は次の2個の Lemma  
 から直ちに得られる.

[Lemma 1]  $\gamma, \gamma' \in V(\Gamma)$  を  $\langle \gamma, \gamma' \rangle$   
 となる任意の2頂点とする.  $\gamma_0$  を  $\gamma$  と  $\gamma'$   
 を結ぶ辺を  $\Gamma$  から取り除いた樹木  
 (2個の連結成分を持つ) の同一の連結成分  
 の任意の頂点とするとき, 比

$$(6) \quad \frac{G(\gamma_0, \gamma' | z)}{G(\gamma_0, \gamma | z)}$$

は  $\gamma_0$  の取り方によらず,  $\gamma, \gamma'$  のみ  
に依存する。

これは  $A$  の自己共役性から直ちに  
従う。この Lemma の結果として,  $\gamma_0$  が  
 $\gamma$  と同じ連結成分  $K$  に属するとき,

$$(7) \quad \frac{G(\gamma_0, \gamma' | z)}{G(\gamma_0, \gamma | z)} = \alpha\left(\frac{\gamma}{\gamma'}, |z\right)$$

とおき,  $\alpha\left(\frac{\gamma}{\gamma'}, |z\right)$  を乗法子と呼んで

おく。Lemma 1 と Green 核の定義から

[Lemma 2]  $\langle \gamma, \gamma' \rangle$   $K$  に対して

$$(8) \quad \alpha\left(\frac{\gamma}{\gamma'}, |z\right) = \frac{-W_\gamma + \sqrt{W_\gamma^2 + 4a_{\gamma, \gamma'} \frac{W_\gamma}{W_{\gamma'}}}}{2a_{\gamma, \gamma'}}$$

が成り立つ。

(8) から, 左辺 従って 右辺 も  $\det z \neq 0$   
 $K$  に対して 正則である。実際

$$(9) \quad \alpha\left(\frac{\gamma}{\gamma'}, |z\right) = \frac{G(\gamma, \gamma' | z)}{G(\gamma, \gamma | z)}$$

で,  $G(\gamma, \gamma | z) \neq 0$  である。

さて (4), (5) は  $W_\gamma(z)$  の Laurent

展開 (漸近展開)

$$(10) \quad \tilde{W}_\gamma(z) = z + w_\gamma^{(0)} + \frac{w_\gamma^{(1)}}{z} + \frac{w_\gamma^{(2)}}{z^2} + \dots$$

を一意に決めるか, 右辺は  $z = \infty$  の近傍で収束するとは限らない. 従って (10) は  $\tilde{W}_\gamma(z)$  を解析関数として一意に定義するとは限らない. しかし  $W_\gamma(z) = G(\gamma, \gamma | z)^{-1}$  は

次の不等式をみたす:

[Lemma 3]  $\langle \gamma, \gamma' \rangle$  に対して

$$(11) \quad \operatorname{Im} \left( -W_\gamma + \sqrt{W_\gamma^2 + \frac{4G_{\gamma, \gamma'}^2 W_\gamma}{W_{\gamma'}}} \right) \cdot \operatorname{Im} z < 0.$$

これは, Dirichlet の公式を適用する事によつて, ~~やはり~~  $A$  の自己共役性から得られる.

$G(\gamma, \gamma' | z)$  は  $W_\gamma(z)$ , (7), (8) によつて一意に決定されるので,  $G(\gamma, \gamma' | z)$  は

$W_y(z)$  を決めさえすればよい。これに関して  
次の結果が得られる。

[定理2]  $\{\tilde{W}_y(z)\}_{y \in V(\Gamma)}$  は  $W_y = \tilde{W}_y$

とおくとき、(4), (5), (11) をみたすものとする。  
このとき  $\tilde{W}_y(z)$  は  $G(y, \gamma | z)^{-1}$  に等しい。  
すなわち  $W_y(z) = G(y, \gamma | z)^{-1}$  は (4), (5), (11) に  
よって一意に決定される。

証明の方針は、 $\Gamma$  が有限樹木  
のとき  $G(y, \gamma | z)$  が有理的且つ  $z = \infty$   
において正則である事に注意し、 $G(y, \gamma | z)$   
つまり  $W_y(z)$  が (4), (5) によって一意に決まる  
事に注意する。次に  $\Gamma$  に到る有限樹  
木の増大列  $\{\Gamma_N\}_{N \geq 1}$  を考え、その上  
での Green 核  $G_N(y, \gamma' | z)$  を構成する。

今  $0 \in V(\Gamma_N)$  を固定し、 $G_N(y, 0)$   
を考える。  $\text{dis}(0, \gamma) = n$  とし、 $0$  と  $\gamma$   
を結ぶ測地線  $[0, \gamma]$  上の点で、 $\gamma$   
の手前の点、すなわち  $\text{dis}(0, \gamma') = n-1$

となる実  $\gamma'$  を  $\sigma(\gamma)$  と書  $\leftarrow$ , 一方  $\gamma$  と隣接し,  $\gamma$  の向こう側の実を  $\sigma_{+,1}(\gamma), \dots, \sigma_{+,p}(\gamma)$  とする. すると関数  $u(\gamma) = G_N(\gamma, 0)$  は  $\gamma, \sigma_{+,j}(\gamma) \in V(\sqrt{N})$  のとき

$$(12) \quad \begin{aligned} \sum u(\gamma) &= a_{\gamma, \sigma(\gamma)} u(\sigma(\gamma)) + a_{\gamma, \gamma} u(\gamma) \\ &+ \sum_{j=1}^p a_{\gamma, \sigma_{+,j}(\gamma)} u(\sigma_{+,j}(\gamma)) \end{aligned}$$

をみる. 今

$$(13) \quad \zeta_{\gamma} = a_{\gamma, \sigma(\gamma)} \frac{u(\gamma)}{u(\sigma(\gamma))} = a_{\gamma, \sigma(\gamma)} \alpha\left(\frac{\sigma(\gamma)}{\gamma}\right)$$

とおけば, (12) は

$$(14) \quad \zeta_{\gamma} = \frac{a_{\gamma, \sigma(\gamma)}^2}{\sum a_{\gamma, \gamma} - \sum_{j=1}^p \zeta_{\sigma_{+,j}(\gamma)}}$$

と書ける. 今  $\alpha_m \sum > 0$  と仮定すれば,

$$\alpha_m \zeta_{\sigma_{+,j}(\gamma)} \leq 0 \quad \text{がすべての } j \text{ に対して成立すれば}$$

は、 $\text{Im} \zeta_\gamma < 0$  である。又  $\zeta_{\sigma_{+j}(\gamma)}$

が下半面の円の内部を動けば、  
 $\sum_{j=1}^p \zeta_{\sigma_{+j}(\gamma)}$  も又下半面のある円の内部

部を動き、従て  $\zeta_\gamma$  も下半面のある  
 円の内部を動く。又

$$(15) \quad G_N(0,0|\infty) = \frac{1}{z - a_{0,0} - \sum_{\langle 0,\gamma \rangle} \zeta_\gamma}$$

であるから、各  $\zeta_\gamma$  が下半面の円の内部  
 を動けば、 $G(0,0|\infty)$  は下半面の円の  
 内部を動く。

$\Gamma_N$  の境界の各点  $\gamma'$  において、於て

$\zeta_{\gamma'}$  は  $\text{Im} \zeta_{\gamma'} \leq 0$  とすれば、上記の考察

より、 $\text{Im} G_N(0,0|\infty) < 0$  であるが、 $G_N(0,0|\infty)$

は下半面のある円の内部を走る事になる。  
 この円を  $\Delta_N$  とおく。この時次が成り立つ。



[Lemma 4]  $N_1 < N_2$  ならば  $\Delta_{N_1} \supset \Delta_{N_2}$ .

従って  $\lim_{N \rightarrow \infty} \Delta_N = \Delta_\infty$  が存在し,

これは円であるか又は点である。これらは、各々 極限円又は極限点と呼ばれる。

次は 1次元格子  $K$  に対してはよく知られた事実の樹木への拡張である。

[定理 3]  $\alpha_n > 0$  と仮定する。  $A$  が自己共役であるための 必要十分条件 は、 $\Delta_\infty$  が極限点となる事である。

従って以下  $\Delta_\infty$  は常に極限点と仮定する。すると 各  $N$   $K$  に対して  $\Gamma_N$  の境界条件

$$(16) \quad \alpha \left( \frac{\partial \psi}{\partial \nu} \right) = \frac{G(0, \gamma | z)}{G(0, \alpha(\gamma) | z)}, \quad \gamma \in \partial \Gamma_N$$

をいかく定めようとも、 $\Delta_N$  の極限である  $\Delta_\infty$  は莫く収縮するのだから、 $N \rightarrow \infty$  における限り、 $G_N(0, 0 | z)$  は境界条件

の取り方によらず、ただひとつの関数に収束する。

[定理2の証明] (4), (5), (11) をみたす関数族が  $W_\gamma(z) = G(\gamma, \gamma|z)^{-1}$  の他にあるものとし、それらを  $\{W_\gamma^*(z)\}_{\gamma \in V(\Gamma)}$  とする。

各  $\Gamma_N$  上に制限してみれば、それは各々

$$(17) \quad \begin{cases} -W_{N,\gamma} + \sqrt{W_{N,\gamma}^2 + \frac{4a_{\gamma,\sigma(\gamma)}W_{N,\gamma}}{W_{N,\sigma(\gamma)}}} = 2\zeta_{N,\gamma} \\ -W_{N,\gamma}^* + \sqrt{(W_{N,\gamma}^*)^2 + \frac{4a_{\gamma,\sigma(\gamma)}W_{N,\gamma}^*}{W_{N,\sigma(\gamma)}^*}} = 2\zeta_{N,\gamma}^* \end{cases}$$

( $\gamma \in \partial\Gamma_N$ ) が与えられた、(4), (5) の解は他にない。これは一意に与えられる。ここで  $\partial_m \zeta_{N,\gamma} < 0$ ,  $\partial_m \zeta_{N,\gamma}^* < 0$  である。

従って、対応する Green 核  $G_N(0,0|z)$ ,  $G_N^*(0,0|z)$  は  $\Delta_N$  に値をとる。  $\Delta_N \mapsto \Delta_\infty (= -\infty)$

である故

$$(48) \quad \lim_{N \rightarrow \infty} G_N(0, 0 | z) = \lim_{N \rightarrow \infty} G_N^*(0, 0 | z) \\ = G(0, 0 | z)$$

でなくてはならぬ。原典で極限典で  
あれば、他のすべての頂典でいふのである事が証  
明されるので、

$$(49) \quad \lim_{N \rightarrow \infty} G_N(\gamma, \gamma | z) = \lim_{N \rightarrow \infty} G_N^*(\gamma, \gamma | z) \\ = G(\gamma, \gamma | z)$$

かすべての  $\gamma \in V(\Gamma)$  について言える。よって定理2  
の証明が完成した。

### 文献

- [1] K. AOMOTO, Proc. Japan Acad.,  
Vol 64, Ser. A, No. 4, 123-125 (1988)
- [2] ———, Selfadjointness and  
limit pointness for adjacency operators  
on a tree, preprint, 1988.