

SNS の流行を記述する数理モデルの最終規模方程式について

小林和也、中田行彦

概要. 本稿では、SNS (ソーシャルネットワークサービス) の流行を記述する数理モデルのダイナミクスを考察する。SNS の流行モデルは、SIR 型感染症モデルを基に、非線形な常微分方程式で定式化されており、その解挙動も類似なものとなっている。解の極限が満たす方程式 (最終規模方程式) を導出する。この最終規模方程式を解析すると、最初期に SNS の利用や参加に消極的な人口の数が少ないほど、最終的に SNS の利用を止めたユーザー数は多くなることが示される。

1. はじめに

論文 [1] の著者らは、以下のような数理モデルを用いて、MySpace や Facebook などの SNS (ソーシャルネットワークサービス) の流行や衰退の説明を試みている：

$$(1.1a) \quad S'(t) = -\beta S(t)I(t),$$

$$(1.1b) \quad I'(t) = \beta S(t)I(t) - \alpha I(t)R(t),$$

$$(1.1c) \quad R'(t) = \alpha I(t)R(t).$$

ここで、 $S(t)$ は時間 t における SNS の潜在的なユーザーの数、 $I(t)$ は時間 t における SNS のユーザーの数、 $R(t)$ は時間 t における SNS に飽きたり利用を止めたユーザーの数を表している。また β , α は正のパラメータである。SIR 型感染症モデルとの違いは、SNS ユーザーの「回復率」が $R(t)$ に依存している点である。このことについて論文 [1] の著者らは次のように論じている。

Contrary to the SIR model's assumption of a characteristic recovery rate for diseases, OSN users do not join an OSN expecting to leave after a predetermined amount of time. Instead, every user that joins the network expects to stay indefinitely, but ultimately loses interest as their peers begin to lose interest.

論文 [1] では、上記の数理モデルを用いて Google による検索数のデータをフィッティングすることに焦点が当てられていた。本論文では簡単な数理解析によって、数理モデルの解の極限が満たす関係式を導出し、その解析によって SNS の流行メカニズムについて考察する。

2. 相平面におけるモデル解析

まず、

$$0 \leq S(0), I(0), R(0) \leq 1, S(0) + I(0) + R(0) = 1$$

となるように流行モデル (1.1) の初期値を選ぶ。 $I(0)$ は最初期の SNS ユーザー数を表しており、十分小さな数とし、全人口を 1 としている。

次が成り立つことは明らかである：

$$(2.1) \quad S(t) + I(t) + R(t) = 1.$$

さらに、 S と R の単調性と (2.1) から S, I, R の極限がそれぞれ存在する。それぞれの極限を次の様に表す。

$$S(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} S(t), \quad I(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} I(t), \quad R(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} R(t).$$

(2.1) から以下の等式が成り立つ。

$$(2.2) \quad S(\infty) + I(\infty) + R(\infty) = 1.$$

さらに、ここでは証明を省略するが、 $R(\infty) = R(0)e^{\alpha \int_0^{\infty} I(s) ds}$ から

$$I(\infty) = 0$$

が成り立つことが示される。流行モデル (1.1) では、必ず SNS が衰退することを示している。よって (2.2) から

$$(2.3) \quad S(\infty) + R(\infty) = 1$$

を得る。これは SNS の衰退後に人口集団が S と R のみで構成されることを示していることは言うまでもない。

$S(\infty)$ と $R(\infty)$ の関係式をもう一つ得ることが出来れば、それぞれの極限を求めることが期待できる。モデル (1.1) から次の式を得る。

$$\frac{S'(t)}{S(t)} + \frac{\beta R'(t)}{\alpha R(t)} = 0.$$

両辺を積分することで、

$$(2.4) \quad \left(\frac{S(t)}{S(0)} \right) \left(\frac{R(t)}{R(0)} \right)^{\frac{\beta}{\alpha}} = 1$$

を得る。これは、 (S, R) 平面における $(S(t), R(t))$, $t \geq 0$ の軌跡を表している。これより $S(\infty)$ と $R(\infty)$ は次の式を満たす：

$$(2.5) \quad \left(\frac{S(\infty)}{S(0)} \right) \left(\frac{R(\infty)}{R(0)} \right)^{\frac{\beta}{\alpha}} = 1.$$

上記の議論から、(2.3) と (2.5) の根として $(S(\infty), R(\infty))$ を得ることが出来る。即ち、 (S, R) 平面において定義される次の直線と曲線の交点として $(S(\infty), R(\infty))$ が得られる：

$$(2.6) \quad S + R = 1,$$

$$(2.7) \quad \left(\frac{S}{S(0)} \right) \left(\frac{R}{R(0)} \right)^{\frac{\beta}{\alpha}} = 1.$$

$S(0) + R(0) < 1$ に注意すると、 $([0, 1] \times [0, 1])$ において直線 (2.6) と曲線 (2.7) は常に 2 点の交点を持つことが分かる。さらに S は単調減少関数であり、 R は単調増加関数であることから、

$$S(\infty) \leq S(0), \quad R(\infty) \geq R(0)$$

が成り立つ。よって、点 $(S(\infty), R(\infty))$ の位置は 1 つに定まる。

また最後に $I(t)$ の挙動についても言及しておく。最初期の流行は、 $\beta S(0) - \alpha R(0)$ の符号によって決定される：

$$\text{sign}(\beta S(0) - \alpha R(0)) = \text{sign}I'(0).$$

さらに、 S, R の単調性より、 $\beta S(0) - \alpha R(0) \leq 0$ なら I は $t \geq 0$ で単調減少関数であり、 $\beta S(0) - \alpha R(0) > 0$ なら I は初期時刻において増加関数となる（やがて微分係数は 0 となり、その後減少し $I(\infty) = 0$ となる）。このことから

$$(2.8) \quad \beta S(0) > \alpha R(0)$$

が SNS が流行するための必要十分条件となる。

3. 最終規模方程式

$I(0)$ は十分小さな数であることから、 $I(0) \rightarrow 0$ として、初期値に関する解の極限挙動を考えてみよう。このとき

$$S(0) \rightarrow 1 - R(0)$$

より、 $p = \frac{\beta}{\alpha}$ と定義すると、SNS が流行する条件は (2.8) より

$$(3.1) \quad R(0) < \frac{p}{1+p}$$

で与えられる。また、(2.5) から、 $R(\infty)$ は次の方程式の根となる：

$$(3.2) \quad \left(\frac{1 - R(\infty)}{1 - R(0)} \right) \left(\frac{R(\infty)}{R(0)} \right)^p = 1.$$

$R(\infty)$ は最終的に SNS の利用を止めたユーザー数であるが、その初期値 $R(0)$ に関する依存性はどの様になっているだろうか。 $R(0)$ は $t = 0$ において、SNS の利用や参加に消極的な人口の数と解釈出来る。以下の議論によって、 $R(\infty)$ は $R(0)$ について単調減少であることを示す。即ち、最初期に SNS の利用や参加に消極的な人口の数が少ないほど、最終的に SNS の利用を止めたユーザー数は多くなることが示されるのである。

最終規模方程式 (3.2) を考察するために、関数 f を

$$f(x, y) = \left(\frac{1-y}{1-x} \right) \left(\frac{y}{x} \right)^p, \quad (x, y) \in [0, 1] \times [0, 1]$$

と定義する。陰関数定理によって、方程式

$$f(x, y) = 1$$

から $y'(x)$ を計算する事が出来る。

$$\partial_y f(x, y) = \frac{1}{(1-x)x} \left(\frac{y}{x} \right)^{p-1} (p - (1+p)y),$$

$$\partial_x f(x, y) = -\frac{1-y}{x(1-x)^2} \left(\frac{y}{x} \right)^p (p - (1+p)x)$$

から、

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\partial_x f(x, y)}{\partial_y f(x, y)} = \frac{y(1-y)}{x(1-x)} \left(\frac{p - (1+p)x}{p - (1+p)y} \right)$$

となる。今、十分大きな時間 t では、 $\beta S(t) - \alpha R(t) < 0$ が成り立つことから、

$$R(\infty) < \frac{p}{1+p}$$

が成り立つ。また (3.1) より

$$\frac{dR(\infty)}{dR(0)} < 0$$




図 3.1. $(R(0), R(\infty))$ のグラフ：縦軸は最終的に SNS の利用を止めるユーザー数を表し、横軸は最初期に SNS の利用や参加に消極的な人口の数を表している。 $R(0)$ が大きいと、SNS の潜在的なユーザーの数が少ないことから、SNS の流行が難しくなり、最終的に SNS の利用を止めるユーザー数は少なくなる。

である事がわかる。

このように $R(\infty)$ は $R(0)$ について単調減少関数であることがわかる。図 3.1 は、(3.2) を満たす $(R(0), R(\infty))$ のグラフであり、実際に単調減少性を見る事ができる。最初期に SNS の利用や参加に消極的な人口の数が少ないほど、最終的に SNS の利用を止めたユーザー数は多くなることを示している。これは、 $R(0)$ が少ないことは、SNS の潜在的なユーザーの数が多いうことを意味し、結果 SNS の流行が起こることに対して、 $R(0)$ が大きい人口集団では、SNS の潜在的なユーザーの数が少なく、SNS の流行が難しいというメカニズムによって、理解されるであろう。

参考文献

- [1] J. Cannarella, J. A. Spechler, Epidemiological modeling of online social network dynamics, arXiv:1401.4208, (2014)

島根大学 総合理工学部 数理・情報システム学科 (小林和也)

島根大学大学院 総合理工学研究科 数理科学領域 (中田行彦)

E-mail address: ynakata@riko.shimane-u.ac.jp