

## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕНЗОРОВ И ПСЕВДОТЕНЗОРОВ КРИВИЗНЫ ПРОСТРАНСТВА НЕСИММЕТРИЧНОЙ АФФИННОЙ СВЯЗНОСТИ

Светислав М. Минчич

**Резюме.** Используя 4 рода ковариантной производной тензора в пространстве несимметричной аффинной связности, мы в работах [2], [3] получили 4 тензора кривизны и 15 величин, которые назвали „псевдотензорами кривизны“ этого пространства, потому что они имеют форму и играют роль тензора кривизны, но тензорами не являются. В [6] являются 8 „выведенных“ тензоров кривизны, как линейные комбинации псевдотензоров кривизны.

В [5], [7] рассматриваются геометрические интерпретации первых 4 тензора кривизны. Цель настоящей работы — дать геометрические интерпретации всех вышеупомянутых тензоров и псевдотензоров кривизны.

1. В пространстве  $L_N$  несимметричной аффинной связности  $L_{jk}^i$  можно определить 4 рода ковариантной производной [2], [3]. Например, для тензора  $a_j^i$  имеем

$$(1a) \quad a_{j_1 m}^i = a_{j,m}^i + L_{pm}^i a_j^p - L_{jm}^p a_p^i,$$

$$(1b) \quad a_{j_2 m}^i = a_{j,m}^i + L_{mp}^i a_j^p - L_{mj}^p a_p^i,$$

$$(1c) \quad a_{j_3 m}^i = a_{j,m}^i + L_{pm}^i a_j^p - L_{mj}^p a_p^i,$$

$$(1d) \quad a_{j_4 m}^i = a_{j,m}^i + L_{mp}^i a_j^p - L_{jm}^p a_p^i,$$

где  $a_{j,m}^i = (\partial/\partial x^m)a_j^i$ .

На основе общих формул в [2] мы получаем 10 тождеств типа Риччи

$$(2) \quad a_{j_1 mn}^i - a_{j_1 nm}^i = R_1^i{}_{pmn} a_j^p - R_1^p{}_{jmn} a_p^i - 2L_{mn}^p a_{j_1 p}^i,$$

$$(3) \quad a_{j_2 mn}^i - a_{j_2 nm}^i = R_2^i{}_{pmn} a_j^p - R_2^p{}_{jmn} a_p^i + 2L_{mn}^p a_{j_2 p}^i,$$

$$(4) \quad a_{j_1 m_2 n}^i - a_{j_1 n_2 m}^i = A_1^i{}_{pmn} a_j^p - A_2^p{}_{jmn} a_p^i$$

$$+ 4a_{j<\underline{mn}}^i + 4a_{j\leq\underline{mn}}^i + 2L_{\underline{mn}}^p a_{jp}^i,$$

.....

$$(5) \quad \begin{aligned} a_{j_1 m_2 n}^i - a_{j_2 n_1 m}^i &= A_{15}^i p m n a_j^p - A_{15}^p j m n a_p^i - L_{nm}^p (a_{jp}^i - a_{j_2 p}^i) \\ &= R_3^i p m n a_j^p - R_3^p j m n a_p^i, \end{aligned}$$

где

$$(6) \quad R_1^i j m n = L_{jm,n}^i - L_{jn,m}^i + L_{jm}^p L_{pn}^i - L_{jn}^p L_{pm}^i,$$

$$(7) \quad R_2^i j m n = L_{mj,n}^i - L_{nj,m}^i + L_{mj}^p L_{np}^i - L_{nj}^p L_{mp}^i,$$

$$(8) \quad \begin{aligned} R_3^i j m n &= L_{jm,n}^i - L_{nj,m}^i + L_{jm}^p L_{np}^i - L_{nj}^p L_{pm}^i + L_{nm}^p (L_{pj}^i - L_{jp}^i) \\ &= A_{15}^i j m n + L_{nm}^p (L_{pj}^i - L_{jp}^i), \end{aligned}$$

$$(9) \quad A_1^i j m n = L_{jm,n}^i - L_{jn,m}^i + L_{jm}^p L_{np}^i - L_{jn}^p L_{mp}^i,$$

.....

$$(10) \quad A_{15}^i j m n = L_{jm,n}^i - L_{nj,m}^i + L_{jm}^p L_{np}^i - L_{nj}^p L_{pm}^i,$$

$$(11) \quad a_{j<\underline{mn}}^i = L_{pm}^p a_{j,n}^i - L_{jm}^p a_{p,n}^i,$$

$$(12) \quad a_{j\leq\underline{mn}}^i = (L_{mp}^i L_{jn}^s - L_{pm}^i L_{nj}^s) a_s^p,$$

а  $\underline{mn}$  означает антисимметрирование по  $m, n$ , запятая означает частную производную.

Величины  $R_1^i j m n, R_2^i j m n, R_3^i j m n$  — тензоры и мы называем их тензорами кривизны рядом 1-го, 2-го и 3-го рода, а величины  $A_1^i j m n, \dots, A_{15}^i j m n$  — псевдотензоры кривизны 1-го,  $\dots$ , 15-го рода.

Если при образовании тождеств типа Риччи мы используем 3-ий и 4-ий род ковариантной производной, получаются новые тождества которые похожие предыдущими. В этих тождествах появляются те же величины  $R_1, R_2, R_3; A_1, \dots, A_{15}$ , но в ином порядке. Лишь в последнем случае появляется новый тензор кривизны  $R_4$ :

$$(13) \quad a_{j_3 m_4 n}^i - a_{j_4 n_3 m}^i = R_4^i p m n a_j^p + R_3^p j n m a_p^i,$$

где

$$(14) \quad R_4^i j m n = A_{15}^i j m n + L_{mn}^p (L_{pj}^i - L_{jp}^i)$$

тензор кривизны 4-го рода пространства  $L_N$ .

2. Вдоль кривой  $C$  в  $L_N$  которая определенная уравнениями

$$(15) \quad x^i = x^i(t)$$

можно определить два рода абсолютной производной и, на основе этого, два рода параллельного переноса вектора. Для векторного поля  $a^i(t)$  говорим что это поле параллельных векторов первого, т.е. второго рода, если

$$(16a,b) \quad da^i = -L_{pm}^i a^p dx^m, \quad d_2 a^i = -L_{mp}^i a^p dx^m.$$

Следуя Франка Грайф [4], можно получить следующую геометрическую интерпретацию двух родов параллельного переноса и кручения в  $L_N$ . Рассмотрим в  $L_N$  поверхностный элемент определенный двумя инфинитезимальными векторами  $dx^i, \delta x^i$  с началом в  $P(x^i)$ . Концы этих векторов  $Q(x^i + dx^i), R(x^i + \delta x^i)$ .




Рис. 1.




Рис. 2.

Если осуществить параллельный перенос того же рода, например первого, вектора  $dx^i$  вдоль  $\delta x^i$  и  $\delta x^i$  вдоль  $dx^i$ , для концов получаем разные точки  $S, T$ :

$$(17a) \quad x_S^i = x^i + dx^i + \delta(x^i + dx^i) = x^i + dx^i + \delta x^i + \delta dx^i,$$

$$(17b) \quad x_T^i = x^i + \delta x^i + d(x^i + \delta x^i) = x^i + \delta x^i + dx^i + d\delta x^i.$$

На основе (16) имеем

$$(18a,b) \quad \delta_1 dx^i = -L_{pm}^i dx^p \delta x^m, \quad d_1 \delta x^i = -L_{pm}^i \delta x^p dx^m$$

и получается

$$(19) \quad x_T^i - x_S^i = d_1 \delta x^i - \delta_1 dx^i = 2L_{pm}^i dx^p \delta x^m,$$

т.е. для  $L_{jk}^i \neq 0$  получаем  $x_T^i \neq x_S^i$ . Аналогично получается для переноса второго рода. Но, если векторы  $dx^i, \delta x^i$  исполняют перенос разных родов, тогда получается отождествление точек  $S$  и  $T$ . Можно смотреть на параллельный перенос 1-го рода как на перенос по одной стороне поверхностного элемента (положительной), а на перенос 2-го рода как на перенос по

другой стороне (отрицательной). Пусть контур  $PQSR$  получен переносом  $dx^i$  переносом первого рода вдоль  $\delta x^i$  и  $\delta x^i$  переносом второго рода вдоль  $dx^i$ . Это на рис. 2 обозначено:  $dx^i(1)$ ,  $dx^i(2)$ .

Используя один (точнее первый) род параллельного переноса векторов, Франка Грайф [5] получила выражение для приращения  $\Delta v^i$  вектора  $v^i$  при обходе целого наблюдаемого контура, выражая его через  $R_1^i$ :

$$(20) \quad \Delta v^i = R_1^i{}_{jmn} v^j dx^m \delta x^n.$$

Таким образом получается геометрическая интерпретация для  $R_1^i$ .

Используя второй род переноса, получается

$$(21) \quad \Delta v^i = R_2^i{}_{jmn} v^j dx^m \delta x^n.$$

М. Прванович [7] использует параллельный перенос вектора  $v^i$  первого рода вдоль сторон  $PR$  и  $QS$ , а второго рода вдоль  $PQ$  и  $RS$  и получает (рис. 2):

$$(22) \quad \Delta v^i = -R_3^i{}_{jnm} v^j dx^m \delta x^n,$$

а меняя род переноса вдоль всех сторон получает

$$(23) \quad \Delta v^i = R_4^i{}_{jmn} v^j dx^m \delta x^n.$$

Так мы получаем идею систематически исследовать всех случаев которые появляются когда меняется род параллельного перенесения вектора  $v^i$  вдоль сторон контура  $PQRS$ . Есть всего  $2^4 = 16$  случаев (4 стороны, 2 рода переноса) которые показываем на таблице:

|      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| $PQ$ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| $QS$ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  |
| $RS$ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  |
| $PR$ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 2  | 1  |

О первых четырех случаях уже говорили. В пятом случае имеем следующее.

Если вектор  $v^i$  переносится параллельного вдоль контура  $PQS$ , он в точке  $S$  имеет значение

$$v^i(s) = v^i + d_1 v^i + \delta_{QS} (v^i + d_1 v^i),$$

с приращением

$$(24) \quad Dv^i = d_1 v^i + \delta_1 v^i + \delta_{QS} d_1 v^i.$$

Аналогично, вдоль контура  $PRS$  имеем

$$(25) \quad \bar{D}v^i = \delta_2 v^i + d_{RS} (v^i + \delta_2 v^i) = \delta_2 v^i + d_1 v^i + d_{RS} \delta_2 v^i.$$

От (24, 25) для приращения вдоль  $PRSQP$  имеем

$$(26) \quad \Delta_5 v^i = \bar{D}v^i - Dv^i = \delta_2 v^i - \delta_1 v^i + d_{RS_2} \delta v^i - \delta_{QS_1} dv^i.$$

На основе (16):

$$(27) \quad \delta_2 v^i - \delta_1 v^i = -L_{mp}^i v^p \delta x^m + L_{pm}^i v^p \delta x^m = 2L_{pm}^i v^p \delta x^m$$

и тоже

$$\begin{aligned} d_{RS_2} \delta v^i &= d_{RS}^i (-L_{mp}^i v^p \delta x^m) \\ &= -L_{mp,n}^i dx^n v^p \delta x^m - L_{mp}^i dv^p \delta x^m - L_{mp}^i v^p d \delta x^m \\ &= -L_{mp,n}^i v^p dx^n \delta x^m + L_{mp}^i L_{sn}^p v^s dx^n \delta x^m + L_{mp}^i L_{ns}^m v^s \delta x^s dx^n, \end{aligned}$$

т.е.

$$(28) \quad d_{RS_2} \delta v^i = (-L_{np,m}^i + L_{pm}^s L_{ns}^i + L_{mn}^s L_{sp}^i) v^p dx^m \delta x^n.$$

Тем же способом получаем

$$(29) \quad \delta_{QS_1} dv^i = (-L_{pm,n}^i + L_{pn}^s L_{sm}^i + L_{mn}^s L_{ps}^i) v^p dx^m \delta x^n.$$

На основе (26)–(29) имеем

$$(30) \quad \Delta_5 v^i = 2L_{jm}^i v^j \delta x^m + (A_{10}^i{}_{jmn} + 2L_{mn}^p L_{pj}^i) v^j dx^m \delta x^n.$$

Тем же способом в остальных случаях получается

$$(31) \quad \Delta_6 v^i = 2L_{jm}^i v^j dx^m + A_8^i{}_{jmn} v^j dx^m \delta x^n,$$

$$(32) \quad \Delta_7 v^i = 2L_{jm}^i v^j (dx^m + \delta x^m) + (A_6^i{}_{jmn} + 2L_{mn}^p L_{pj}^i) v^j dx^m \delta x^n,$$

$$(33) \quad \Delta_8 v^i = 2L_{mj}^i v^j \delta x^m - A_8^i{}_{jnm} v^j dx^m \delta x^n,$$

$$(34) \quad \Delta_9 v^i = 2L_{jm}^i v^j (dx^m - \delta x^n) + A_2^i{}_{jmn} v^j dx^m \delta x^n,$$

$$(35) \quad \Delta_{10} v^i = 2L_{jm}^i v^j dx^m + (-A_{12}^i{}_{jnm} + 2L_{mn}^p L_{pj}^i) v^j dx^m \delta x^n,$$

$$(36) \quad \Delta_{11} v^i = 2L_{mj}^i v^j dx^m + (-A_{10}^i{}_{jnm} + 2L_{mn}^p L_{jp}^i) v^j dx^m \delta x^n,$$

$$(37) \quad \Delta_{12} v^i = 2L_{jm}^i v^j (\delta x^m - dx^m) + A_4^i{}_{jmn} v^j dx^m \delta x^n,$$

$$(38) \quad \Delta_{13} v^i = 2L_{jm}^i v^j \delta x^m - A_{14}^i{}_{jnm} v^j dx^m \delta x^n,$$

$$(39) \quad \Delta_{14} v^i = 2L_{mj}^i v^j (dx^m + \delta x^n) + (-A_6^i{}_{jnm} + 2L_{mn}^p L_{jp}^i) v^j dx^m \delta x^n,$$

$$(40) \quad \Delta_{15} v^i = 2L_{mj}^i v^j dx^m + A_{14}^i{}_{jmn} v^j dx^m \delta x^n,$$

где (см. [2])

$$(41) \quad A_2^i{}_{jmn} = L_{jm,n}^i - L_{jn,m}^i + L_{mj}^p L_{pn}^i - L_{nj}^p L_{pm}^i,$$

$$(42) \quad A_4^i{}_{jmn} = L_{mj,n}^i - L_{nj,m}^i + L_{jm}^p L_{np}^i - L_{jn}^p L_{mp}^i,$$

$$(43) \quad A_6^i{}_{jmn} = L_{jm,n}^i - L_{nj,m}^i + L_{mj}^p L_{np}^i - L_{jn}^p L_{pm}^i,$$

$$(44) \quad A_8^i{}_{jmn} = L_{jm,n}^i - L_{jn,m}^i + L_{mj}^p L_{pn}^i - L_{jn}^p L_{pm}^i,$$

$$(45) \quad A_{10}^i{}_{jmn} = L_{jm,n}^i - L_{nj,m}^i + L_{jm}^p L_{np}^i - L_{jn}^p L_{pm}^i,$$

$$(46) \quad A_{12}^i{}_{jmn} = L_{mj,n}^i - L_{jn,m}^i + L_{mj}^p L_{pn}^i - L_{nj}^p L_{mp}^i,$$

$$(47) \quad A_{14}^i{}_{jmn} = L_{mj,n}^i - L_{nj,m}^i + L_{jm}^p L_{np}^i - L_{nj}^p L_{mp}^i,$$

псевдотензоры кривизны.

Можно сказать что например приращение  $\Delta_5 v^i$  получается как результат параллельного переноса вектора  $v^i$  вдоль рассматриваемого контура, если  $v^i$  переносится по отрицательной стороне элемента вдоль стороны  $PR$ , а по положительной стороне элемента вдоль остальных сторон. Так получают геометрические интерпретации для тензоров  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_4$  и для псевдотензоров четного индекса (для некоторых несколько раз).

**3.** Чтобы получили геометрические интерпретации псевдотензоров кривизны нечетного индекса, рассмотрим параллельный перенос ковариантного вектора  $v_i$  вдоль того же контура как в §2.

Для ковариантного вектора  $v_i$  определяем два рода параллельного перенесения следующими уравнениями

$$(48a,b) \quad dv_i = L_{im}^p a_p dx^m, \quad \underline{dv}_i = L_{mi}^p a_p dx^m$$

и тем же способом как в §2 получаем приращения

$$(49) \quad \Delta_1 v_j = -R_1^i{}_{jmn} v_i dx^m \delta x^n,$$

$$(50) \quad \Delta_2 v_j = -R_2^i{}_{jmn} v_i dx^m \delta x^n,$$

$$(51) \quad \Delta_3 v_j = R_3^i{}_{jnm} v_i dx^m \delta x^n,$$

$$(52) \quad \Delta_4 v_j = -R_4^i{}_{jmn} v_i dx^m \delta x^n,$$

$$(53) \quad \Delta_5 v_j = 2L_{mj}^i v_i \delta x^m - (A_5^i{}_{jmn} + 2L_{mn}^p L_{pj}^i) v_i dx^m \delta x^n,$$

$$(54) \quad \Delta_6 v_j = 2L_{mj}^i v_i dx^m - A_7^i{}_{jmn} v_i dx^m \delta x^n,$$

$$(55) \quad \Delta_7 v_j = 2L_{mj}^i v_i (dx^m + \delta x^m) - (A_7^i{}_{jmn} + 2L_{mn}^p L_{pj}^i) v_i dx^m \delta x^n,$$

$$(56) \quad \Delta_8 v_j = 2L_{jm}^i v_i \delta x^m + A_7^i{}_{jnm} v_i dx^m \delta x^n,$$

$$(57) \quad \Delta_9 v_j = 2L_{mj}^i v_i (dx^m - \delta x^m) - A_1^i{}_{jmn} v_i dx^m \delta x^n,$$

$$(58) \quad \Delta_{10} v_j = 2L_{mj}^i v_i dx^m + (A_{11}^i{}_{jnm} + 2L_{mn}^p L_{jp}^i) v_i dx^m \delta x^n$$

$$(59) \quad \Delta_{11} v_j = 2L_{jm}^i v_i dx^m + (A_9^i{}_{jnm} + 2L_{mn}^p L_{pj}^i) v_i dx^m \delta x^n,$$

$$(60) \quad \Delta_{12} v_j = 2L_{mj}^i v_i (\delta x^m - dx^m) - A_3^i{}_{jmn} v_i dx^m \delta x^n,$$

$$(61) \quad \Delta_{13} v_j = 2L_{mj}^i v_i dx^m + A_{13}^i{}_{jnm} v_i dx^m \delta x^n,$$

$$(62) \quad \Delta_{14} v_j = 2L_{jm}^i v_i (dx^m + \delta x^m) + (A_5^i{}_{jnm} + 2L_{mn}^p L_{pj}^i) v_i dx^m \delta x^n,$$

$$(63) \quad \Delta_{15} v_j = 2L_{jm}^i v_i dx^m - A_{13}^i{}_{jmn} v_i dx^m \delta x^n,$$

$$(64) \quad \Delta_{16} v_j = 2L_{jm}^i v_i \delta x^m - (A_4^i{}_{jmn} + 2L_{mn}^p L_{jp}^i) v_i dx^m \delta x^n,$$

где  $A_1, A_{15}$  псевдотензоры кривизны (9, 10), а

$$(65) \quad A_3^i{}_{jmn} = L_{mj,n}^i - L_{nj,m}^i + L_{mj}^p L_{pn}^i - L_{nj}^p L_{pm}^i,$$

$$(66) \quad A_5^i{}_{jmn} = L_{jm,n}^i - L_{nj,m}^i + L_{jm}^p L_{pn}^i - L_{nj}^p L_{mp}^i,$$

$$(67) \quad A_7^i{}_{jmn} = L_{jm,n}^i - L_{jn,m}^i + L_{jm}^p L_{pn}^i - L_{jn}^p L_{mp}^i,$$

$$(68) \quad A_9^i{}_{jmn} = L_{jm,n}^i - L_{nj,m}^i + L_{jm}^p L_{pn}^i - L_{nj}^p L_{pm}^i,$$

$$(69) \quad A_{11}^i{}_{jmn} = L_{mj,n}^i - L_{jn,m}^i + L_{mj}^p L_{np}^i - L_{jn}^p L_{mp}^i,$$

$$(70) \quad A_{13}^i{}_{jmn} = L_{mj,n}^i - L_{nj,m}^i + L_{mj}^p L_{np}^i - L_{nj}^p L_{pm}^i$$

также псевдотензоры кривизны [2]. Чтобы получить геометрическую интерпретацию псевдотензора кривизны  $A_{15}$ , заметим что на основе (8) имеем

$$(71) \quad R_3^i{}_{jmn} = A_{15}^i{}_{jmn} + 2L_{nm}^p L_{pj}^i$$

и (51) можно написать в форме

$$(72) \quad \Delta_{15} v_j = (A_{15}^i{}_{jnm} + 2L_{mn}^p L_{pj}^i) v_i dx^m \delta x^n.$$

4. В работе [6] мы получили тензоры  $\tilde{R}_1, \dots, \tilde{R}_8$ , как некоторые линейные комбинации псевдотензоров кривизны. Эти тензоры в упомянутой работе мы назвали “выведенными” тензорами кривизны пространства несимметричной аффинной связности. Так имеем:

$$(73) \quad \tilde{R}_1^i{}_{jmn} = \frac{1}{2}(A_1 + A_3)^i{}_{jmn} = \frac{1}{2}(A_2 + A_4)^i{}_{jmn},$$

$$(74) \quad \tilde{R}_2^i{}_{jmn} = \frac{1}{2}(A_7 + A_{13})^i{}_{jmn} = \frac{1}{2}(A_9 + A_{11})^i{}_{jmn},$$

$$(75) \quad \tilde{R}_3^i{}_{jmn} = \frac{1}{2}(A_8 + A_{14})^i{}_{jmn} = \frac{1}{2}(A_9 + A_{11})^i{}_{jmn},$$

$$(76) \quad \tilde{R}_4^i{}_{jmn} = \frac{1}{3}(R_3 + A_{11} + A_{13})^i{}_{jmn} = \frac{1}{3}(R_3 + A_{12} + A_{14})^i{}_{jmn},$$

$$(77) \quad \tilde{R}_5^i{}_{jmn} = (A_1 - A_7)^i{}_{jmn} - A_{13}^i{}_{jnm} = -A_7^i{}_{jmn} - (A_{11} + A_{13})^i{}_{jnm},$$

$$(78) \quad \tilde{R}_6^i{}_{jmn} = (A_2 - A_8)^i{}_{jmn} - A_{14}^i{}_{jnm} = -A_8^i{}_{jmn} - (A_{12} + A_{15})^i{}_{jnm},$$

$$(79) \quad \tilde{R}_7^i{}_{jmn} = (A_3 + A_7)^i{}_{jmn} - A_{13}^i{}_{jnm} = A_7^i{}_{jnm} + (A_{13} - A_{15})^i{}_{jnm},$$

$$(80) \quad \tilde{R}_8^i{}_{jmn} = (A_4 + A_8)^i{}_{jmn} + A_{14}^i{}_{jnm} = A_{10}^i{}_{jmn} + (A_{14} - A_{15})^i{}_{jnm},$$

где например  $(A + A)_{\frac{1}{3}}^i{}_{jmn} = A_{\frac{1}{1}}^i{}_{jmn} + A_{\frac{3}{3}}^i{}_{jmn}$  и аналогично в других случаях.

На основе (34, 37) получается

$$\Delta_{\frac{9}{9}}v^i + \Delta_{\frac{12}{12}}v^i = (\Delta_{\frac{9}{9}} + \Delta_{\frac{12}{12}})v^i = (A_{\frac{2}{2}} + A_{\frac{4}{4}})^i{}_{jmn}v^j dx^m \delta x^n,$$

т.е., используя (73):

$$(81a) \quad (\Delta_{\frac{9}{9}} + \Delta_{\frac{12}{12}})v^i = 2\tilde{R}_{\frac{1}{1}}^i{}_{jmn}v^j dx^m \delta x^n.$$

Можно сказать: Если вектор  $v^i$  переносится параллельно и два раза обходит вышеупомянутый контур, первый раз как в 9-ом, а второй раз как в 12-ом случаях, полное приращение есть (81a). Также имеем

$$(81b) \quad (\Delta_{\frac{9}{9}} + \Delta_{\frac{12}{12}})v_j = -2\tilde{R}_{\frac{1}{1}}^i{}_{jmn}v_i dx^m \delta x^n.$$

Тем же способом получают геометрические интерпретации и остальных тензоров кривизны  $\tilde{R}_2, \dots, \tilde{R}_8$ :

$$(82a) \quad (\Delta_{\frac{6}{6}} + \Delta_{\frac{15}{15}})v_j = -2\tilde{R}_2^i{}_{jmn}v_i dx^m \delta x^n,$$

$$(82b) \quad (\Delta_{\frac{8}{8}} + \Delta_{\frac{13}{13}})v_j = 2\tilde{R}_2^i{}_{jnm}v_i dx^m \delta x^n,$$

$$(82c) \quad (\Delta_{\frac{10}{10}} + \Delta_{\frac{11}{11}})v_j = 2\tilde{R}_2^i{}_{jnm}v_i dx^m \delta x^n,$$

$$(83a) \quad (\Delta_{\frac{6}{6}} + \Delta_{\frac{15}{15}})v^i = 2\tilde{R}_3^i{}_{jmn}v^j dx^m \delta x^n,$$

$$(83b) \quad (\Delta_{\frac{5}{5}} + \Delta_{\frac{16}{16}})v^i = 2\tilde{R}_3^i{}_{jmn}v^j dx^m \delta x^n,$$

$$(84) \quad (\Delta_{\frac{9}{9}} + \Delta_{\frac{10}{10}} + \Delta_{\frac{12}{12}} + \Delta_{\frac{13}{13}} + \Delta_{\frac{15}{15}} + \Delta_{\frac{16}{16}})v_j = -2(3R_4^i{}_{jmn} + 2L_{mn}^p L_{pj}^i)v_i dx^m \delta x^n,$$

$$(85) \quad (\Delta_{\frac{6}{6}} + \Delta_{\frac{9}{9}} + \Delta_{\frac{13}{13}})v_j = \tilde{R}_5^i{}_{jmn}v_i dx^m \delta x^n,$$

$$(86) \quad (\Delta_{\frac{9}{9}} + \Delta_{\frac{13}{13}} - \Delta_{\frac{6}{6}})v^i = \tilde{R}_6^i{}_{jmn}v^j dx^m \delta x^n,$$

$$(87) \quad (\Delta_{\frac{13}{13}} - \Delta_{\frac{6}{6}} - \Delta_{\frac{12}{12}})v_j = \tilde{R}_7^i{}_{jmn}v_i dx^m \delta x^n,$$

$$(88) \quad (\Delta_{\frac{6}{6}} + \Delta_{\frac{12}{12}} - \Delta_{\frac{13}{13}})v^i = \tilde{R}_8^i{}_{jmn}v^j dx^m \delta x^n.$$

#### ЛИТЕРАТУРА

- [1] П. К. Рашевский, *Риманова геометрия и тензорный анализ*, Москва, 1967.
- [2] S. Minčić, *Ricci identities in the space of non-symmetric affine connexion*, Mat. Vesnik **10** (25) (1973), 161–172.
- [3] S. Minčić, *New commutation formulas in the non-symmetric affine connexion space*, Publ. Inst. Math. (Beograd) (NS) **22** (36) (1977), 189–199.
- [4] F. Graiff, *Sulla possibilità di costruire parallelogrami chiusi in alcune varietà a torsione*, Boll. Un. Mat. Ital., Ser. III, **7** (1952), 132–135.
- [5] F. Graiff, *Formule di comutazione e trasporto ciclico nei recenti spazi di Einstein*, Rend. Ist. Lombardo Sci. e Lettere, Cl. sci. mat. e natur., Milano **87**, No. 1 (1954), 105–110.
- [6] S. Minčić, *Curvature tensors of the space of non-symmetric affine connexion, obtained from the curvature pseudotensors*, Mat. Vesnik **13** (28) (1976), 421–435.
- [7] М. Прванович, *Четыре тензора кривизны несимметрической связности*, В: *150 лет геометрии Лобачевского*, Казань 30 июня – 2 июля 1976, Москва, 1977.

Катедра за математику  
Филозофски факултет  
18000 Ниш, Југославија

(Поступила 03 08 1989)