

## ЗАДАЧА О ВОЗМУЩЕНИИ СПЕКТРА И ПРИЛОЖЕНИЕ ЕЕ К ВОЛНАМ НАД ПОДВОДНЫМ ХРЕБТОМ

Д. С. Кузнецов

**Аннотация:** В пространствах функций типа Харди рассмотрена задача о возмущении спектра одномерного псевдодифференциального оператора малым по норме вполне непрерывным оператором. При некоторых общих требованиях к операторам доказана теорема существования однократной собственной функции; доказана фредгольмовость поставленной задачи в пространстве  $L_2(\mathbb{R})$ . В качестве иллюстрации изложенной теории приведена линейная задача о бегущих вдоль подводного хребта поверхностных гравитационно-капиллярных волнах. В предположении, что жидкость идеальная, несжимаемая и безвихревая, показано, что вдоль подводного гребня распространяются волны, амплитуда которых экспоненциально затухает с малым положительным показателем в поперечном к хребту направлении. При этом в линейном приближении капиллярные эффекты существенной роли не играют. Библиогр. 10.

### Введение

В специальных банаховых пространствах рассматривается задача о возмущении спектра самосопряженного оператора  $T$ :

$$(\lambda + T)u = qPLu. \quad (1)$$

Здесь  $\lambda$  — собственное число,  $q \in \mathbb{R}$  — малый параметр,  $T$  и  $P$  — одномерные псевдодифференциальные операторы,  $L$  — линейный ограниченный самосопряженный оператор. Функция  $u(x)$  задана на всей числовой прямой.

Из условий (п. 3), налагаемых на оператор  $T$ , следует, что при  $q = 0$  точечный спектр  $T$  отсутствует. Цель работы — доказать существование собственных функций оператора  $T - qPL$  при отличных от нуля  $q$ .

Ранее [1] была подробно изучена задача о возмущении спектра оператора  $-\Delta$  вещественнозначной функцией  $h(x)$ . В одномерном случае ( $\Delta = d^2/dx^2$ ) оператор  $-\Delta - qh$ , где  $h \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ , имеет отрицательное собственное значение  $\lambda = O(q^2)$  при всех положительных  $q$  тогда и только тогда, когда  $\int h(x) dx > 0$ ; собственное число аналитически зависит от  $q$  в окрестности  $q = 0$  [1, гл. XIII].

Уравнение типа (1) также исследовалось в весовых пространствах  $C(k)$  [2], где  $k$  — показатель степенного убывания функции. Было доказано существование простого собственного числа и собственной функции, единственной с точностью до мультипликативной постоянной. В качестве примера авторами [2]

---

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета ведущих научных школ (проект № 00-15-96163) и Интеграционного проекта СО РАН (№ 1-2000).

рассмотрена линеаризованная задача о волноводе поверхностных гравитационных волн. При этом наличие капиллярности значения не имело. Сама возможность существования волновода была показана в работе [3]. Для жидкости без капиллярности задача о волноводе (в рамках линейной теории) изучалась в [4–6].

Для иллюстрации изложенной в статье теории приведена линейная задача о поверхностных гравитационно-капиллярных волнах малой амплитуды, бегущих вдоль подводного хребта. Жидкость считается идеальной несжимаемой и безвихревой. Параметр  $q > 0$  характеризует отклонение формы дна от горизонтальной плоскости; операторы  $T$  и  $L$  суть нулевой и первый члены разложения оператора «нормальная производная» по  $q$ . Показано, что амплитуда волны экспоненциально затухает в поперечном к хребту направлении с малым, порядка  $q$ , показателем. Доказывается фредгольмовость этой задачи в  $L_2(\mathbb{R})$ . Полученные результаты создают основу для исследования задачи о волноводе поверхностных волн в точной нелинейной постановке.

### 1. Функциональные пространства

Преобразование Фурье

$$\hat{u}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ix\xi} u(x) dx, \quad u(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ix\xi} \hat{u}(\xi) d\xi$$

финитных бесконечно дифференцируемых функций — целая аналитическая функция комплексного переменного  $\xi$ , убывающая быстрее любой степени  $|\xi|^{-1}$  в каждой горизонтальной полосе  $|\operatorname{Im} \xi| \leq \rho < \infty$  (теорема Пэли — Винера [7]). Поэтому для любой  $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$  величина

$$\|\varphi\|_{E^s(\rho)}^2 = \sup_{|\operatorname{Im} \xi| \leq \rho} \int |\lambda^s(\xi) \hat{\varphi}(\xi)|^2 d \operatorname{Re} \xi$$

с функцией  $\lambda(\xi) = (1 + \xi^2)^{1/2}$  определена и конечна для  $s \in \mathbb{R}$ ,  $0 \leq \rho < \infty$ . Здесь и далее подразумевается, что интегралы без обозначения пределов интегрирования берутся по всей действительной оси. Замыкание множества основных функций по введенной норме является банаховым пространством  $E^s(\rho)$  [8].

Через  $\|\cdot\|_p$  будем обозначать норму в пространстве  $L_p(\mathbb{R})$ ; скобки  $(\cdot, \cdot)$  будут означать скалярное произведение в  $L_2(\mathbb{R})$ . Для замкнутых шаров из пространства  $L_2(\mathbb{R})$  радиуса  $\mathcal{R}$  с центром в нуле будем использовать запись  $B(\mathcal{R})$ . Символом  $C$  с индексом или без будем обозначать все несущественные постоянные.

### 2. Псевдодифференциальные операторы

Оператор свертки  $K(D_x)$  с символом  $k(\xi)$  определяется через преобразование Фурье функции  $u(x)$  по формуле  $\widehat{Ku}(\xi) = k(\xi)\hat{u}(\xi)$ . Далее будем рассматривать операторы с аналитическими символами в горизонтальной полосе  $\Pi_\rho$  комплексной плоскости конечной ширины, содержащей действительную ось:  $\Pi_\rho = \{\xi \in \mathbb{C} \mid |\operatorname{Im} \xi| \leq \rho\}$ .

Пусть величина  $|K|_{E^p(\rho)} = \sup_{|\operatorname{Im} \xi| \leq \rho} |\lambda^{-p}(\xi)k(\xi)|$  конечна для некоторого

$p \in \mathbb{R}$ . Тогда оператор  $K$  действует из пространства  $E^{s+p}(\rho)$  в  $E^s(\rho)$  [8]. Нижняя грань всех таких  $p$  называется *истинным порядком*  $K$  и обозначается через  $\operatorname{deg}(K)$ .

Если символ псевдодифференциального оператора удовлетворяет двойному неравенству  $C^{-1}|\lambda^p(\xi)| \leq |k(\xi)| \leq C|\lambda^p(\xi)|$ ,  $\xi \in \Pi_\rho$ , то  $K^{-1}$  существует, ограничен и имеет порядок  $-p$ .

### 3. Постановка задачи

Предположим, что процесс распространения волн описывается уравнением

$$(\lambda + T)u = P\{qLu + q^2Mu\}, \quad (3.1)$$

где  $T$  и  $P$  — одномерные псевдодифференциальные операторы конечных порядков с символами  $t(\xi)$  и  $p(\xi)$  соответственно,  $\lambda \in \mathbb{R}$  — собственное число,  $q > 0$  — малый параметр,  $L$  и  $M$  — линейные интегральные операторы.

От функций  $t$  и  $p$  потребуем выполнения нижеперечисленных свойств.

1. Функции  $t(\xi)$ ,  $p(\xi)$  регулярные аналитические в полосе комплексной плоскости  $\Pi_{\rho_0}$  с некоторым  $0 < \rho_0 < \infty$ .

2. Функции  $t(\xi)$ ,  $p(\xi)$  принимают действительные значения на множестве

$$\{\operatorname{Im} \xi = 0\} \cup \{\operatorname{Re} \xi = 0\}, \quad \xi \in \Pi_{\rho_0}.$$

3. Для всякого  $\rho \in (0, \rho_0)$  уравнение  $t(\xi) = t(i\rho)$  имеет только решения  $\xi = \pm i\rho$ . Корни этого уравнения простые.

Требуется показать, что при определенных требованиях к операторам  $L$  и  $M$  уравнение (3.1) имеет нетривиальное решение в пространстве  $E^s(\rho)$  с некоторым  $\rho > 0$  и любым  $s \geq 0$ .

### 4. Основная теорема

Пусть операторы  $L$  и  $M$  ( $M$  может быть равен нулю) представимы в виде

$$\widehat{Lu}(\xi) = l_1(\xi) \int l_1(\eta) l_2(\xi, \eta) \widehat{u}(\eta) d\eta, \quad \widehat{Mu}(\xi) = m_1(\xi) \int m_2(\xi, \eta) \widehat{Nu}(\eta) d\eta, \quad (4.1)$$

где  $N$  — линейный оператор, свойства которого будут описаны ниже. На функции  $l_i$ ,  $m_i$  накладываются следующие условия:

(a)  $l_i$ ,  $m_i$  — регулярные аналитические функции комплексных переменных  $\xi, \eta \in \Pi_{\rho_0}$ ;

(b) функции  $l_1(\xi)$  и  $m_1(\xi)$  убывают быстрее любой степени  $|\xi|^{-1}$  в полосе  $\Pi_{\rho_0}$  при  $|\operatorname{Re} \xi| \rightarrow \infty$ ;

(c) для всех  $\xi, \eta \in \mathbb{R}$  имеют место равенства  $\overline{l_1(\xi)} = l_1(\xi)$ ,  $\overline{l_2(\xi, \eta)} = l_2(\eta, \xi)$ ;

(d) найдется число  $l \in \mathbb{R}$  такое, что равномерно по  $\eta \in \mathbb{R}$  выполняется неравенство

$$|l_2(\xi, \eta) - l_2(0, \eta)| \leq C|\xi||\lambda^l(\xi)|; \quad (4.2)$$

(e) для некоторого  $k \in \mathbb{R}$  и всех  $\xi \in \Pi_{\rho_0}$ ,  $\eta \in \mathbb{R}$  верны неравенства

$$|\widehat{Nu}(\eta)| \leq C|\lambda^k(\eta)|\mathcal{N}(u), \quad (4.3)$$

где

$$\mathcal{N}(u) = \min\{\|\widehat{u}\|_1, \|u\|_2\}; \quad (4.4)$$

$$\int |\lambda^k(\eta) m_2(\xi, \eta)| d\eta \leq C|\lambda^m(\xi)|. \quad (4.5)$$

Свойства (a)–(d) гарантируют, что результат действия оператора  $L$  на константу является экспоненциально убывающей функцией. Определим функцию  $\zeta(x)$  равенством

$$\sqrt{2\pi}\zeta(x) = L\langle 1 \rangle(x).$$

В дальнейшем такая запись будет использоваться (при необходимости) для обозначения действия линейного оператора на функцию, стоящую в угловых скобках.

**Теорема 1.** Пусть выполнены предположения (a)–(e) и

$$\frac{p(0)\hat{\zeta}(0)}{t''(0)} > 0. \tag{4.6}$$

Тогда существует  $q_* > 0$  такое, что для всех  $q \in (0, q_*)$  уравнение (3.1) имеет нетривиальное, определяемое с точностью до мультипликативной постоянной решение  $u \in E^s(\rho)$ ,  $s \geq 0$ ,  $\rho = O(q)$ . Собственное число  $\lambda \in \mathbb{R}$  непрерывно дифференцируемо по параметру  $q$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО разобьем на несколько этапов.

**1. Главная часть оператора  $(\lambda + T)^{-1}PL$ .** Пусть  $a$  — параметр, изменяющийся на отрезке  $[0, a_*]$ , где  $a_* > 0$  достаточно мало. Нули символа оператора  $\lambda + T$  должны быть расположены не на действительной оси, иначе обратный оператор  $(\lambda + T)^{-1}$  станет неограниченным и потребуются дополнительные условия разрешимости. Поэтому собственное число  $\lambda$  задачи (3.1) определяется значением функции  $t(\xi)$  в точке  $ia$ . Обозначим

$$t_1(\xi, a) = \frac{t(\xi) + \lambda(a)}{\xi^2 + a^2}, \tag{4.7}$$

где  $\lambda(a) = -t(ia)$ . Из свойств функции  $t(\xi)$  следует, что  $t_1(\xi, a)$  аналитична по совокупности аргументов в области  $\Pi_{\rho_0} \times (0, \rho_0)$ .

Покажем, что  $|t_1(\xi, a)| \geq C > 0$  равномерно по  $\xi \in \Pi_{\rho_0}$ ,  $a \in [0, a_*]$ . Действительно, согласно (4.7) функция  $t_1(\xi, a)$  может обращаться в нуль только в точках  $\xi = \pm ia$ . Ясно, что

$$t_1(a, a) = \frac{t'(ia)}{2ia}.$$

По свойству 3 у функции  $t(\xi) - t(0)$  в точке  $\xi = 0$  нуль второго порядка. Из тейлоровского разложения следует, что  $t'(ia) = ia t''(0) + O(a^2)$ . Выберем  $a_*$  так, что  $O(a_*^2) \leq |t''(0)|/4$ . Тогда  $|t_1(a, a)| \geq |t''(0)|/4 \geq C > 0$  в силу условий теоремы 1. Из вышесказанного следует требуемая равномерная оценка  $|t_1(\xi, a)|^{-1} \leq C < \infty$ .

Оператор  $(\lambda + T)^{-1}$  задается символом

$$[t(\xi) + \lambda(a)]^{-1} = \frac{1}{(\xi^2 + a^2)t_1(\xi, a)}.$$

Эта функция не принимает нулевых значений в  $\Pi_\rho$ , если  $0 \leq \rho \leq a/2$ , откуда  $|(\lambda + T)^{-1}|_{E^{-2}(\rho)} \leq C_a$ . Иными словами, оператор  $(\lambda + T)^{-1}$  сглаживающий на 2 порядка. Можно показать, что у последнего будет порядок  $-\deg(T)$ , но при рассмотрении линейной задачи это непринципиально.

Нули символа оператора  $(\lambda + T)^{-1}$  располагаются в точках  $\pm ia$ . В силу равномерной по  $a$  ограниченности снизу модуля функции  $t_1(\xi, a)$ , максимум в полосе  $\Pi_\rho$  модуля аналитической функции  $(t(\xi) + \lambda(a))^{-1}$ , где  $0 \leq \rho \leq a/2$  и  $a$

достаточно мало, принимается в точках  $\xi = \pm i\rho$  и является величиной порядка  $1/a^2$ .

Точка  $a$ , где обращается в нуль символ оператора  $(\lambda + T)^{-1}$ , должна находиться на достаточно близком расстоянии от действительной оси и быть согласованной с малым параметром  $q$ , иначе при уменьшении последнего оператор  $q(\lambda + T)^{-1}PL$  становится сжимающим, и по теореме Неймана решением уравнения (3.1) будет только нуль. Поэтому полагается, что  $a = q\mu$ , где  $\mu = \mu(q)$  — новая искомая величина, аналог собственного числа.

Для  $\psi \in E^s(\rho)$  определим операторы  $T_0, T_1$  по формулам

$$\begin{aligned} T_0(q, \mu)\psi &= \frac{q(\lambda + T)^{-1}P\zeta}{\hat{\zeta}(0)}(\psi, \zeta), \\ T_1(q, \mu)\psi &= \{q(\lambda + T)^{-1}PL - T_0(q, \mu)\}\psi + q^2(\lambda + T)^{-1}PM\psi. \end{aligned} \quad (4.8)$$

Свойства оператора  $T_1$  содержит

**Лемма 1.** Пусть функция  $u(x)$  зависит от  $q$  как от параметра, причем величина  $\mathcal{N}(u)$  равномерно по  $q$  ограничена и  $\mu_- \leq \mu \leq \mu_+$ ,  $\mu_{\pm} > 0$ . Тогда при  $\rho \in [0, q\mu_-/2]$  верна оценка

$$\|T_1(q, \mu)u\|_{E^s(\rho)} \leq C\sqrt{q}\mathcal{N}(u).$$

Постоянная  $C$  зависит от показателя  $s$ , собственного числа  $\mu$  и функций  $p, \zeta$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** При оценке  $E^s$ -норм различных функций часто будет использоваться вспомогательное

**Предложение 1.** Пусть функция  $r(x)$  такова, что для почти всех  $\xi \in \Pi_\rho$  с некоторыми  $\beta, \gamma \geq 0$  выполняется неравенство

$$|\lambda^s(\xi)\hat{r}(\xi)| \leq C_s \frac{\rho^\alpha |\xi|^\beta}{|\xi^2 + 4\rho^2|^\gamma}.$$

Тогда при условии  $\beta < 2\gamma - 1/2$  справедлива оценка

$$\|r(x)\|_{E^s(\rho)} \leq C_s \rho^{\alpha + \beta - 2\gamma + 1/2}.$$

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** При  $\xi \in \Pi_\rho$  верны неравенства

$$|\xi|^2 \leq (\operatorname{Re} \xi)^2 + \rho^2, \quad |\xi^2 + 4\rho^2|^2 \geq (\operatorname{Re} \xi)^4 + 8(\operatorname{Re} \xi)^2 \rho^2 + \rho^4.$$

Поскольку показатели  $\beta$  и  $\gamma$  неотрицательны, для почти всех  $\xi \in \Pi_\rho$  справедлива оценка

$$|\lambda^s(\xi)\hat{r}(\xi)|^2 \leq C_s \frac{\rho^{2\alpha}(\kappa^2 + \rho^2)^\beta}{(\kappa^4 + 8\kappa^2\rho^2 + \rho^4)^\gamma},$$

где  $\kappa = \operatorname{Re} \xi$ . По определению нормы в  $E^s(\rho)$  имеем

$$\|r(x)\|_{E^s(\rho)}^2 = \sup_{|\operatorname{Im} \xi| \leq \rho} \int |\lambda^s(\xi)\hat{r}(\xi)|^2 d\operatorname{Re} \xi \leq C_s \int \frac{\rho^{2\alpha}(\kappa^2 + \rho^2)^\beta}{(\kappa^4 + 8\kappa^2\rho^2 + \rho^4)^\gamma} d\kappa.$$

После замены переменных  $\kappa = \rho\kappa_1$  получим

$$\|r(x)\|_{E^s(\rho)}^2 \leq C_s \rho^{2(\alpha + \beta - 2\gamma + 1/2)} \int \frac{(\kappa_1^2 + 1)^\beta}{(\kappa_1^4 + 8\kappa_1^2 + 1)^\gamma} d\kappa_1.$$

Требуемая оценка следует из сходимости последнего интеграла при указанных в формулировке  $\beta, \gamma$ . Предложение доказано.

Переходим к доказательству леммы. Введем обозначение

$$\mathcal{A} = q(\lambda + T)^{-1}PL - T_0(q, \mu).$$

Согласно формулам (4.1) имеем (напомним, что преобразованием Фурье единицы является  $\delta$ -функция, умноженная на  $\sqrt{2\pi}$ )

$$\widehat{\mathcal{A}u}(\xi) = \frac{qp(\xi)l_1(\xi)}{(\xi^2 + q^2\mu^2)t_1(\xi, q\mu)} \times \left\{ \int l_1(\eta)l_2(\xi, \eta)\hat{u}(\eta) d\eta - \frac{l_2(\xi, 0)}{l_2(0, 0)} \int l_1(\eta)l_2(0, \eta)\hat{u}(\eta) d\eta \right\}.$$

Выражение в фигурных скобках можно представить в виде

$$\int [l_2(\xi, \eta) - l_2(0, \eta)]l_1(\eta)\hat{u}(\eta) d\eta + \frac{l_2(0, 0) - l_2(\xi, 0)}{l_2(0, 0)} \int l_2(0, \eta)l_1(\eta)\hat{u}(\eta) d\eta.$$

Неравенство (4.6) гарантирует, что  $l_2(0, 0) \neq 0$ .

Пусть  $\mathcal{N}(u) = \|u\|_2$ . Тогда в силу (b)

$$\int |l_1(\eta)\hat{u}(\eta)| d\eta \leq \|l_1\|_2 \mathcal{N}(u) \leq C\mathcal{N}(u).$$

Если же  $\mathcal{N}(u) = \|\hat{u}\|_1$ , то  $\int |l_1(\eta)\hat{u}(\eta)| d\eta \leq C\mathcal{N}(u)$ , что вместе с (4.2) дает оценку

$$|\lambda^s(\xi)\widehat{\mathcal{A}u}(\xi)| \leq C\mathcal{N}(u) \frac{q|\xi|}{|\xi^2 + q^2\mu^2|} \left| \frac{\lambda^{s+l+\deg(P)}(\xi)l_1(\xi)}{t_1(\xi, q\mu)} \right| \leq C\mathcal{N}(u) \frac{q|\xi|}{|\xi^2 + q^2\mu^2|}.$$

Далее, из представления (4.1) и оценок (4.3), (4.5) следует, что

$$|\lambda^s(\xi)\widehat{PMu}(\xi)| \leq C\mathcal{N}(u)|\lambda^{s+m+\deg(P)}(\xi)m_1(\xi)| \leq C\mathcal{N}(u), \quad \xi \in \Pi_\rho. \quad (4.9)$$

Таким образом, для всех  $\xi \in \Pi_\rho$  получено неравенство

$$|\lambda^s(\xi)\widehat{T_1u}(\xi)| \leq C\mathcal{N}(u) \frac{q|\xi| + q^2}{|\xi^2 + q^2\mu^2|}.$$

Заключение леммы вытекает из предложения 1.

**2. Приближенное решение.** Подействуем оператором  $(\lambda + T)^{-1}$  на обе части уравнения (3.1):

$$u = T_0(q, \mu)u + T_1(q, \mu)u. \quad (4.10)$$

Ввиду малости параметра  $q$  и оценки нормы оператора  $T_1$  приближенное решение (4.10) определяется уравнением

$$v = T_0(q, \nu)v. \quad (4.11)$$

Функция  $v = Cq(\lambda + T)^{-1}P\zeta$  обращает (4.11) в тождество при любом  $C \in \mathbb{R}$ , и других решений у последнего уравнения нет. Приближенное «собственное число»  $\nu$  находится из скалярного уравнения

$$\hat{\zeta}(0) = q((\lambda + T)^{-1}P\zeta, \zeta), \quad (4.12)$$

которое в развернутом виде выглядит так:

$$\hat{\zeta}(0) = \int \frac{qp(\xi)|\hat{\zeta}(\xi)|^2}{(\xi^2 + q^2\nu^2)t_1(\xi, q\nu)} d\xi. \quad (4.13)$$

Устремляя  $q$  к нулю в этом равенстве, находим «предельное» значение параметра  $\nu$ :

$$\nu_* = 2\pi \frac{p(0)\hat{\zeta}(0)}{t_1(0,0)} = 4\pi \frac{p(0)\hat{\zeta}(0)}{t''(0)}. \quad (4.14)$$

По условию теоремы  $\nu_* > 0$ .

Дифференцируя почленно (4.13), в пределе при  $q \rightarrow 0$ ,  $\nu \rightarrow \nu_*$  получаем

$$\lim_{\substack{q \rightarrow 0 \\ \nu \rightarrow \nu_*}} \frac{\partial}{\partial \nu} \int \frac{q|\hat{\zeta}(\xi)|^2}{(\xi^2 + q^2\nu^2)t_1(\xi, q\nu)} d\xi = \frac{-t''(0)}{32\pi^2 p^2(0)\hat{\zeta}(0)} \neq 0.$$

Из теоремы о неявной функции для отображения

$$f(q, \nu) = q((\lambda + T)^{-1}P\zeta, \zeta) - \hat{\zeta}(0)$$

следует существование некоторого интервала  $0 < q < q_1$ , где определена непрерывно дифференцируемая функция  $\nu(q)$ , обращающая (4.13) в тождество для всех  $q \in (0, q_1)$ . При этом выполнено предельное соотношение  $\lim_{q \rightarrow 0} \nu(q) = \nu_*$ .

**3. Точное решение.** Применим к уравнению (4.10) метод возмущения: функцию  $u(x)$  и «собственное число»  $\mu$  будем искать в виде  $u = v + w$ ,  $\mu = \nu + \tau$ . Запишем уравнение на  $w$  в виде

$$w - T_0(q, \nu)w = Aw + \Psi, \quad (4.15)$$

где линейный оператор  $A$  и функция  $\Psi$  определены равенствами

$$Aw = [T_0(q, \mu) - T_0(q, \nu)]w + T_1(q, \mu)w, \quad \Psi = Av. \quad (4.16)$$

Оператор  $T_0$  действует в конечномерное подпространство пространства  $L_2(\mathbb{R})$ , откуда следует фредгольмовость отображения  $I - T_0(q, \nu)$ . Согласно общей теории для разрешимости (4.15) правая часть  $Aw + \Psi$  должна быть ортогональна решениям однородной двойственной задачи. В силу предположений относительно функций  $l_i$  оператор  $L$  самосопряжен. Решениями двойственной задачи являются функции вида  $C\zeta$ ,  $C$  — произвольная постоянная, поэтому уравнение (4.15) имеет решение тогда и только тогда, когда

$$(Aw + \Psi, \zeta) = 0. \quad (4.17)$$

Для единственности решения потребуем выполнения условия  $(w, \zeta) = 0$ , откуда будет следовать, в частности,  $T_0 w = 0$ , и задача (4.15)–(4.17) примет вид

$$w = T_1(q, \mu)w + \Psi, \quad (4.18)$$

$$(T_1(q, \mu)w, \zeta) + (\Psi, \zeta) = 0. \quad (4.19)$$

Схема решения уравнений (4.18), (4.19) такова: сначала устанавливается существование функции  $\tau(q, w)$ , обращающей (4.19) в тождество при всех достаточно малых  $q$  и  $w \in B(\mathcal{R})$ , где  $\mathcal{R} < \infty$  не зависит от  $q$ ; затем извлекается главная часть решения уравнения (4.18), а «остаток» находится методом сжимающих отображений.

**3.1. Уравнение на «собственное число».** В силу гладкости функции  $\nu(q)$ , можно при необходимости уменьшить  $q_1$  так, чтобы  $\nu \in (3\nu_*/4, 5\nu_*/4)$ . «Поправку»  $\tau$  к собственному числу будем искать из интервала  $(-\nu_*/4, \nu_*/4)$ .

Для оценки функции  $\Psi$  потребуется

**Лемма 2.** Действие оператора  $R_0(q, \tau) = T_0(q, \mu) - T_0(q, \nu)$  на функцию  $v$  — решение уравнения (4.11) — представимо в виде

$$R_0(q, \tau)v = \tau V_q^{(1)}(x) + \tau V_{q, \tau}^{(2)}(x). \quad (4.20)$$

Для функций  $V_q^{(1)}, V_{q, \tau}^{(2)}$  при  $q \in (0, q_1)$  и  $\rho \leq q\nu_*/4$  справедливы оценки

$$\begin{aligned} 1) \quad & \|V_q^{(1)}\|_{E^s(\rho)} \leq \frac{C}{\sqrt{q}}, \quad \|V_{q, \tau}^{(2)}\|_{E^s(\rho)} \leq \frac{C|\tau|}{\sqrt{q}}; \\ 2) \quad & \|V_{q, \tau_1}^{(2)} - V_{q, \tau_2}^{(2)}\|_{E^s(\rho)} \leq \frac{C|\tau_1 - \tau_2|}{\sqrt{q}}. \end{aligned}$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. При  $q \in (0, q_1)$  уравнение (4.12) обращается в тождество. Имеем  $\widehat{R_0 v}(\xi) = Cqr(q, \nu, \mu, \xi)p(\xi)\hat{\zeta}(\xi)$  с функцией

$$r(q, \nu, \mu, \xi) = \frac{1}{t(\xi) - t(ia)} - \frac{1}{t(\xi) - t(ib)},$$

где  $a = q\mu, b = q\nu$ . По формуле Тейлора (здесь  $\alpha \in (q\nu_*/2, 3q\nu_*/2)$  — некоторая промежуточная точка)

$$\begin{aligned} r(q, \nu, \mu, \xi) &= \frac{it'(ib)(a-b)}{(\xi^2 + b^2)^2 t_1^2(\xi, b)} \\ &\quad - \frac{(a-b)^2}{2} \left[ \frac{t''(i\alpha)}{(\xi^2 + \alpha^2)^2 t_1(\xi, \alpha)} - \frac{2[t'(i\alpha)]^2}{(\xi^2 + \alpha^2)^3 t_1^3(\xi, \alpha)} \right]. \end{aligned} \quad (4.21)$$

Как отмечалось, у функции  $t(\xi) - t(0)$  в точке  $\xi = 0$  нуль второго порядка, поэтому  $t'(0) = 0, t''(0) \neq 0$ , и в силу аналитичности этой функции справедливы неравенства  $|t'(\xi)| \leq C|\xi|$  и  $|t''(\xi)| \leq C$  для всех достаточно малых  $\xi \in \mathbb{C}$ .

Положим

$$\begin{aligned} \widehat{V_q^{(1)}}(\xi) &= \frac{iq^2 t'(iq\nu)p(\xi)\hat{\zeta}(\xi)}{(\xi^2 + q^2\nu^2)^2 t_1^2(\xi, q\nu)} \\ \widehat{V_{q, \tau}^{(2)}}(\xi) &= -\frac{q^3 \tau p(\xi)\hat{\zeta}(\xi)}{2} \left[ \frac{t''(i\alpha)}{(\xi^2 + \alpha^2)^2 t_1(\xi, \alpha)} - \frac{2[t'(i\alpha)]^2}{(\xi^2 + \alpha^2)^3 t_1^3(\xi, \alpha)} \right]. \end{aligned} \quad (4.22)$$

Из оценок производных первого и второго порядков функции  $t(\xi)$ , ограниченности величины  $\deg(P)$  и быстрого убывания функции  $\hat{\zeta}(\xi)$  на бесконечности следуют неравенства

$$|\lambda^s(\xi)\widehat{V_q^{(1)}}(\xi)| \leq \frac{Cq^3}{|\xi^2 + \alpha_*|^2}, \quad |\lambda^s(\xi)\widehat{V_{q, \tau}^{(2)}}(\xi)| \leq C\tau \left[ \frac{q^3}{|\xi^2 + \alpha_*|^2} + \frac{q^5}{|\xi^2 + \alpha_*|^3} \right], \quad (4.23)$$

где  $\alpha_* = q\nu_*/2$ . Ссылка на предложение 1 доказывает первое утверждение. Второе доказывается с использованием неравенства

$$|\widehat{V_{q, \tau_1}^{(2)}}(\xi) - \widehat{V_{q, \tau_2}^{(2)}}(\xi)| \leq Cq^3 |\tau_1 - \tau_2| |\hat{\zeta}(\xi)| |Z(\xi)|$$

с функцией

$$\begin{aligned} Z(\xi) &= \max_{\frac{q\nu_*}{2} \leq \alpha \leq \frac{3q\nu_*}{2}} \left[ \frac{t''(i\alpha)}{(\xi^2 + \alpha^2)^2 t_1(\xi, \alpha)} + \frac{2[t'(i\alpha)]^2}{(\xi^2 + \alpha^2)^3 t_1^3(\xi, \alpha)} \right] \\ &\leq C \left| \frac{1}{(\xi^2 + \alpha_*^2)^2} + \frac{q^2}{(\xi^2 + \alpha_*^2)^3} \right|. \end{aligned} \quad (4.24)$$

Следовательно,

$$|\lambda^s(\xi)[\widehat{V_{q,\tau_1}^{(2)}}(\xi) - \widehat{V_{q,\tau_2}^{(2)}}(\xi)]| \leq C|\tau_1 - \tau_2| \left[ \frac{1}{|\xi^2 + \alpha_*^2|^2} + \frac{q^2}{|\xi^2 + \alpha_*^2|^3} \right].$$

Снова используя предложение 1, приходим к требуемой оценке:

$$\|V_{q,\tau_1}^{(2)} - V_{q,\tau_2}^{(2)}\|_{E^s(\rho)} \leq \frac{C|\tau_1 - \tau_2|}{\sqrt{q}}.$$

Лемма доказана.

**Лемма 3.** Если величина  $\mathcal{N}(u)$  равномерно по  $q$  ограничена (предполагается, что функция  $u(x)$  зависит от параметра  $q$ ), то для оператора

$$R_1(q, \mu_1, \mu_2) = T_1(q, \mu_1) - T_1(q, \mu_2)$$

справедлива оценка

$$\|R_1 u\|_{E^s(\rho)} \leq C\mathcal{N}(u)\sqrt{q}|\mu_1 - \mu_2|.$$

**Доказательство.** Операторы  $L$  и  $M$  не зависят от  $q, \mu$ . Заключение леммы следует из неравенства

$$|\lambda^s(\xi)\widehat{R_1 u}(\xi)| \leq C(q^4 + q^3|\xi|)|\mu_1 - \mu_2|Z(\xi)\mathcal{N}(u), \quad \xi \in \Pi_\rho,$$

оценки (4.24) и предложения 1. Лемма доказана.

Введем обозначение  $f(q, \tau, w) = (T_1(q, \mu)w, \zeta) + (\Psi, \zeta)$ , где  $\mu = \nu + \tau$ . Условие «ортогональности» (4.19) принимает вид

$$f(q, \tau, w) = 0. \quad (4.25)$$

Разрешимость этого уравнения относительно  $\tau$  гарантирует

**Теорема 2.** Существует число  $q_2 \in (0, q_1)$  такое, что для  $q \in (0, q_2)$  и  $w \in B(\mathcal{R})$  ( $\mathcal{R}$  — некоторое не зависящее от  $q$  число) определена непрерывно дифференцируемая функция

$$\tau : (0, q_2) \times B(\mathcal{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

со свойствами:

- (а)  $f(q, \tau(q, w), w) \equiv 0$  при  $q \in (0, q_2)$ ,  $w \in B(\mathcal{R})$ ;
- (б)  $|\tau(q, w)| \leq C(\sqrt{q} + \|T_1 w\|_2)$ ;
- (в) для производной Фреше  $D_w \tau$  верна оценка

$$|D_w \tau(\psi)| \leq C\|T_1 \psi\|_2, \quad \psi \in E^s(\rho).$$

Здесь  $q_2$  зависит от  $\mathcal{R}$ ; постоянная  $C$  не зависит от  $q, \mathcal{R}$ .

Доказательству теоремы предшествуют три вспомогательных утверждения.

**Предложение 2.** Для функции  $T_1 v$ , где  $v$  — решение уравнения (4.11), справедлива оценка  $\|T_1 v\|_{E^s(\rho)} \leq C\sqrt{q}$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Вычислим  $\mathcal{N}(v)$ . Поскольку  $v = Cq(\lambda + T)^{-1}P\zeta$ , где  $C$  — произвольная постоянная,  $\lambda = \lambda(q\nu)$ ,  $\nu = \nu(q)$  — функция, определяемая уравнением (4.12), имеем

$$\|v\|_2^2 = C \int \frac{q|p(\xi)\hat{\zeta}(\xi)|^2}{|(\xi^2 + q^2\nu^2)t_1(\xi, q\nu)|^2} d\xi.$$

После замены  $\xi = q\nu\kappa$  получаем  $\|v\|_2 \leq C/\sqrt{q}$ . Далее,

$$\|\hat{v}\|_1 = C \int \frac{q|p(\xi)\hat{\zeta}(\xi)|}{|(\xi^2 + q^2\nu^2)t_1(\xi, q\nu)|} d\xi \leq C.$$

Постоянная  $C$  не зависит от  $q$ . Следовательно,  $\mathcal{N}(v) = \|\hat{v}\|_1 \leq C < \infty$ . Далее утверждение предложения следует из леммы 1. Предложение доказано.

**Предложение 3.** Имеет место равенство

$$\lim_{\substack{q \rightarrow 0 \\ \tau \rightarrow 0}} (R_0 v, \zeta) = 0.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Воспользуемся представлением (4.20). Положив в (4.23)  $s = 0$  находим

$$|(V_q^{(1)}, \zeta)| \leq C \int \frac{q|p(\xi)\hat{\zeta}(\xi)|}{|\xi^2 + \alpha_*^2|} d\xi.$$

После замены  $\xi = \alpha_*\kappa$  получаем, что  $|(V_q^{(1)}, \zeta)| \leq C$  равномерно по  $q$ , откуда  $\tau(V_q^{(1)}, \zeta) \rightarrow 0$  при  $q, \tau \rightarrow 0$ . Аналогично  $\tau(V_{q,\tau}^{(2)}, \zeta) \rightarrow 0$ . Предложение доказано.

**Предложение 4.** Справедливо соотношение

$$\lim_{\substack{q \rightarrow 0 \\ \tau \rightarrow 0}} \frac{\partial f}{\partial \tau} \neq 0.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Зная точные выражения для оператора  $T_1$  и функции  $v$ , при помощи техники преобразования Фурье легко устанавливается равенство

$$\lim_{\substack{q \rightarrow 0 \\ \tau \rightarrow 0}} \frac{\partial}{\partial \tau} (T_1(q, \mu)\langle v + w \rangle, \zeta) = 0$$

(напомним,  $v$  от  $\tau$  не зависит). Далее,

$$\frac{\partial}{\partial \tau} (T_0(q, \mu)v, \zeta) = \frac{\partial}{\partial \tau} \int \frac{qp(\xi)|\hat{\zeta}(\xi)|^2 d\xi}{(\xi^2 + q^2\mu^2)t_1(\xi, q\mu)}. \quad (4.26)$$

Оценка (4.24) функции  $Z(\xi)$  позволяет почленно дифференцировать (4.26). Делая стандартную замену  $\xi = q\mu\kappa$ , в пределе при  $q, \tau \rightarrow 0$  получаем

$$\lim_{\substack{q \rightarrow 0 \\ \tau \rightarrow 0}} \frac{\partial f}{\partial \tau} = \frac{-t''(0)}{32\pi^2 p^2(0)\hat{\zeta}(0)} \neq 0.$$

Предложение доказано.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 2. СУЩЕСТВОВАНИЕ ФУНКЦИИ  $\tau(q, w)$ . Покажем, что к уравнению (4.25) применима теорема о неявной функции.

Из предложений 2 и 3 следует, что  $(\Psi, \zeta) \rightarrow 0$  при  $q, \tau \rightarrow 0$ .

Функция  $w$  принадлежит  $B(\mathcal{R})$ , откуда  $\mathcal{N}(w) \leq \mathcal{R}$ . Применив неравенство Коши — Шварца к слагаемому  $(T_1 w, \zeta)$ , получим  $f \rightarrow 0$  при  $q \rightarrow 0, \tau \rightarrow 0$ .

Согласно этому факту и предложению 4 для уравнения (4.25) выполнены условия теоремы о неявной функции, откуда вытекает, что отображение  $\tau : (0, q_2) \times B(\mathcal{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  определено, непрерывно дифференцируемо и обращает (4.25) в тождество.

ОЦЕНКИ ФУНКЦИИ  $\tau$ . Перепишем (4.25) с учетом формул (4.20):

$$-\tau(V_q^{(1)} + V_{q,\tau}^{(2)}, \zeta) = (T_1(q, \mu)(v + w), \zeta).$$

Здесь  $\mu = \nu(q) + \tau(q, w)$ . Легко показать, что

$$(V_q^{(1)}, \zeta) \xrightarrow{q \rightarrow 0} V_*^{(1)} \neq 0, \quad (V_{q,\tau}^{(2)}, \zeta) \xrightarrow{q \rightarrow 0} 0.$$

Константа  $V_*^{(1)}$  зависит от функций  $t(\xi), \zeta(\xi)$  и числа  $\nu_*$ . Очевидно, что для достаточно малых  $q$  справедливо неравенство

$$|(V_q^{(1)} + \tau V_{q,\tau}^{(2)}, \zeta)| \geq \frac{|V_*^{(1)}|}{2} > 0.$$

Отсюда

$$|\tau(q, w)| \leq C_0 \{\sqrt{q} + \|T_1 w\|_2\}, \quad (4.27)$$

что доказывает (б).

Далее, по правилу дифференцирования неявной функции имеем

$$\frac{\partial \tau}{\partial w} \langle \psi \rangle = - \left( \frac{\partial f}{\partial \tau} \right)^{-1} (T_1(q, \mu) \psi, \zeta).$$

Производная  $\partial f / \partial \tau$  непрерывна. Ее значение при  $q, \tau \rightarrow 0$  отлично от нуля. Следовательно, существует некоторая область  $q \in (0, q_2), w \in B(\mathcal{R})$ , где абсолютная величина этой производной больше некоторого положительного числа. Тогда

$$\left| \frac{\partial \tau}{\partial w} \langle \psi \rangle \right| \leq C |(T_1 \psi, \zeta)| \leq C \|T_1 \psi\|_2,$$

что и требовалось. Теорема доказана.

**3.2. Главная часть решения уравнения (4.18).** Существование и оценки функции  $\tau(q, w)$  гарантируют выполнение условия разрешимости (4.19). Положив в уравнении (4.18)  $\tau = \tau(q, w)$ , последнее можно решать независимо от (4.19).

Представим  $w = w_1 + w_2$ . Функцию  $w_1$  будем искать как решение уравнения

$$w_1 = \tau(q, w_1 + w_2) V_q^{(1)}. \quad (4.28)$$

Из (4.28) ясно, что  $w_1$  имеет вид  $w_1 = \mathcal{C} V_q^{(1)}$ . При этом постоянная  $\mathcal{C}$  находится из скалярного уравнения

$$\mathcal{C} = \tau(q, \mathcal{C} V_q^{(1)} + w_2). \quad (4.29)$$

**Лемма 4.** Существует  $q_3 \in (0, q_2)$  такое, что при  $q \in (0, q_3)$  и  $w_2 \in B(1)$  отображение

$$\Gamma(q, w_2, \mathcal{C}) = \tau(q, \mathcal{C}V_q^{(1)} + w_2)$$

(а) сжимающее по  $\mathcal{C}$ ;

(б) переводит множество  $(0, q_3) \times B(1) \times [-\beta\sqrt{q}, \beta\sqrt{q}]$  с некоторым  $\beta > 0$  ( $\beta$  зависит от функций  $t, \zeta$ ) в отрезок  $[-\beta\sqrt{q}, \beta\sqrt{q}]$ .

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Пусть  $\beta > 0$  — некоторое (конечное) число, не зависящее от  $q$ . Из представления  $w = w_1 + w_2$  и леммы 2 следует оценка

$$\|w\|_2 \leq \mathcal{C}\|V_q^{(1)}\|_2 + 1 \leq C\beta + 1.$$

Согласно теореме 2 существует число  $q_2$ , зависящее теперь от  $\beta$ , такое, что функция  $\tau(q, w)$  определена и обладает перечисленными в теореме 2 свойствами.

Неравенство (4.27) с учетом оценок из леммы 2 принимает вид

$$|\tau(q, w)| \leq C_0(\sqrt{q} + \|T_1 w_1\|_2 + \|T_1 w_2\|_2) \leq C_0\sqrt{q}[1 + C_1(1 + \beta\sqrt{q})]. \quad (4.30)$$

Здесь  $C_0$  — константа из оценки (4.27);  $C_1$  — константа из оценки оператора  $T_1$  (лемма 1). Эти постоянные зависят только от функций  $t$  и  $\zeta$ .

Положим  $\beta = 2C_0(1 + 2C_1)$ . Из (4.30) следует, что при  $0 < q < \min\{q_2, \frac{1}{\beta^2}\}$  значения функции  $\Gamma$  принадлежат отрезку  $[-\beta\sqrt{q}, \beta\sqrt{q}]$ .

Сжатие по  $\mathcal{C}$  вытекает из оценки для производной Фреше функции  $\tau$ . Действительно,

$$\begin{aligned} | \Gamma(q, w_2, \mathcal{C}_1) - \Gamma(q, w_2, \mathcal{C}_2) | &= | \tau(q, \mathcal{C}_1 V_q^{(1)} + w_2) - \tau(q, \mathcal{C}_2 V_q^{(1)} + w_2) | \\ &\leq |\mathcal{C}_1 - \mathcal{C}_2| \left| \frac{\partial \tau}{\partial w} \langle V_q^{(1)} \rangle \right| \leq C\sqrt{q} |\mathcal{C}_1 - \mathcal{C}_2| \mathcal{N}(V_q^{(1)}) \leq C_\zeta \sqrt{q} |\mathcal{C}_1 - \mathcal{C}_2|. \end{aligned}$$

Остается положить  $q_3 = \min\{q_2, \frac{1}{\beta^2}, \frac{1}{4C_\zeta^2}\}$ . Лемма доказана.

Таким образом, к уравнению (4.29) применим метод последовательных приближений: для всякого  $q \in (0, q_3)$  решение задачи (4.29) существует и однозначно определяется парой  $(q, w_2)$ . При этом отображение  $(q, w_2) \mapsto \mathcal{C}$  удовлетворяет условию Липшица с постоянной  $C_\zeta \sqrt{q}$ .

Также определено отображение  $(q, w_2) \mapsto w_1$ , обращающее (4.28) в тождество для указанных  $q$  и  $w_2$ ; кроме того,  $w_1$  как функция от  $(q, w_2)$  непрерывна по  $w_2$  с равномерной оценкой:

$$\|w_1(q, w_2) - w_1(q, \tilde{w}_2)\|_2 \leq C\|w_2 - \tilde{w}_2\|_2. \quad (4.31)$$

**3.3. Уравнение на  $w_2$ .** Полученные результаты позволяют перейти к заключительному этапу построения решения уравнения (3.1), а именно к нахождению функции  $w_2$ .

После подстановки  $w = w_1(q, w_2) + w_2$  в (4.18) с учетом (4.28) получаем

$$w_2 = T_1(q, \mu)w_2 + T_1(q, \mu)w_1(q, w_2) + T_1(q, \mu)v + \tau V_{q, \tau}^{(2)}, \quad (4.32)$$

где  $\tau = \tau(q, w_1(q, w_2) + w_2)$ ,  $\mu = \nu(q) + \tau$ .

**Лемма 5.** Для достаточно малых  $q$  отображение

$$\Upsilon_q(w_2) = T_1(q, \mu)w_2 + T_1(q, \mu)w_1(q, w_2) + T_1(q, \mu)v + \tau V_{q, \tau}^{(2)}$$

- (а) сжимающее в  $L_2(\mathbb{R})$ ;  
 (б) переводит единичный шар  $B(1)$  в себя.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Разность  $\Upsilon_q(w_2) - \Upsilon_q(\tilde{w}_2)$  представима в виде

$$\Upsilon_q(w_2) - \Upsilon_q(\tilde{w}_2) = \sum_{i=1}^7 \Upsilon_q^{(i)}(w_2, \tilde{w}_2),$$

со слагаемыми  $\Upsilon_q^{(i)}(w_2, \tilde{w}_2)$ , определяемыми по формулам

$$\begin{aligned} \Upsilon_q^{(1)}(w_2, \tilde{w}_2) &= T_1(q, \mu)\langle w_2 - \tilde{w}_2 \rangle, & \Upsilon_q^{(2)}(w_2, \tilde{w}_2) &= R_1(q, \mu, \tilde{\mu})\tilde{w}_2, \\ \Upsilon_q^{(3)}(w_2, \tilde{w}_2) &= T_1(q, \mu)\langle w_1 - \tilde{w}_1 \rangle, & \Upsilon_q^{(4)}(w_2, \tilde{w}_2) &= R_1(q, \mu, \tilde{\mu})w_1, \\ \Upsilon_q^{(5)}(w_2, \tilde{w}_2) &= R_1(q, \mu, \tilde{\mu})v, & \Upsilon_q^{(6)}(w_2, \tilde{w}_2) &= (\tau - \tilde{\tau})V_{q, \tau}^{(2)}, \\ \Upsilon_q^{(7)}(w_2, \tilde{w}_2) &= \tau[V_{q, \tau}^{(2)} - V_{q, \tilde{\tau}}^{(2)}], \end{aligned}$$

где  $\tau = \tau(q, w_1 + w_2)$ ,  $\tilde{\tau} = \tau(q, \tilde{w}_1 + \tilde{w}_2)$ ,  $\mu = \nu(q) + \tau$ ,  $\tilde{\mu} = \nu(q) + \tilde{\tau}$ ,  $w_1 = w_1(q, w_2)$ ,  $\tilde{w}_1 = w_1(q, \tilde{w}_2)$ .

Для сокращения выкладок целесообразно ввести классы  $C(\alpha)$ .

Будем говорить, что функция  $f_q(u_1, u_2)$  со значениями из  $L_2(\mathbb{R})$  и областью определения  $B(1) \times B(1)$ , где  $q \in (0, q_3)$ , принадлежит классу  $C(\alpha)$ , если для всех допустимых  $q, u_1, u_2$  выполняется неравенство

$$\|f_q(u_1, u_2)\|_2 \leq Cq^\alpha \|u_1 - u_2\|_2$$

с не зависящей от  $q$  постоянной  $C$ .

Таким образом, для доказательства того, что отображение  $\Upsilon_q$  сжимающее, достаточно проверить справедливость включений  $\Upsilon_q^{(i)} \in C(\alpha_i)$  с некоторыми положительными  $\alpha_i$ ,  $i = 1 \div 7$ .

Поскольку  $w_2, \tilde{w}_2 \in B(1)$ , по свойствам оператора  $T_1$  (лемма 1) и отображения  $w_1(q, w_2)$  слагаемые  $\Upsilon_q^{(1)}, \Upsilon_q^{(3)}$  принадлежат  $C(1/2)$ . Далее, по теореме 2, лемме 3 и неравенству (4.31)

$$\|\Upsilon_q^{(2)}(w_2, \tilde{w}_2)\|_2 \leq C\sqrt{q}|\mu - \tilde{\mu}| \leq Cq\|w_2 - \tilde{w}_2\|_2,$$

т. е.  $\Upsilon_q^{(2)} \in C(1)$ . Аналогично  $\Upsilon_q^{(4)} \in C(1)$ .

Как было установлено,  $\mathcal{N}(v) \leq C$  равномерно по  $q$ , поэтому согласно теореме 2 и лемме 3  $\Upsilon_q^{(5)} \in C(1)$ .

Слагаемые  $\Upsilon_q^{(6)}, \Upsilon_q^{(7)}$  согласно лемме 2 и теореме 2 принадлежат  $C(1/2)$ . Замечая, что  $C(1/2) \supset C(1)$ , получаем окончательно

$$\sum_{i=1}^7 \Upsilon_q^{(i)} \in C(1/2). \quad (4.33)$$

Для доказательства второго утверждения леммы достаточно положить  $\tilde{w}_2 = 0$ . Из (4.33) вытекает  $\|\Upsilon_q(w_2)\|_2 \leq Cq^{1/2}\|w_2\|_2$ . Лемма доказана.

**Теорема 3.** Существует  $q_4 > 0$  такое, что при всех  $q \in (0, q_4)$  уравнение (4.32) имеет единственное решение из единичного шара пространства  $L_2(\mathbb{R})$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО немедленно следует из леммы 5 и принципа сжимающих отображений.

Таким образом, решение уравнения (3.1) имеет вид  $u = v + w$ , где  $v = Cq(\lambda(q\nu) + T)^{-1}P\zeta$ , а  $w$  однозначно находится из уравнений (4.28) и (4.32).

В силу того, что  $L_2(\mathbb{R})$ -нормы составляющих  $u$  слагаемых суть величины порядка  $O(q^{-1/2})$  и  $O(1)$  соответственно, собственная функция  $u$  отлична от нуля. Однократность собственного числа следует из принципа сжимающих отображений.

Для доказательства принадлежности функции  $u$  пространству  $E^s(\rho)$  покажем, что линейный оператор  $(\lambda + T)^{-1}P\{qL + q^2M\}$  переводит функции из  $L_2(\mathbb{R})$  в  $E^s(\rho)$  с любым  $s \geq 0$  и  $\rho \leq q\nu_*/4$  с оценкой

$$\|(\lambda + T)^{-1}P\{qL + q^2M\}w\|_{E^s(\rho)} \leq \frac{C_s}{\sqrt{q}}\|w\|_2.$$

Действительно, имеет место представление

$$(\lambda + T)^{-1}P\{qL + q^2M\} = T_0(q, \mu) + T_1(q, \mu).$$

Заметим, что  $\mathcal{N}(w) \leq \|w\|_2$ . Согласно лемме 1

$$\|T_1w\|_{E^s(\rho)} \leq C\sqrt{q}\mathcal{N}(w) \leq C\sqrt{q}\|w\|_2.$$

Для оценки конечномерного оператора  $T_0$  воспользуемся его явным представлением (4.8). Имеем

$$|\widehat{T_0w}(\xi)| \leq C_\zeta\|w\|_2 \left| \frac{qp(\xi)\hat{\zeta}(\xi)}{(\xi^2 + q^2\mu^2)t_1(\xi, q\mu)} \right|.$$

Из свойств функций  $p(\xi)$ ,  $l_1(\xi)$ ,  $l_2(\xi, \eta)$  и неравенства (4.2) вытекает, что

$$|\lambda^s(\xi)\widehat{T_0w}(\xi)| \leq C_{p,\zeta,s}\|w\|_2 \frac{q}{|\xi^2 + q^2\mu^2|}.$$

Осталось заметить, что  $\mu \in [\nu_*/2, 3\nu_*/2]$ , и сослаться на предложение 1. Из (4.10) следует, что  $u \in E^s(\rho)$  с любым  $s \geq 0$  и  $\rho \leq q\nu_*/4$ . Теорема 1 доказана.

**Лемма 6.** При  $s > 0$ ,  $\rho > 0$  оператор вложения  $E^s(\rho) \subset L_2(\mathbb{R})$  вполне непрерывен.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть  $\mathcal{J}$  — ограниченное множество в  $E^s(\rho)$ . Выберем произвольно последовательность  $\{\psi_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{J}$ . Требуется показать, что из нее можно извлечь сходящуюся в  $L_2(\mathbb{R})$  подпоследовательность.

Для положительных  $\mathcal{M}$  и  $\varkappa(x) \in C^\infty[0, 1]$  такой, что  $\varkappa(0) = 1$ ,  $\varkappa(1) = 0$ , определим функции  $\bar{\psi}_n, \tilde{\psi}_n$ :

$$\bar{\psi}_n = \psi_n - \tilde{\psi}_n, \quad \tilde{\psi}_n = \begin{cases} \psi_n(x), & |x| < \mathcal{M}, \\ \psi_n(x)\varkappa(|x| - \mathcal{M}), & |x| \in [\mathcal{M}, \mathcal{M} + 1], \\ 0, & |x| > \mathcal{M} + 1. \end{cases}$$

Тогда

$$\|\psi_n - \psi_m\|_2 \leq \|\tilde{\psi}_n - \tilde{\psi}_m\|_2 + \|\bar{\psi}_n - \bar{\psi}_m\|_2. \quad (4.34)$$

Поскольку  $\rho > 0$  и  $\|e^{\rho|x|}\psi_n(x)\|_2 < \infty$ , имеем

$$\|\bar{\psi}_n\|_2 \leq Ce^{-\rho(\mathcal{M}+1)}\|\psi_n\|_{E^s(\rho)}.$$

Значит, в силу ограниченности  $\mathcal{J}$

$$\|\bar{\psi}_n - \bar{\psi}_m\|_2 \leq Ce^{-\rho(\mathcal{M}+1)}(\|\psi_n\|_{E^s(\rho)} + \|\psi_m\|_{E^s(\rho)}) \leq Ce^{-\rho(\mathcal{M}+1)}.$$

Из последней оценки следует, что при достаточно большом  $\mathcal{M}$  и всех  $n$  второе слагаемое в правой части (4.34) будет меньше произвольного  $\varepsilon > 0$ .

Далее, для всякого ограниченного множества  $\mathcal{Q} \subset \mathbb{R}^n$  оператор вложения  $H_0^s(\mathcal{Q}) \subset L_2(\mathcal{Q})$  компактен при указанных  $s$  [9] ( $H_0^s$  — пространства Соболева — Шварца).

Пусть  $\mathcal{Q} = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| < \mathcal{M} + 1\}$ . Поскольку  $\tilde{\psi}_n \in H_0^s(\mathcal{Q})$ , согласно вышеизложенному существует сходящаяся в  $L_2(\mathcal{Q})$  подпоследовательность  $\{\tilde{\psi}_{n_k}\}_{k \geq 1}$ .

Из определения  $\tilde{\psi}_n$  вытекает равенство  $\|\tilde{\psi}_n - \tilde{\psi}_m\|_2 = \|\tilde{\psi}_n - \tilde{\psi}_m\|_{L_2(\mathcal{Q})}$ , поэтому на указанной подпоследовательности первое слагаемое в правой части (4.34) не будет превосходить  $\varepsilon$  при достаточно больших  $k$ .

Таким образом, подпоследовательность  $\{\psi_{n_k}\}_{k \geq 1}$  фундаментальна в  $L_2(\mathbb{R})$ , что и требовалось. Лемма доказана.

**Теорема 4.** При выполнении условий теоремы 1 задача (3.1) фредгольмова в  $L_2(\mathbb{R})$ .

Доказательство следует из существования и ограниченности в  $L_2(\mathbb{R})$  оператора  $(\lambda + T)^{-1}$ , включения  $P\{L + M\} \in E^{-\infty}(\rho)$  и леммы 6.

## 5. Линейные стационарные волны над подводным хребтом

Рассмотрим (линеаризованную) задачу о гравитационно-капиллярных волнах, бегущих вдоль подводного хребта.

Пусть область течения  $\Omega$  лежит в пространстве точек  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ , ограничена сверху «свободной поверхностью»  $z = 0$ , снизу — дном  $z = -1 + qh(x)$  ( $q > 0$  — малый параметр). Будем считать, что задающая форму дна функция  $h(x)$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , финитна и бесконечно дифференцируема.

Линейная задача о бегущих с постоянной скоростью  $a$  поверхностных гравитационно-капиллярных волнах малой амплитуды для идеальной несжимаемой безвихревой жидкости в терминах потенциала течения  $\Phi(x, y, z)$  в безразмерных переменных формулируется следующим образом [10].

Требуется определить гармоническую в области  $\Omega$  функцию  $\Phi$ :

$$\Delta\Phi = 0, \quad (x, y, z) \in \Omega, \quad (5.1)$$

удовлетворяющую «условию непротекания» ( $\mathbf{n}$  — внешняя нормаль к твердой границе  $\Omega$ )

$$\frac{\partial\Phi}{\partial\mathbf{n}} = 0, \quad z = -1 + qh(x) \quad (5.2)$$

и краевому условию на «свободной поверхности»

$$(1 - \Delta)\Phi_z + a^2\Phi_{yy} = 0, \quad z = 0. \quad (5.3)$$

Здесь  $a$  — постоянная скорость волны. Ускорение силы тяжести  $g$ , плотность жидкости  $\rho$  и коэффициент поверхностного натяжения  $\sigma$  приняты равными единице.

Так действительно можно сделать, поскольку  $g$  и  $\rho$  переходят в единицу путем растяжения независимых переменных и функций. При этом перед оператором  $\Delta$  возникает, вообще говоря, неединичный множитель. Как будет показано ниже, при реализации описанной в предыдущих пунктах схемы ветвления неважно, есть капиллярность или ее нет. Поэтому при учете капиллярных эффектов  $\sigma$  полагается равным единице, в противном случае — нулю.

Поскольку нас интересуют только периодические по  $y$  решения, представим  $\Phi$  в виде  $\Phi = e^{i\omega y} \varphi(x, z)$ . После подстановки в (5.1)–(5.3) приходим к следующей краевой задаче для функции  $\varphi$ :

$$\begin{aligned} \varphi_{xx} + \varphi_{zz} - \omega^2 \varphi &= 0, & -1 < z < 0, \\ \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{n}} &= 0, & z = -1 + qh(x), \\ (1 + \omega^2 - D_x^2) \varphi_z - a^2 \omega^2 \varphi &= 0, & z = 0. \end{aligned} \quad (5.4)$$

Краевая задача (5.4) может быть записана в виде одного операторного уравнения для функции  $u(x) = \varphi(x, 0)$ :

$$(1 + \omega^2 - D_x^2) Ku - a^2 \omega^2 u = 0, \quad (5.5)$$

где линейный оператор «нормальная производная»  $K$  сопоставляет каждой функции  $u$  величину  $Ku = \partial \varphi / \partial z$  при  $z = 0$ . Здесь  $\varphi$  — решение смешанной краевой задачи

$$\begin{aligned} \varphi_{xx} + \varphi_{zz} - \omega^2 \varphi &= 0, & -1 < z < 0, \\ \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{n}} &= 0, & z = -1 + qh(x), \\ \varphi &= u, & z = 0. \end{aligned} \quad (5.6)$$

Для аналитической функции  $f$  псевдодифференциальный оператор  $f(|\nabla|)$  задается символом  $f(\theta(\xi))$ , где  $\theta(\xi) = (\xi^2 + \omega^2)^{1/2}$ .

**Лемма 7.** При достаточно малых  $q$  линейный оператор  $K$  допускает представление  $K = K_0 + qK_1 + O(q^2)$ , где  $K_0 = |\nabla| \operatorname{th} |\nabla|$ ,  $K_1 = D_x \Lambda h D_x \Lambda + D_y^2 \Lambda h \Lambda$ ,  $\Lambda = \operatorname{ch}^{-1} |\nabla|$ .

Строгое доказательство леммы не приводится в силу его громоздкости. Ограничимся формальными рассуждениями.

Легко убедиться, что функция

$$\varphi_0(x, z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{ix\xi} \hat{u}(\xi) \frac{\operatorname{ch}[(z+1)\theta(\xi)]}{\operatorname{ch} \theta(\xi)} d\xi$$

— решение краевой задачи (5.6) с  $q = 0$ . Отсюда сразу следует равенство  $\widehat{K_0 u}(\xi) = \hat{u}(\xi) \theta(\xi) \operatorname{th} \theta(\xi)$ , или  $K_0 = |\nabla| \operatorname{th} |\nabla|$ .

Введем вспомогательную функцию

$$E(\xi, x, z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-ix\xi} \frac{\operatorname{ch}[(z+1)\theta(\xi)]}{\operatorname{ch} \theta(\xi)}.$$

Обозначим  $\Sigma_q = \{(x, z) | z \in (-1 + qh(x), 0)\}$  и определим оператор  $\Delta$  формулой  $\Delta = D_x^2 + D_z^2 - \omega^2$ . Тогда  $\Delta E = 0$  в области  $\Sigma_q$  при  $q \geq 0$ .

Пусть  $\varphi_q$  — решение задачи (5.6). Из формулы Грина

$$0 = \int_{\Sigma_q} (E \Delta \varphi_q - \varphi_q \Delta E) d\Sigma_q = \int_{\partial \Sigma_q} \left\{ E \frac{\partial \varphi_q}{\partial \mathbf{n}} - \varphi_q \frac{\partial E}{\partial \mathbf{n}} \right\} dS$$

следует выражение для  $D_z \widehat{\varphi}_q(\xi, 0) = \widehat{Ku}(\xi)$ :

$$\widehat{Ku}(\xi) = \int_{z=0} u \frac{\partial E}{\partial z} dx - \int_{z=-1+qh(x)} \varphi_q \left\{ \frac{\partial E}{\partial z} - qh' \frac{\partial E}{\partial x} \right\} (1 + q^2 h'^2)^{1/2} dx.$$

Сделаем во втором интеграле замену переменных, положив  $z = \bar{z}[1 - qh(x)]$ . Тогда получим (черта опущена)

$$\begin{aligned} \widehat{Ku}(\xi) &= \hat{u}(\xi)\theta(\xi) \operatorname{th} \theta(\xi) \\ &- \frac{q}{\sqrt{2\pi} \operatorname{ch} \theta(\xi)} \int_{z=-1} \varphi_q(x, z) \left\{ \frac{\theta(\xi) \operatorname{sh} [q\theta(\xi)h(x)]}{q} + i\xi h'(x) \operatorname{ch} [q\theta(\xi)h(x)] \right\} \\ &\quad \times [1 + q^2 h'^2(x)]^{1/2} e^{-ix\xi} dx. \end{aligned}$$

Почленный переход к пределу при  $q \rightarrow 0$  в последнем интеграле с учетом равенства

$$\lim_{\substack{z \rightarrow -1 \\ q \rightarrow 0}} \widehat{\varphi}_q(\xi, z) = \frac{\hat{u}(\xi)}{\operatorname{ch} \theta(\xi)}$$

дает

$$\widehat{Ku}(\xi) = \hat{u}(\xi)\theta(\xi) \operatorname{th} \theta(\xi) - \frac{q}{\sqrt{2\pi}} \int \frac{\xi\xi_1 + \eta^2}{\operatorname{ch} \theta(\xi) \operatorname{ch} \theta(\xi_1)} \hat{h}(\xi - \xi_1) \hat{u}(\xi_1) d\xi_1 + O(q^2).$$

Согласно введенным обозначениям  $K_1 = D_x \Lambda h D_x \Lambda + D_y^2 \Lambda h \Lambda$ .

Нули функции  $\theta(\xi) = (\xi^2 + \omega^2)^{1/2}$  расположены в точках  $\xi = \pm i\omega$ . Если  $\rho \leq \omega/2$ , то  $|\theta(\xi)| \geq C > 0$  равномерно по  $\xi \in \Pi_\rho$ .

В силу очевидного неравенства  $|\theta(\xi)|^p \leq C_\rho |\lambda(\xi)|^p$  ( $\xi \in \Pi_\rho$ ) порядок оператора  $|\nabla|$  равен 1, а поскольку  $|\operatorname{th} \theta(\xi)| = O(1)$ , то  $K_0 \in E^1(\rho)$ .

Функция  $\operatorname{ch} \theta(\xi)$  не имеет нулей в  $\Pi_\rho$ , а ее модуль ведет себя, как  $\exp\{|\operatorname{Re} \xi|\}$ . Следовательно, оператор  $\Lambda$  лежит в классе  $E^{-\infty}(\rho)$ .

Пользуясь разложением оператора  $K$  (лемма 7), запишем уравнение (5.5) (с точностью до квадратичных по  $q$  членов) в виде

$$PK_0 u - a^2 \omega^2 u = -qPK_1 u. \quad (5.7)$$

Здесь  $P = 1 + \omega^2 - D_x^2$ . Обозначим  $T = PK_0$ ,  $L = -K_1$ . Тогда задача (5.7) примет вид (3.1) с оператором  $M = 0$ .

**Теорема 5.** Пусть

$$\int h(x) dx > 0.$$

Тогда для любого  $\omega > 0$  существует  $q_* > 0$  такое, что при  $q \in (0, q_*)$  уравнение (5.7) имеет простое собственное число  $a \neq 0$ , непрерывно дифференцируемое по  $q$ . Соответствующая ему собственная функция принадлежит пространству  $E^s(\rho)$ ,  $s \geq 0$ ,  $\rho = O(q)$ .

Доказательство сводится к проверке выполнения условий 1–3 п. 3, (а)–(е) п. 4 и теоремы 1.

Символы операторов  $P$  и  $T$  суть соответственно функции

$$p(\xi) = 1 + \theta^2(\xi), \quad t(\xi) = p(\xi)\theta(\xi) \operatorname{th} \theta(\xi). \quad (5.8)$$

Свойства 1, 2 п. 3 для функций  $p(\xi)$ ,  $t(\xi)$  очевидны.

Пусть  $\lambda = -a^2\omega^2$  задается формулой  $\lambda = -t(i\rho)$ . Для проверки свойства 3 заметим, что функция  $\tau(\xi) = t(\xi) - t(i\rho)$  может обращаться в нуль только в тех точках полосы  $\Pi_\rho$ , где  $\text{Im}\{t(\xi)\} = 0$ . Множество точек  $\xi$ , удовлетворяющих этому уравнению, — это либо действительная ось, либо мнимая ось.

Рассмотрим случай  $\text{Re } \xi = 0$ . Задача сводится к исследованию знакопостоянства функции

$$f(\eta) = \tau(i\eta) \equiv [\theta^2(i\eta) + 1]\theta(i\eta) \text{th } \theta(i\eta) - [\theta^2(i\rho) + 1]\theta(i\rho) \text{th } \theta(i\rho)$$

на интервале  $\eta \in [-\rho, \rho]$ . Функция  $f(\eta)$  строго убывает при  $\eta > 0$  и  $f(0) > 0$ . В силу ее четности нулевые значения принимаются только на концах интервала в точках  $\eta = \pm\rho$ .

Если  $\text{Im } \xi = 0$ , то  $\tau(\xi)$  строго возрастает при положительных  $\xi$ , является четной и ее значение в нуле положительно. Таким образом, все условия п. 3 для определенной формулой (5.8) функции  $t(\xi)$  выполнены.

Проверим свойства (a)–(d) оператора  $L$  (оператор  $M$  в данном случае равен нулю). Имеем

$$\widehat{Lu}(\xi) = l_1(\xi) \int l_1(\eta) l_2(\xi, \eta) \hat{u}(\eta) d\eta,$$

где

$$l_1(\xi) = \frac{1}{\text{ch } \theta(\xi)}, \quad l_2(\xi, \eta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (\xi\eta + \omega^2) \hat{h}(\xi - \eta).$$

Условия (a), (b), очевидно, выполнены. Далее, по свойствам преобразования Фурье  $\hat{f}(\xi) = \hat{f}(-\xi)$ , откуда следует справедливость (c). Наконец, (d) вытекает из тождества

$$(\xi\eta + \omega^2) \hat{h}(\xi - \eta) - \omega^2 \hat{h}(-\eta) \equiv \xi[(\eta - \xi) + \xi] \hat{h}(\xi - \eta) + \omega^2 [\hat{h}(\xi - \eta) - \hat{h}(-\eta)]$$

и очевидных неравенств

$$|\hat{h}(\xi - \eta) - \hat{h}(-\eta)| \leq C|\xi| \max_{\xi_1 \in \Pi_\rho} |\hat{h}'(\xi_1)| \leq C_h|\xi|; \quad \max_{\xi_1 \in \Pi_\rho} |(1 + \xi_1) \hat{h}(\xi_1)| \leq C_h.$$

Число  $l$  при этом равно 1.

Остается показать, что  $p(0)\hat{\zeta}(0)/t''(0) > 0$ . Имеем

$$p(0) = 1 + \omega^2 > 0, \quad t''(0) = \frac{\omega^2 + 1}{\text{ch}^2 \omega} + \frac{3\omega^2 + 1}{\omega} \text{th } \omega > 0.$$

Как ранее отмечалось, преобразование Фурье функции  $\psi(x) = (2\pi)^{-1/2}$  есть  $\delta$ -функция, откуда

$$\hat{\zeta}(\xi) = \frac{\omega^2 \hat{h}(\xi)}{\sqrt{2\pi} \text{ch } \theta(\xi) \text{ch } \omega}.$$

Знак  $\hat{\zeta}(0)$  совпадает со знаком  $\hat{h}(0) = (2\pi)^{-1/2} \int h(x) dx$ .

По теореме 1 у уравнения (5.7) при любом положительном  $\omega$  есть экспоненциально убывающее с показателем  $\rho = O(q)$  решение, определяемое с точностью до постоянного множителя. Собственное число  $\lambda = -a^2\omega^2$  — непрерывно дифференцируемая функция параметра  $q$ . Теорема доказана.

**ЗАМЕЧАНИЕ 1.** Если взять поверхностное натяжение  $\sigma \neq 1$ , то символом  $p(\xi)$  оператора  $P = 1 + \sigma(\omega^2 - D_x^2)$  будет функция  $p(\xi) = 1 + \sigma\theta^2(\xi)$ , для которой также будут выполнены все условия теоремы 1.

ЗАМЕЧАНИЕ 2. Заключение теоремы 5 остается в силе, если  $\sigma = 0$  (капиллярность отсутствует).

Действительно, в этом случае в уравнении (5.7) оператор  $P$  тождественный с символом  $p(\xi) = 1$ . Проверка условий теоремы 1 проводится изложенным в доказательстве теоремы 5 способом.

Таким образом, вдоль неровностей дна типа подводного хребта распространяются бегущие волны, амплитуда которых экспоненциально затухает с малым показателем  $\rho > 0$  в перпендикулярном к хребту направлении. При этом условию теоремы 5 (положительность интеграла от функции  $h(x)$ ) можно дать механическую трактовку: в сечении дна плоскостью, перпендикулярной к хребту, суммарная площадь возвышений (относительно прямой линии дна на бесконечности) должна быть больше общей площади впадин.

В заключение автор пользуется случаем выразить благодарность В. И. Налимову за постоянное внимание и поддержку при выполнении работы.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Рид М., Саймон Б. Методы современной математической физики. М.: Мир., 1982. Т. 4.
2. Налимов В. И., Плотников П. И. Нерегулярные задачи на собственные значения и эффект волновода // Динамика сплошной среды. 1975. № 23. С. 132–150.
3. Munk W. H., Arthur R. S. Wave intensity along a refracted ray // Gravity Waves., Nat. Bur. Standarts, Circ. 1952.
4. Гарипов Р. М. Неустановившиеся волны над подводным хребтом // Докл. АН СССР. 1965. Т. 161, № 3. С. 547–550.
5. Гарипов Р. М. Асимптотика волн Коши — Пуассона // Некоторые проблемы математики и механики. Л.: Наука, 1970. С. 135–145.
6. Биченков Е. И., Гарипов Р. М. Распространение волн на поверхности тяжелой жидкости в бассейне с неровным дном // Прикл. механика и мат. физика. 1969. № 2. С. 21–26.
7. Хёрмандер Л. Линейные дифференциальные операторы с частными производными. М.: Мир, 1965.
8. Налимов В. И. Псевдодифференциальные операторы с аналитическими символами // Сиб. мат. журн. 1997. Т. 38, № 3. С. 627–637.
9. Берс Л., Джон Ф., Шехтер М. Уравнения с частными производными. М.: Мир, 1966.
10. Стокер Дж. Волны на воде. М.: Изд-во иностр. лит., 1959.

*Статья поступила 17 мая 2000 г., окончательный вариант — 6 марта 2001 г.*

*Кузнецов Дмитрий Сергеевич*

*Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск 630090*

*kudims@hydro.nsc.ru*