

О ПОРЯДКОВО ОГРАНИЧЕННЫХ ОПЕРАТОРАХ, СОХРАНЯЮЩИХ ДИЗЪЮНКТНОСТЬ

А. Г. Кусраев, С. С. Кутателадзе

Аннотация. Цель статьи — показать, что некоторые свойства порядково ограниченных операторов в векторных решетках являются просто булевозначными интерпретациями элементарных свойств порядково ограниченных функционалов. Описана технология анализа и приведены новые результаты о порядково ограниченных операторах, сохраняющих дизъюнктность.

Ключевые слова: булевозначный анализ, векторная решетка, оператор, сохраняющий дизъюнктность; решеточный гомоморфизм.

Ю. Г. Решетняку к 85-летию

§ 1. Введение

Рассматриваются некоторые свойства порядково ограниченных операторов в векторных решетках, представляющие собой булевозначные интерпретации элементарных свойств порядково ограниченных функционалов. Мы ограничиваем изложение операторами, сохраняющими дизъюнктность, и исследуем три задачи: характеристику операторов, сохраняющих дизъюнктность в терминах ядер; условия n -дизъюнктности сумм операторов, сохраняющих дизъюнктность; описание n -дизъюнктных множеств операторов.

Булевозначный анализ не только связан с многими топологическими и геометрическими идеями, но также дает технику для расширения содержания уже имеющихся теорем. Каждая теорема, доказанная классическими методами, приобретает некоторое новое неочевидное содержание, связанное с «переменными множествами». Говоря более строго, каждая из имеющихся теорем порождает целое семейство скрытых «близких родственников», занумерованных всеми булевыми алгебрами или, что эквивалентно, негомеоморфными пространствами Стоуна. Эти методы просты, наглядны и легки в применении. Поэтому они могут быть полезны работающему математику.

Структура статьи следующая. В § 2 содержится набросок булевозначного аппарата, позволяющего сводить некоторые задачи, касающиеся операторов в пространствах Канторовича (порядково полных векторных решетках), к рассмотрению функционалов. В § 3 иллюстрируется использование метода характеристики линейных и билинейных операторов, сохраняющих дизъюнктность, в терминах ядер их слоев. В § 4 мы занимаемся следующим вопросом: при каких условиях сумма порядково ограниченных операторов, сохраняющих дизъюнктность, является n -дизъюнктным оператором? В § 5 вводится понятие n -дизъюнктного множества операторов и дается полное описание максимальных n -дизъюнктных множеств порядково ограниченных операторов.

Обозначим символом $:=$ оператор присваивания. Пусть символы \mathbb{N} и \mathbb{R} означают множества натуральных и вещественных чисел соответственно. Всюду ниже \mathbb{B} — полная булева алгебра с супремумом \vee , инфимумом \wedge , дополнением $(\cdot)^*$, единицей $\mathbb{1}$ и нулем $\mathbb{0}$; алгебраическая операция \Rightarrow в \mathbb{B} определяется как $x \Rightarrow y := x^* \vee y$. Разбиение единицы в \mathbb{B} — это семейство $(b_\xi)_{\xi \in \Xi} \subset \mathbb{B}$ такое, что $\bigvee_{\xi \in \Xi} b_\xi = \mathbb{1}$ и $b_\xi \wedge b_\eta = \mathbb{0}$ при $\xi \neq \eta$. Мы используем \implies для обозначения импликации, в то время как употребление в теоретико-множественных формулах \rightarrow вместо \implies означает, что формула интерпретируется в булевозначном универсуме.

Всюду далее под *векторной решеткой* будем подразумевать архимедову вещественную векторную решетку. Обозначим булеву алгебру проекторов на компоненты в векторной решетке X символом $\mathbb{P}(X)$, и пусть символы $\mathcal{Z}(X)$ и $\text{Orth}(X)$ обозначают *идеальный центр* решетки X и *f-алгебру ортоморфизмов* на X соответственно. *Универсальное пополнение* X^{u} векторной решетки X всегда рассматривается как полупростая f -алгебра, умножение в которой однозначно определяется фиксированием порядковой единицы как единицы кольца. Пространство всех порядково ограниченных линейных операторов из X в Y обозначим символом $L^{\sim}(X, Y)$. Теорема Рисса — Канторовича утверждает, что если Y — пространство Канторовича, то $L^{\sim}(X, Y)$ обладает тем же свойством.

Линейный оператор T из X в Y называют *решеточным гомоморфизмом*, если T сохраняет решеточные операции, т. е. $T(x_1 \vee x_2) = Tx_1 \vee Tx_2$ (и потому $T(x_1 \wedge x_2) = Tx_1 \wedge Tx_2$) для всех $x_1, x_2 \in X$. Векторные решетки X и Y *решеточно изоморфны*, если существует *решеточный изоморфизм* T из X на Y , т. е. T и T^{-1} — решеточные гомоморфизмы.

Необходимую информацию из теории порядково ограниченных операторов можно найти в [1–4]; о булевозначных моделях теории множеств — в [5, 6] и о булевозначном анализе — в [7, 8].

§ 2. Сведения из теории булевозначных моделей и булевозначного анализа

В этом параграфе кратко изложим некоторые вспомогательные утверждения о структуре булевозначных моделей и работы с ними. Детали можно найти в [7, 8].

2.1. Пусть \mathbb{B} — полная булева алгебра, и пусть On — класс всех ординалов. *Булевозначный универсум* $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ или, другими словами, *универсум булевозначных множеств* — это класс $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})} := \bigcup_{\alpha \in \text{On}} \mathbb{V}_\alpha^{(\mathbb{B})}$, где семейство $(\mathbb{V}_\alpha^{(\mathbb{B})})_{\alpha \in \text{On}}$ определяется рекурсивно:

$$\mathbb{V}_\alpha^{(\mathbb{B})} := \{ x : x \text{ — функция } \wedge (\exists \beta)(\beta < \alpha \wedge \text{dom}(x) \subset \mathbb{V}_\beta^{(\mathbb{B})} \wedge \text{im}(x) \subset \mathbb{B}) \}.$$

Для формулировки утверждений об элементах $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ рассмотрим произвольную формулу $\varphi = \varphi(u_1, \dots, u_n)$ языка теории множеств и заменим переменные u_1, \dots, u_n элементами $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$. Тогда получим некоторое утверждение об объектах (= булевозначных множествах) x_1, \dots, x_n . На $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ задан естественный способ сопоставления каждому такому утверждению некоторого элемента $\llbracket \varphi(x_1, \dots, x_n) \rrbracket \in \mathbb{B}$, действующему как «булева оценка истинности» формулы $\varphi(u_1, \dots, u_n)$ в универсуме $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$. Оценка истинности определяется по индукции с учетом способа построения формул из атомарных формул $x \in y$ и $x = y$ и естественным выбором оценок истинности $\llbracket x \in y \rrbracket \in \mathbb{B}$ и $\llbracket x = y \rrbracket \in \mathbb{B}$, где $x, y \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$.

В дальнейшем работаем с *отделимым универсумом* $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$, т. е. считаем, что соотношения $x = y$ и $\llbracket x = y \rrbracket = \mathbf{1}$ равносильны для $x, y \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$.

Говорят, что утверждение $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ *истинно* или что элементы x_1, \dots, x_n *обладают свойством* φ в $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$, если $\llbracket \varphi(x_1, \dots, x_n) \rrbracket = \mathbf{1}$. В этом случае мы пишем $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})} \models \varphi(x_1, \dots, x_n)$.

Пара $(\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}, \llbracket \cdot \rrbracket)$ называется *булевозначной моделью ZFC* (теории Цермело — Френкеля с аксиомой выбора). Важнейшие свойства булевозначной модели сформулированы в четырех фундаментальных принципах (см. [5–7]).

2.2. Принцип переноса. Если $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ — теорема ZFC, то

$$(\forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}) \mathbb{V}^{(\mathbb{B})} \models \varphi(x_1, \dots, x_n)$$

также теорема ZFC.

Допуская вольность, этот результат также записывают в виде $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})} \models$ «теорема ZFC» или $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})} \models \text{ZFC}$. При этом говорят, что $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ *является булевозначной моделью ZFC*.

2.3. Принцип максимума. Для каждой формулы $\varphi(u, x_1, \dots, x_n)$ языка теории множеств в ZFC доказуемо утверждение: для любого набора $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ существует элемент $x_0 \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ такой, что

$$\llbracket (\exists u) \varphi(u, x_1, \dots, x_n) \rrbracket = \llbracket \varphi(x_0, x_1, \dots, x_n) \rrbracket.$$

2.4. Принцип перемешивания. Для любого семейства $(x_\xi)_{\xi \in \Xi}$ в $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ и любого разбиения единицы $(b_\xi)_{\xi \in \Xi}$ в \mathbb{B} существует (единственный) элемент x из $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ такой, что $b_\xi \leq \llbracket x = x_\xi \rrbracket$ для всех $\xi \in \Xi$.

Этот элемент называется *перемешиванием* семейства (x_ξ) посредством разбиения единицы (b_ξ) и обозначается символом $x = \text{mix}_{\xi \in \Xi}(b_\xi x_\xi) = \text{mix}\{b_\xi x_\xi : \xi \in \Xi\}$. Для $X \subset \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ обозначим символом $\text{mix}(X)$ множество всех перемешиваний $\text{mix}_{\xi \in \Xi}(b_\xi x_\xi)$ всеми разбиениями единицы $(b_\xi)_{\xi \in \Xi}$ такими, что $\{x_\xi : \xi \in \Xi\} \subset X$.

Имеется каноническое вложение универсума фон Неймана \mathbb{V} в булевозначный универсум $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$, которое сопоставляет элементу $x \in \mathbb{V}$ его *стандартное имя* $x^\wedge \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$. Стандартное имя отображает \mathbb{V} на $\mathbb{V}^{(2)}$, где $2 := \{0, 1\}$. Формула называется *ограниченной*, если она эквивалентна (в ZFC) формуле, в которой каждая связанная переменная x ограничена квантором вида $(\forall x \in y)$ или $(\exists x \in y)$.

2.5. Ограниченный принцип переноса. Для каждой ограниченной формулы φ языка теории множеств в ZFC доказуемо утверждение: для любого набора $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{V}$ имеет место эквивалентность:

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) \iff \mathbb{V}^{(\mathbb{B})} \models \varphi(x_1^\wedge, \dots, x_n^\wedge).$$

2.6. Для $X \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ определим *спуск* $X \downarrow$ $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ -множества X как

$$X \downarrow := \{x \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})} : \llbracket x \in X \rrbracket = \mathbf{1}\}.$$

Заметим, что $X \downarrow$ — множество. Пусть $X, Y, f, P \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ таковы, что $\llbracket f : X \rightarrow Y \rrbracket = \mathbf{1}$ и $\llbracket P \subset X^2 \rrbracket = \mathbf{1}$, т. е. f — отображение из X в Y и P — бинарное отношение на X в $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$. В этом случае $f \downarrow$ является единственным отображением из $X \downarrow$ в $Y \downarrow$, для которого $\llbracket f \downarrow(x) = f(x) \rrbracket = \mathbf{1}$ ($x \in X \downarrow$), и $P \downarrow$ — единственное бинарное отношение на $X \downarrow$ такое, что $(x_1, x_2) \in P \downarrow \iff \llbracket (x_1, x_2) \in P \rrbracket = \mathbf{1}$.

Спуск отображения *экстенционален*: для всех $x_1, x_2 \in X \downarrow$ имеем $\llbracket x_1 = x_2 \rrbracket \leq \llbracket f \downarrow(x_1) = f \downarrow(x_2) \rrbracket$.

Пусть $x \in \mathbb{V}$ и $x \subset \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$, т. е. пусть x есть некоторое множество булевозначных множеств или, другими словами, $x \in \mathcal{P}(\mathbb{V}^{(\mathbb{B})})$. Положим $\emptyset \uparrow := \emptyset$ и $\text{dom}(x \uparrow) := x$, $\text{im}(x \uparrow) := \{\mathbb{1}\}$, если $x \neq \emptyset$. Элемент $x \uparrow$ (отделимого универсума $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$, т. е. выделенный представитель класса $\{y \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})} : \llbracket y = x \uparrow \rrbracket = \mathbb{1}\}$) называется *подъемом* x .

2.7. Предположим, что $X \in \mathbb{V}$, $X \neq \emptyset$, т. е. X — непустое множество. Обозначим символом ι стандартное именованное вложение $x \mapsto x^\wedge$ ($x \in X$). Тогда $\iota(X) \uparrow = X^\wedge$ и $X = \iota^{-1}(X^\wedge \downarrow)$. Используя выписанные выше соотношения, можно распространить операции спуска и подъема на случай, когда Φ — соответствие из X в $Y \downarrow$ и $\llbracket \Psi — соответствие из X^\wedge в $Y \rrbracket = \mathbb{1}$, где $Y \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$. Именно, полагаем $\Phi \uparrow := (\Phi \circ \iota^{-1}) \uparrow$ и $\Psi \downarrow := \Psi \downarrow \circ \iota$. В этом случае $\Phi \uparrow$ есть *модифицированный подъем* Φ и $\Psi \downarrow$ есть *модифицированный спуск* Ψ . Легко видеть, что $\Phi \uparrow$ есть единственное соответствие в $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$, удовлетворяющее соотношению $\llbracket \Phi \uparrow(x^\wedge) = \Phi(x) \uparrow \rrbracket = \mathbb{1}$ ($x \in X$). Аналогично $\Psi \downarrow$ — единственное соответствие из X в $Y \downarrow$, удовлетворяющее равенству $\Psi \downarrow(x) = \Psi(x^\wedge) \downarrow$ ($x \in X$). Если $\Phi := f$ и $\Psi := g$ — функции, то эти соотношения принимают вид $\llbracket f \uparrow(x^\wedge) = f(x) \rrbracket = \mathbb{1}$ и $g \downarrow(x) = g(x^\wedge)$ для всех $x \in X$. Кроме того, $\llbracket f(A) \uparrow = f \uparrow(A^\wedge) \rrbracket = \mathbb{1}$ для $A \subset X$.$

2.8. Пусть символы $[X, Y \downarrow] \in \mathbb{V}$ и $\llbracket X^\wedge, Y \rrbracket \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ означают множества всех отображений из X в $Y \downarrow$ и из X^\wedge в Y соответственно. Соответствия $f \mapsto f \uparrow$ и $g \mapsto g \downarrow$ взаимно обратны и осуществляют биекцию между $[X, Y \downarrow]$ и $\llbracket X^\wedge, Y \rrbracket \downarrow$.

2.9. Принципы переноса и максимума обеспечивают существование различных «булевозначных объектов». Если формула $(\exists u) \varphi(u, u_1, \dots, u_n)$ является теоремой ZFC, то по принципу переноса эта теорема также справедлива в $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$, т. е. $\llbracket (\exists u) \varphi(u, x_1, \dots, x_n) \rrbracket = \mathbb{1}$, и по принципу максимума существует $x_0 \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ со свойством $\llbracket \varphi(x_0, x_1, \dots, x_n) \rrbracket = \mathbb{1}$. Принцип перемешивания объясняет нам, как эти «булевозначные объекты» можно строить.

Например, применяя принципы переноса и максимума к ZFC-теореме «Существует поле вещественных чисел», находим элемент $\mathcal{R} \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$, для которого $\llbracket \mathcal{R}$ есть поле вещественных чисел $\rrbracket = \mathbb{1}$. Мы называем \mathcal{R} *вещественными числами* в $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$. Следующий результат, принадлежащий Гордону [9], говорит о том, что интерпретация вещественных чисел в $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ является универсально полной векторной решеткой, у которой булева алгебра проекций на компоненты изоморфна \mathbb{B} .

2.10. Теорема Гордона. Пусть \mathbb{B} — полная булева алгебра, и пусть \mathcal{R} — поле вещественных чисел в $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$. Тогда имеют место утверждения:

- (1) внутреннее поле $\mathcal{R} \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ может быть выбрано так, что

$$\llbracket \mathbb{R}^\wedge — плотное подполе поля $\mathcal{R} \rrbracket = \mathbb{1};$$$

- (2) алгебраическая структура $\mathcal{R} \downarrow$ (со спущенными операциями и отношением порядка) является универсально полной векторной решеткой со слабой порядковой единицей $\mathbb{1} := 1^\wedge$;

- (3) имеется булев изоморфизм χ из \mathbb{B} на $\mathbb{P}(\mathcal{R} \downarrow)$ такой, что

$$\chi(b)x = \chi(b)y \iff b \leq \llbracket x = y \rrbracket, \quad \chi(b)x \leq \chi(b)y \iff b \leq \llbracket x \leq y \rrbracket \quad (\mathbb{G})$$

для всех $x, y \in \mathcal{R}\downarrow$ и $b \in \mathbb{B}$.

Этот замечательный результат, устанавливающий имманентную связь между булевозначным анализом и теорией векторных решеток, принадлежит Гордону [9]. Теорема Гордона показала, что всякая универсально полная векторная решетка доставляет новую модель вещественных чисел, имеющую те же права, что и любая другая. Кроме того, всякая архимедова векторная решетка, в частности произвольное пространство L^p , $p \geq 1$, поднимается до плотной подрешетки в решетке вещественных чисел \mathbb{R} в подходящем булевозначном универсуме, так что $\mathcal{R}\downarrow$ становится ее универсальным пополнением.

2.11. Тот факт, что X является векторной решеткой над упорядоченным полем \mathbb{R} , может быть переписан как ограниченная формула, скажем, $\varphi(X, \mathbb{R})$. Следовательно, в силу ограниченного принципа переноса, приходим к тождеству $\llbracket \varphi(X^\wedge, \mathbb{R}^\wedge) \rrbracket = \mathbf{1}$, которое сводится к утверждению о том, что X^\wedge — векторная решетка над упорядоченным полем \mathbb{R}^\wedge в $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$. Конус положительных элементов X_+ определяется ограниченной формулой

$$\varphi(X, X_+) \equiv (\forall x \in X_+)(x \in X) \wedge (\forall x \in X)(x \in X_+ \leftrightarrow x \geq 0).$$

Значит, $(X^\wedge)_+ = (X_+)^\wedge$ ввиду ограниченного принципа переноса. По той же причине

$$|x^\wedge| = |x|^\wedge, \quad (x \vee y)^\wedge = x^\wedge \vee y^\wedge, \quad (x \wedge y)^\wedge = x^\wedge \wedge y^\wedge$$

для всех $x, y \in X$, поскольку решеточные операции $\vee, \wedge, |\cdot|$ в X определены ограниченными формулами. В частности, $x \perp y \iff \llbracket x^\wedge \perp y^\wedge \rrbracket = \mathbf{1}$ для всех $(x, y \in X)$.

2.12. Пусть $X^{\wedge\sim} := L^\sim(X^\wedge, \mathcal{R})$ — пространство регулярных \mathbb{R}^\wedge -линейных функционалов из X^\wedge в \mathcal{R} . Более точно, \mathcal{R} рассматривается как векторное пространство над полем \mathbb{R}^\wedge , и по принципу максимума найдется $X^{\wedge\sim} \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ такое, что $\llbracket X^{\wedge\sim} \text{ — векторное пространство над } \mathcal{R}, \text{ образованное } \mathbb{R}^\wedge\text{-линейными порядково ограниченными функционалами из } X^\wedge \text{ в } \mathcal{R}, \text{ упорядоченными конусом положительных функционалов} \rrbracket = \mathbf{1}$. Функционал $\tau \in X^{\wedge\sim}$ считается *положительным*, когда $(\forall x \in X^\wedge) \tau(x) \geq 0$.

Легко видеть, что теорема Рисса — Канторовича остается верной, если X — векторная решетка над плотным подполем $\mathbb{F} \subset \mathbb{R}$, а Y — порядково полная векторная решетка (над \mathbb{R}) и $L^\sim(X, Y)$ заменяется на $L_{\mathbb{F}}^\sim(X, Y)$, векторное пространство над \mathbb{R} всех \mathbb{F} -линейных порядково ограниченных операторов из X в Y , упорядоченных конусом положительных операторов: $L_{\mathbb{F}}^\sim(X, Y)$ — порядково полная векторная решетка. Кроме того, сохраняются формулы порядкового исчисления. В силу этого наблюдения $X^{\wedge\sim}$ является порядково полной векторной решеткой в $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ и потому спуск $X^{\wedge\sim}\downarrow$ решетки $X^{\wedge\sim}$ есть порядково полная векторная решетка. Следующая теорема обобщает 2.8.

2.13. Теорема. Пусть X и Y — векторные решетки, где Y универсально полна и представляется в виде $Y = \mathcal{R}\downarrow$. Для всех $T \in L^\sim(X, Y)$ и $\tau \in X^{\wedge\sim}\downarrow$ имеем $\llbracket T\uparrow \in X^{\wedge\sim} \rrbracket = \mathbf{1}$ и $\tau\downarrow \in L^\sim(X, \mathcal{R}\downarrow)$. Кроме того, модифицированные подъем $T \mapsto T\uparrow$ и спуск $\tau \mapsto \tau\downarrow$ взаимно обратны и осуществляют решеточный изоморфизм между порядково полными векторными решетками $L^\sim(X, Y)$ и $X^{\wedge\sim}\downarrow$.

2.14. Возьмем $S, T \in L^\sim(X, Y)$ и положим $\sigma := S\uparrow$, $\tau := T\uparrow$. Пусть $L_{\mathbb{F}}^\sim(X, Y)$ и $\text{Hom}(X, Y)$ — множества всех порядково ограниченных операторов, сохраняя-

ющих дизъюнктивность, и решеточных гомоморфизмов из X в Y . Следующие утверждения сразу следуют из 2.13:

- (1) $S \leq T \iff \llbracket \sigma \leq \tau \rrbracket = \mathbf{1}$,
- (2) $S = |T| \iff \llbracket \sigma = |\tau| \rrbracket = \mathbf{1}$,
- (3) $S \perp T \iff \llbracket \sigma \perp \tau \rrbracket = \mathbf{1}$,
- (4) $T \in L_{dp}^{\sim}(X, Y) \iff \llbracket \tau \in (X^{\wedge\sim})_{dp} \rrbracket = \mathbf{1}$,
- (5) $T \in \text{Hom}(X, Y) \iff \llbracket \tau \in \text{Hom}(X^{\wedge}, \mathcal{R}) \rrbracket = \mathbf{1}$.

§ 3. Характеризация операторов, сохраняющих дизъюнктивность

Как отмечено в [10], линейный оператор T из векторной решетки X в порядково полную векторную решетку Y в некотором смысле определяется с точностью до ортоморфизма семейством ядер *слоев* πT ($\pi \in \mathbb{P}(Y)$) оператора T . В этом параграфе используем аналогичное соображение для характеристики порядково ограниченных операторов, сохраняющих дизъюнктивность.

3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Линейный оператор $T : X \rightarrow Y$ называется *сохраняющим дизъюнктивность*, если из $x \perp y$ следует, что $Tx \perp Ty$ для всех $x, y \in X$. Билинейный оператор $B : X \times Y \rightarrow Z$ называется *сохраняющим дизъюнктивность (решеточным биморфизмом)*, если операторы $B(x, \cdot) : y \mapsto B(x, y)$ ($y \in Y$) и $B(\cdot, y) : x \mapsto B(x, y)$ ($x \in X$) сохраняют дизъюнктивность для всех $x \in X$ и $y \in Y$ (соответственно являются решеточными гомоморфизмами для всех $x \in X_+$ и $y \in Y_+$).

Для полноты изложения приведем хорошо известную характеристику ограниченных функционалов, сохраняющих дизъюнктивность, в которой \mathbb{F} — подполе поля вещественных чисел \mathbb{R} .

3.2. Теорема. Пусть X — векторная решетка над \mathbb{F} . Для порядково ограниченного \mathbb{F} -линейного функционала $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ следующие условия эквивалентны:

- (1) f сохраняет дизъюнктивность;
- (2) $|f|$ — решеточный гомоморфизм;
- (3) если $g \in X^{\sim}$ и $0 \leq g \leq |f|$, то $g = \lambda|f|$ для некоторого $\lambda \in [0, 1]$;
- (4) либо f , либо $-f$ является решеточным гомоморфизмом;
- (5) $\ker(f) := f^{-1}(0)$ — порядковый идеал в X .

3.3. Лемма. Пусть X и Y — векторные решетки. Для порядково ограниченного \mathbb{F} -билинейного функционала $b : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ следующие условия эквивалентны:

- (1) b сохраняет дизъюнктивность;
- (2) $\ker(b) = (X_0 \times Y) \cup (X \times Y_0)$ для некоторых порядковых идеалов $X_0 \subset X$ и $Y_0 \subset Y$;
- (3) существуют решеточные гомоморфизмы $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ и $h : Y \rightarrow \mathbb{R}$ такие, что либо $b(x, y) = g(x)h(y)$, либо $b(x, y) = -g(x)h(y)$ для всех $x \in X$ и $y \in Y$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим, что $\ker(b) = (X_0 \times Y) \cup (X \times Y_0)$, и возьмем $y \in Y$. Если $y \in Y_0$, то $b(\cdot, y) \equiv 0$, иначе $\ker(b(\cdot, y)) = X_0$ и $b(\cdot, y)$ сохраняет дизъюнктивность в силу 3.2(5). Аналогично $b(x, \cdot)$ сохраняет дизъюнктивность для всех $x \in X$ и, таким образом, (2) \implies (1). Импликация (1) \implies (3) установлена в [11, теорема 3.2], а импликация (3) \implies (1) тривиальна: нужно положить $X_0 = \ker(g)$ и $Y_0 = \ker(h)$. \square

3.4. Теорема. Пусть X, Y, Z — векторные решетки, причем Z обладает свойством проектирования. Для порядково ограниченного билинейного оператора $B : X \times Y \rightarrow Z$ следующие условия эквивалентны:

- (1) B сохраняет дизъюнктность;
- (2) существуют порядковый проектор $\varrho \in \mathbb{P}(Z)$ и решеточные гомоморфизмы $S : X \rightarrow Z^{\cup}$ и $T : Y \rightarrow Z^{\cup}$ такие, что $B(x, y) = \varrho S(x)T(y) - \varrho^{\perp} S(x)T(y)$ для всех $(x, y) \in X \times Y$;
- (3) ядро каждого слоя πB оператора B , где $\pi \in \mathbb{P}(Z)$, представляется в виде $\ker(\pi B) = (X_{\pi} \times Y) \cup (X \times Y_{\pi})$ для некоторых порядковых идеалов $X_{\pi} \subset X$ и $Y_{\pi} \subset Y$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Импликация (1) \implies (2) была выведена из 3.3(3) в [11, следствие 3.3], а импликация (2) \implies (3) очевидна. Таким образом, нам нужно лишь доказать, что (3) \implies (1). Предположим, что для любого $\pi \in \mathbb{P}(Y)$ имеет место представление $\ker(\pi B) = (X_{\pi} \times Y) \cup (X \times Y_{\pi})$ для подходящих порядковых идеалов X_{π} в X и Y_{π} в Y . Можно предполагать, что $Y \subset \mathcal{R}\downarrow$ в силу теоремы Гордона. Пусть $|u| \leq |x|, |v| \leq |y|$. Положим $\pi := \llbracket B(x, y) = 0 \rrbracket$. Тогда $\pi B(x, y) = 0$ в силу (\mathbb{G}) и $\pi B(u, v) = 0$ по условию. Снова привлекая (\mathbb{G}) , имеем $\pi \leq \llbracket B(u, v) = 0 \rrbracket$. Таким образом, $\llbracket B(x, y) = 0 \rrbracket \leq \llbracket B(u, v) = 0 \rrbracket$ или, что то же самое, $\llbracket B(x, y) = 0 \rrbracket \Rightarrow \llbracket B(u, v) = 0 \rrbracket = 1$. Теперь положим $\beta := B\uparrow$ и убедимся, что $\ker(\beta) = (\mathcal{X} \times Y^{\wedge}) \cup (X^{\wedge} \times \mathcal{Y})$ для некоторых порядковых идеалов \mathcal{X} в X^{\wedge} и \mathcal{Y} в Y^{\wedge} . Так как $|u| \leq |x|$ тогда и только тогда, когда $\llbracket u^{\wedge} \leq x^{\wedge} \rrbracket = 1$, выводим:

$$\begin{aligned} & \llbracket \ker(\beta) = (\mathcal{X} \times Y^{\wedge}) \cup (X^{\wedge} \times \mathcal{Y}) \text{ для некоторых порядковых идеалов} \\ & \quad \mathcal{X} \subset X^{\wedge} \text{ и } \mathcal{Y} \subset Y^{\wedge} \rrbracket \\ &= \llbracket (\forall x, u \in X^{\wedge}) (\forall y, v \in Y^{\wedge}) (\beta(x, y) = 0 \wedge |u| \leq |x| \wedge |v| \leq |y| \rightarrow \beta(u, v) = 0) \rrbracket \\ &= \bigwedge_{x, u \in X} \bigwedge_{y, v \in X} \llbracket (\beta(x^{\wedge}, y^{\wedge}) = 0) \wedge \llbracket u^{\wedge} \leq |x^{\wedge}| \rrbracket \wedge \llbracket v^{\wedge} \leq |y^{\wedge}| \rrbracket \Rightarrow \llbracket \beta(u^{\wedge}, v^{\wedge}) = 0 \rrbracket \rrbracket \\ &= \bigwedge \{ \llbracket B(x, y) = 0 \rrbracket \Rightarrow \llbracket B(u, v) = 0 \rrbracket : x, u \in X; y, v \in Y; |u| \leq |x|, |v| \leq |y| \} = 1. \end{aligned}$$

Применив эквивалентность 3.3((1) \iff (3)) внутри $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$, видим, что β сохраняет дизъюнктность. Следовательно, B сохраняет дизъюнктность в силу 2.14(5). \square

3.5. Теорема. Предположим, что Y обладает свойством проектирования. Порядково ограниченный линейный оператор $T : X \rightarrow Y$ сохраняет дизъюнктность тогда и только тогда, когда $\ker(bT)$ — порядковый идеал в X для всякого проектора $b \in \mathbb{P}(Y)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Применим теорему 3.4 к билинейному оператору $B : X \times \mathbb{R} \rightarrow Y$, определенному формулой $B(x, \lambda) = \lambda T(x)$ для всех $x \in X$ и $\lambda \in \mathbb{R}$. \square

3.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Билинейный оператор $B : X \times X \rightarrow Y$ называется ортосимметричным, если из $|x| \wedge |y| = 0$ следует, что $B(x, y) = 0$ для произвольных $x, y \in X$ (см. [12]). Симметричное ядро $\ker_s(B)$ ортосимметричного билинейного оператора B определяется следующим образом: $\ker_s(B) := \{x \in X : B(x, |x|) = 0\}$.

3.7. Следствие. Пусть X и Y — векторные решетки, где Y обладает свойством проектирования. Порядково ограниченный ортосимметричный билинейный оператор $B : X \times X \rightarrow Y$ сохраняет дизъюнктность тогда и только

тогда, когда симметричное ядро $\ker_s(\pi B)$ каждого слоя πB есть порядковый идеал в X .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для любой векторной решетки X существуют (единственная с точностью до изоморфизма) векторная решетка X^\odot и решеточный биморфизм $\odot : (x, y) \mapsto x \odot y$ из $X \times X$ в X^\odot такие, что для положительного ортосимметричного билинейного оператора из $X \times Y$ в некоторую универсально полную векторную решетку Y найдется единственный решеточный гомоморфизм $S : X^\odot \rightarrow Y$ такой, что $B = S \odot$. Кроме того, $\iota : x \mapsto x \odot |x|$ — (нелинейный) ортогонально аддитивный порядковый изоморфизм X на X^\odot , сохраняющий модуль, и $(S \circ \iota)(x) = B(x, |x|)$ для всех $x \in X$. Соответствие $B \mapsto S$ осуществляет биекцию между множеством всех порядково ограниченных ортосимметричных билинейных операторов из $X \times X$ в Y , сохраняющих дизъюнктивность, и множеством всех порядково ограниченных операторов из X в Y , сохраняющих дизъюнктивность (см. [13, предложение 5.2]). Остается применить теорему 3.5, замечая, что $\ker_s(B) = \iota^{-1}(\ker(S))$ и ι^{-1} сохраняет порядковые идеалы. \square

3.8. ЗАМЕЧАНИЕ. Для билинейных операторов справедлива следующая версия теоремы Майера: если X, Y, Z — векторные решетки и $B : X \times Y \rightarrow Z$ — порядково ограниченный билинейный оператор, сохраняющий дизъюнктивность, то B обладает положительной частью B^+ , отрицательной частью B^- и модулем $|B|$, являющимися решеточными биморфизмами; кроме того, $B^+(x, y) = B(x, y)^+$ и $B^-(x, y) = B(x, y)^-$ для всех $x \in X_+$ и $y \in Y_+$ и $|B|(|x|, |y|) = |B(x, y)|$ для всех $x \in X$ и $y \in Y$ (см. [14, теорема 5; 15, теорема 3.4]). В частности, оператор B регулярен.

3.9. ЗАМЕЧАНИЕ. Из приведенного выше рассуждения также следует, что если Z обладает свойством проецирования, то для порядково ограниченного билинейного оператора B из $X \times Y$ в Z , сохраняющего дизъюнктивность, существует проектор на компоненты $\pi \in \mathbb{P}(Y)$ такой, что $B^+ = \pi|B|$ и $B^- = \pi^\perp|B|$. В частности, $B = (\pi - \pi^\perp)|B|$ и $|B| = (\pi - \pi^\perp)B$. (Первую формулу принято называть *полярным разложением B* .) Чтобы удостовериться в этом, достаточно заметить, что в силу леммы 3.3 функционал $\beta := B \uparrow$ сохраняет дизъюнктивность тогда и только тогда, когда либо β , либо $-\beta$ — решеточный биморфизм в $\mathbb{V}(\mathbb{B})$. Из этого факта следует, что B сохраняет дизъюнктивность тогда и только тогда, когда $(B(u, v))^+ \perp (B(x, y))^-$ для всех $x, u \in X_+$ и $y, v \in Y_+$. В самом деле, для произвольных $x, u \in X_+$ и $y, v \in Y_+$ можно записать

$$(B(x, y))^+ = B(x, y) \vee 0 \leq B^+(x, y) = \pi|B|(x, y);$$

аналогично $(B(u, v))^- \leq \pi^\perp|B|(u, v)$. Значит, $(B(x, y))^+ \wedge (B(u, v))^- = 0$. По поводу полярного разложения линейных операторов, сохраняющих дизъюнктивность, см. [16].

§ 4. Суммы операторов, сохраняющих дизъюнктивность

В работе [17] де Пагтер и Шеп поставили задачу нахождения условий для того, чтобы сумма двух порядково ограниченных операторов, сохраняющих дизъюнктивность, являлась сохраняющим дизъюнктивность оператором. Исследуем эту задачу для произвольных конечных сумм в более общем контексте n -дизъюнктивных операторов и начнем со случая функционалов, сохраняющих дизъюнктивность.

4.1. Лемма. Для конечного набора порядково ограниченных функционалов f_1, \dots, f_N на X , сохраняющих дизъюнктивность, следующие утверждения эквивалентны:

- (1) функционал $f_i + f_j$ сохраняет дизъюнктивность для всех $1 \leq i, j \leq N$;
- (2) $|f_1| + \dots + |f_N|$ — решеточный гомоморфизм;
- (3) существует решеточный гомоморфизм $h : X \rightarrow \mathbb{R}$ такой, что $f_i = \lambda_i h$ ($i := 1, \dots, N$) для некоторых $\lambda_1, \dots, \lambda_N \in [0, 1] \subset \mathbb{R}$;
- (4) если $f_i \neq 0$ и $f_j \neq 0$, то $|f_i| \wedge |f_j| \neq 0$ для всех $i, j := 1, \dots, N$;
- (5) из условий $f_i \neq 0$ и $f_j \neq 0$ следует, что $\ker(f_i) = \ker(f_j)$ для всех $i, j := 1, \dots, N$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. (1) \implies (2) Пусть верно утверждение (1) и $h := |f_1| + \dots + |f_N|$ не является решеточным гомоморфизмом. Тогда найдем натуральные числа $1 \leq i, j \leq N$ такие, что $f_i \neq 0$, $f_j \neq 0$ и $f_i \perp f_j$. Отсюда следует, что $|f_i + f_j| = |f_i| + |f_j|$ не является решеточным гомоморфизмом, а значит, $f_i + f_j$ не сохраняет дизъюнктивность; противоречие.

(2) \implies (3) Это следует непосредственно из 3.2(3), где $h := |f_1| + \dots + |f_N|$.

(5) \implies (3) Если $f_1 = \dots = f_N = 0$, то доказывать нечего. Иначе выберем натуральное $j \leq N$ так, что $f_j \neq 0$, и положим $h := |f_j|$. Тогда для каждого ненулевого f_i имеем $\ker(h) = \ker(f_j) = \ker(f_i)$ и потому $f_i = \lambda_i h$ для некоторого ненулевого $\lambda_i \in \mathbb{R}$. Положим $\lambda_i = 0$, если $f_i = 0$.

Оставшиеся импликации (3) \implies (4) \implies (5) и (3) \implies (1) очевидны. \square

4.2. Лемма. Пусть T — порядково ограниченный линейный оператор из X в $Y := \mathcal{R}\downarrow$ и $\tau := T\uparrow$. Если $b := \llbracket \tau \neq 0 \rrbracket$, то $\chi(b)$ совпадает с проекцией на образ $R_T \in \mathbb{P}(Y)$, т. е. проекцией на компоненту $T(X)^{\perp\perp}$ в Y .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Как следует из (G), для $y \in Y$ проекция $[y]$ на компоненту $\{y\}^{\perp\perp}$ совпадает с $\chi(\llbracket y \neq 0 \rrbracket)$. Поэтому

$$b := \llbracket \tau \neq 0 \rrbracket = \llbracket (\exists x \in X) \tau(x) \neq 0 \rrbracket = \bigvee_{x \in X} \llbracket \tau(x) \neq 0 \rrbracket = \bigvee_{x \in X} \llbracket T(x) \neq 0 \rrbracket.$$

Остается заметить, что

$$\chi(b) = \bigvee_{x \in X} \chi(\llbracket T(x) \neq 0 \rrbracket) = \bigvee_{x \in X} [T(x)] = R_T. \quad \square$$

4.3. Теорема. Для любого конечного набора порядково ограниченных линейных операторов T_1, \dots, T_N из X в Y , сохраняющих дизъюнктивность, следующие утверждения эквивалентны:

- (1) $T_i + T_j$ сохраняет дизъюнктивность для всех $1 \leq i, j \leq N$;
- (2) $|T_1| + \dots + |T_N|$ — решеточный гомоморфизм;
- (3) существуют решеточный гомоморфизм $T : X \rightarrow Y$ и ортоморфизмы $\varrho_1, \dots, \varrho_j \in \mathcal{L}(Y)$ такие, что $T_i = \varrho_i T$ ($i := 1, \dots, N$);
- (4) неравенство $R_{T_i} \circ R_{T_j} \leq R_{|T_i| \wedge |T_j|}$ справедливо для всех $i, j := 1, \dots, N$;
- (5) для $\pi \in \mathbb{P}(Y)$ и $i, j := 1, \dots, N$ из неравенства $\pi \leq R_{T_i} \circ R_{T_j}$ следует, что $\ker(\pi T_i) = \ker(\pi T_j)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Не теряя общности, предположим, что $Y = \mathcal{R}\downarrow$. Положим $f_i := T_i\uparrow$ ($i := 1, \dots, N$). Лемма 4.1 верна в $\mathbb{V}(\mathbb{B})$ в силу принципа переноса, так что достаточно убедиться, что 4.3(k) эквивалентна интерпретации 4.1(k) в

$\mathbb{V}(\mathbb{B})$ для всех $(k = 1, \dots, 5)$. Для $k = 1, 2$ эти эквивалентности очевидны. Полагая $h := T \uparrow$ и используя 2.14(5), получаем $\llbracket 4.1(3) \rrbracket = \mathbb{1} \iff 4.3(3)$. Утверждение 4.1(4) можно записать в виде

$$\Phi \equiv (\exists i, j \in \{1, \dots, N\}^{\wedge})(f_i \neq 0 \wedge f_j \neq 0 \rightarrow |f_i| \wedge |f_j| \neq 0),$$

так что

$$\llbracket \Phi \rrbracket = \bigwedge_{i,j=1}^N \llbracket f_i \neq 0 \rrbracket \wedge \llbracket f_j \neq 0 \rrbracket \Rightarrow \llbracket |f_i| \wedge |f_j| \neq 0 \rrbracket.$$

Таким образом, $\llbracket 4.1(4) \rrbracket = \llbracket \Phi \rrbracket = \mathbb{1}$ тогда и только тогда, когда $\llbracket f_i \neq 0 \rrbracket \wedge \llbracket f_j \neq 0 \rrbracket \leq \llbracket |f_i| \wedge |f_j| \neq 0 \rrbracket$ для всех $i, j \leq N$. Последнее равносильно 4.3(4) в силу леммы 4.2. Оставшаяся эквивалентность $\llbracket 4.1(5) \rrbracket = \mathbb{1} \iff 4.3(5)$ проверяется комбинацией приведенных выше рассуждений с доказательством 3.4(3) $\implies 3.4(1)$. \square

4.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Оператор $T : X \rightarrow Y$ называется *n-дизъюнктивным*, если для любых $n + 1$ попарно дизъюнктивных элементов $x_0, \dots, x_n \in X$ имеем $|Tx_0| \wedge \dots \wedge |Tx_n| = 0$ (см. [18]).

Отметим, что $T : X \rightarrow Y$ сохраняет дизъюнктивность, если он 1-дизъюнктивен. Сумма n операторов, сохраняющих дизъюнктивность, n -дизъюнктивна. В случае, если решетка Y порядково полна, верно также и обратное: *порядково ограниченный оператор $T : X \rightarrow Y$ является n-дизъюнктивным тогда и только тогда, когда T представляется в виде суммы n порядково ограниченных операторов, сохраняющих дизъюнктивность*. Этот фундаментальный факт был установлен Бернау, Гюсмансом и де Паггером в [18, теорема 6]. В. А. Раднаев [19] заметил, что операторы T_1, \dots, T_n , сохраняющие дизъюнктивность, в разложении $T = T_1 + \dots + T_n$ могут быть выбраны попарно дизъюнктивными, и если S_1, \dots, S_n — другой попарно дизъюнктивный набор операторов, сохраняющих дизъюнктивность, для которого $T = S_1 + \dots + S_n$, то (S_1, \dots, S_n) есть $\mathbb{P}(Y)$ -перестановка операторов (T_1, \dots, T_n) в следующем ниже смысле.

4.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Пусть даны две N -ки $\mathcal{T} := (T_1, \dots, T_N)$ и $\mathcal{S} := (S_1, \dots, S_N)$ линейных операторов из X в Y . Говорят, что \mathcal{S} есть $\mathbb{P}(Y)$ -перестановка \mathcal{T} , если существует $N \times N$ -матрица $(\pi_{i,l})$ с элементами из $\mathbb{P}(Y)$, строки и столбцы которой являются разбиениями единицы в $\mathbb{P}(Y)$, такая, что $S_i = \sum_{l=1}^N \pi_{i,l} T_l$ для всех $i := 1, \dots, N$ (и, значит, $T_l = \sum_{i=1}^N \pi_{i,l} S_i$ для всех $l := 1, \dots, N$).

Обсудим условия, при которых сумма конечного набора порядково ограниченных линейных операторов, сохраняющих дизъюнктивность, n -дизъюнктивна. Как и выше, начнем с простого случая функционалов.

4.6. Лемма. Пусть $n, N \in \mathbb{N}$ и $n \leq N$. Для конечного набора порядково ограниченных функционалов f_1, \dots, f_N на X , сохраняющих дизъюнктивность, следующие условия эквивалентны:

- (1) сумма $|f_1| + \dots + |f_N|$ является n -дизъюнктивным функционалом;
- (2) для любой перестановки (g_1, \dots, g_N) набора (f_1, \dots, f_N) сумма $g_1 + \dots + g_n$ является n -дизъюнктивным функционалом;
- (3) существует перестановка (g_1, \dots, g_N) набора (f_1, \dots, f_N) такая, что g_1, \dots, g_n попарно дизъюнктивны и для $i := n + 1, \dots, N$ имеет место представление $g_i = \lambda_i g_{\kappa(i)}$ для некоторых $\kappa(i) \in \{1, \dots, n\}$ и $\lambda \in \mathbb{R}$, $|\lambda| \leq 1$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Здесь работают соображения, схожие с доказательством леммы 4.1, с учетом того факта, что сумма N решеточных гомоморфизмов

n -дизъюнктна тогда и только тогда, когда не более n из них ненулевые и попарно дизъюнктны. \square

4.7. Лемма. Пусть $T : X \rightarrow \mathcal{R}\downarrow$ — порядково ограниченный оператор и $\tau := T\uparrow$. Тогда функционал τ будет n^\wedge -дизъюнктным тогда и только тогда, когда n -дизъюнктен оператор T .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Положим $b := \llbracket \tau \text{ } n^\wedge\text{-дизъюнктен} \rrbracket$ и проверим, что если оператор T n -дизъюнктен, то $b = \mathbb{1}$. Отождествляя n^\wedge с $\{0, \dots, n-1\}^\wedge$ и используя 2.8, выводим

$$\begin{aligned} b &= \llbracket (\forall \nu : n^\wedge \rightarrow X^\wedge) ((\forall k, l \in n^\wedge) (k \neq l \rightarrow \nu(k) \perp \nu(l)) \rightarrow \inf_{k \in n^\wedge} |\tau(\nu(k))| = 0) \rrbracket \\ &= \bigwedge \{ \llbracket \inf \{ |\tau(\nu(i))| : i \in n^\wedge \} = 0 \rrbracket : \nu \in \llbracket n^\wedge \rightarrow X^\wedge \rrbracket, \\ &\quad \llbracket (\forall k, l \in n^\wedge) (k \neq l \rightarrow \nu(k) \perp \nu(l)) \rrbracket = \mathbb{1} \} \\ &= \bigwedge \{ \llbracket \inf \{ |\tau(\text{im}(\nu))| = 0 \rrbracket : \nu \downarrow \in [n \rightarrow X^\wedge \downarrow], (\forall k \neq l) [\nu \downarrow(k) \perp \nu \downarrow(l)] = \mathbb{1} \} \}. \end{aligned}$$

Так как $X^\wedge \downarrow = \text{mix}\{x^\wedge : x \in X\}$, можно выбрать разбиение единицы $(b_\xi)_{\xi \in \Xi}$ и конечный набор семейств $(x_{\xi, k})_{\xi \in \Xi}$ ($k := 0, 1, \dots, n$) такой, что

$$\nu \downarrow(k) = \text{mix}_{\xi \in \Xi} (b_\xi x_{\xi, k}^\wedge).$$

Из $[\nu \downarrow(k) \perp \nu \downarrow(l)] = \mathbb{1}$ следует, что $x_{\xi, k} \perp x_{\xi, l}$ при $b_\xi \neq 0$ и $k \neq l$. Полагая $A_\xi := \{x_{\xi, 0}, \dots, x_{\xi, n}\}$, легко проверяем, что $b_\xi \leq \llbracket \text{im}(\nu) = A_\xi^\wedge \rrbracket$. Теперь, работая в относительном универсуме $\mathbb{V}^{\langle \mathbb{B}^\xi \rangle}$, где $\mathbb{B}^\xi := [0, b_\xi]$, и привлекая 2.7 и (\mathbb{G}) , имеем $\tau(A_\xi^\wedge) = T(A_\xi)\uparrow$ и $\inf |T(A_\xi)\uparrow| = \inf |T(A_\xi)|$, так что

$$\inf |\tau(\text{im}(\nu))| = \inf |\tau(A_\xi^\wedge)| = \inf |\tau(A_\xi)| = \inf |T(A_\xi)|.$$

Так как оператор T n -дизъюнктен и соотношения $\llbracket |Tx_0| \wedge \dots \wedge |Tx_n| = 0 \rrbracket = \mathbb{1}$ и $|Tx_0| \wedge \dots \wedge |Tx_n| = 0$ эквивалентны, получаем, что $b = \mathbb{1}$. Обратное утверждение доказывается аналогично. \square

4.8. Лемма. Для $\tau_i, \sigma_i \in \mathbb{V}^{\langle \mathbb{B} \rangle}$ со свойством $\llbracket \tau_i, \sigma_i \in (X^\wedge)^\sim \rrbracket = \mathbb{1}$, $i \in \{1, \dots, N\}^\wedge$, положим $T_i := \tau_i \downarrow$ и $S_i := \sigma_i \downarrow$. Тогда $(\sigma_1, \dots, \sigma_{N^\wedge})$ является перестановкой $(\tau_1, \dots, \tau_{N^\wedge})$ в $\mathbb{V}^{\langle \mathbb{B} \rangle}$, если и только если (S_1, \dots, S_N) служит $\mathbb{P}(Y)$ -перестановкой (T_1, \dots, T_N) .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $(\sigma_1, \dots, \sigma_{N^\wedge})$ — перестановка $(\tau_1, \dots, \tau_{N^\wedge})$. Рассмотрим перестановку $\nu : \{1, \dots, N\}^\wedge \rightarrow \{1, \dots, N\}^\wedge$ такую, что $\sigma_i = \tau_{\nu(i)}$ ($i \in \{1, \dots, N\}^\wedge$). В силу 2.7 $\nu \downarrow$ есть функция из $\{1, \dots, N\}$ в $(\{1, \dots, N\}^\wedge) \downarrow = \text{mix}(\{1^\wedge, \dots, N^\wedge\})$. Таким образом, для каждого $i \in \{1, \dots, N\}$ существует разбиение единицы $(b_{i, l})_{l=1}^N$ такое, что $\nu \downarrow(i) = \text{mix}_{l \leq N} (b_{i, l} l^\wedge)$. Поскольку отображение ν инъективно, имеем

$$\begin{aligned} \mathbb{1} &= \llbracket (\forall i, j \in \{1, \dots, N\}^\wedge) (\nu(i) = \nu(j) \rightarrow i = j) \rrbracket \\ &= \bigwedge_{i, j=1}^N \llbracket \nu(i^\wedge) = \nu(j^\wedge) \rightarrow i^\wedge = j^\wedge \rrbracket = \bigwedge_{i, j=1}^N \llbracket \nu \downarrow(i) = \nu \downarrow(j) \rrbracket \Rightarrow \llbracket i^\wedge = j^\wedge \rrbracket \end{aligned}$$

и потому $\llbracket \nu \downarrow(i) = \nu \downarrow(j) \rrbracket \leq \llbracket i^\wedge = j^\wedge \rrbracket$ для всех $i, j \leq N$. Учитывая это неравенство и определение $\nu \downarrow$, получаем

$$b_{i, l} \wedge b_{j, l} \leq \llbracket \nu \downarrow(i) = l^\wedge \rrbracket \wedge \llbracket \nu \downarrow(j) = l^\wedge \rrbracket \leq \llbracket \nu \downarrow(i) = \nu \downarrow(j) \rrbracket \leq \llbracket i^\wedge = j^\wedge \rrbracket,$$

поэтому из $i \neq j$ следует, что $b_{i,l} \wedge b_{j,l} = 0$ (ибо $x \neq y \iff \llbracket x^\wedge = y^\wedge \rrbracket = 0$ ввиду 2.5). Вместе с тем из сюръективности ν следует, что

$$\begin{aligned} \mathbb{1} &= \llbracket (\forall l \in \{1, \dots, N\}^\wedge) (\exists i \in \{1, \dots, N\}^\wedge) l = \nu(i) \rrbracket \\ &= \bigwedge_{l=1}^N \bigvee_{i=1}^N \llbracket l^\wedge = \nu \downarrow(i) \rrbracket = \bigwedge_{l=1}^N \bigvee_{i=1}^N b_{i,l}. \end{aligned}$$

Следовательно, $(b_{i,l})_{i=1}^N$ — разбиение единицы в \mathbb{B} для всех $l = 1, \dots, N$. В силу выбора ν отсюда вытекает, что $b_{i,l} \leq \llbracket \sigma_{i^\wedge} = \tau_{l^\wedge} \rrbracket$ ввиду оценок

$$b_{i,l} \leq \llbracket \sigma_{i^\wedge} = \tau_{\nu(i^\wedge)} \rrbracket \wedge \llbracket \nu(i^\wedge) = l^\wedge \rrbracket \leq \llbracket \sigma_{i^\wedge} = \tau_{l^\wedge} \rrbracket.$$

Положим $\pi_{i,l} := \chi(b_{i,l})$ и заметим, что $b_{i,l} \leq \llbracket \sigma_{i^\wedge}(x^\wedge) = \tau_{l^\wedge}(x^\wedge) \rrbracket \leq \llbracket S_i x = T_l x \rrbracket$ для всех $x \in X$ и $1 \leq i, j \leq N$. Используя (\mathbb{G}) , получаем $\pi_{i,l} S_i = \pi_{i,l} T_l$, стало быть, $S_i = \sum_{l=1}^N \pi_{i,l} T_l$ для всех $1 \leq i \leq N$. Ясно, что $(\pi_{i,l})$ и есть $N \times N$ -матрица, требуемая в определении 4.5. Достаточность можно получить тем же рассуждением, если проделать его в обратном направлении. \square

4.9. Теорема. *Предположим, что $n, N \in \mathbb{N}$ и $n \leq N$. Для набора порядково ограниченных линейных операторов T_1, \dots, T_N из X в Y , сохраняющих дизъюнктивность, следующие утверждения эквивалентны:*

- (1) оператор $|T_1| + \dots + |T_N|$ n -дизъюнктен;
- (2) для любой $\mathbb{P}(Y)$ -перестановки (S_1, \dots, S_N) набора (T_1, \dots, T_N) сумма $S_1 + \dots + S_n$ является n -дизъюнктным оператором;
- (3) существует $\mathbb{P}(Y)$ -перестановка (S_1, \dots, S_N) набора (T_1, \dots, T_N) такая, что S_1, \dots, S_n попарно дизъюнктны и каждый из операторов S_{n+1}, \dots, S_N представляется в виде $S_i = \sum_{j=1}^n \alpha_{i,j} S_j$ для некоторых попарно дизъюнктных $\alpha_{1,j}, \dots, \alpha_{n,j} \in \mathcal{L}(Y)$ ($i := n+1, \dots, N$).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Можно считать, что $Y = \mathcal{R} \downarrow$; положим $\tau_l := T_l \uparrow$. Эквивалентность (1) \iff (2) немедленно следует из лемм 4.6 и 4.8, и нужно лишь проверить, что (2) \iff (3). Более того, без ограничения общности можно предполагать, что T_1, \dots, T_N — решеточные гомоморфизмы, так что τ_1, \dots, τ_N тоже предполагаются решеточными гомоморфизмами внутри $\mathbb{V}(\mathbb{B})$.

(2) \implies (3) Предполагая выполнение (2) и работая внутри $\mathbb{V}(\mathbb{B})$, заметим, что сумма $\tau_1 + \dots + \tau_N$ n^\wedge -дизъюнктна и по лемме 4.6 существует перестановка $\nu : \{1, \dots, N\}^\wedge \rightarrow \{1, \dots, N\}^\wedge$ такая, что $\tau_{\nu(1)}, \dots, \tau_{\nu(n)}$ — попарно дизъюнктные решеточные гомоморфизмы, причем каждый из функционалов $\tau_{\nu(n+1)}, \dots, \tau_{\nu(N)}$ пропорционален одному из функционалов $\tau_{\nu(1)}, \dots, \tau_{\nu(n)}$ с константой, модуль которой не превосходит 1. Последнее записывается следующей формулой:

$$\Phi \equiv (\forall i \in \{n+1, \dots, N\}^\wedge) (\exists j \in \{1, \dots, n\}^\wedge) (\exists \beta \in \mathcal{R}) (|\beta| \leq 1 \wedge \tau_{\nu(i)} = \beta \tau_{\nu(j)}).$$

Положим $S_i := \tau_{\nu(i^\wedge)} \downarrow$ ($i := 1, \dots, N$). Тогда (S_1, \dots, S_N) есть $\mathbb{P}(Y)$ -перестановка набора (T_1, \dots, T_N) по лемме 4.8 и (S_1, \dots, S_n) попарно дизъюнктны ввиду 2.14(3). Кроме того, $\llbracket \Phi \rrbracket = \mathbb{1}$ в силу принципа переноса и потому

$$\mathbb{1} = \bigwedge_{i=n+1}^N \bigvee_{j=1}^n \llbracket (\exists \beta) (\beta \in \mathcal{R}) (|\beta| \leq 1 \wedge \tau_{\nu(i^\wedge)} = \beta \tau_{\nu(j^\wedge)}) \rrbracket.$$

Следовательно, для каждого $n + 1 \leq i \leq N$ существует разбиение единицы $\{b_{i,1}, \dots, b_{i,n}\}$ в \mathbb{B} такое, что

$$b_{i,j} \leq \llbracket (\exists \beta)(\beta \in \mathcal{R})(|\beta| \leq 1 \wedge \tau_{\nu(i^\wedge)} = \beta \tau_{\nu(j^\wedge)}) \rrbracket.$$

В силу принципа максимума найдется $\beta_{i,j} \in \mathcal{R} \downarrow$ со свойством

$$b_{i,j} \leq \llbracket |\beta_{i,j}| \leq 1 \rrbracket \wedge \llbracket \tau_{\nu(i^\wedge)} = \beta_{i,j} \tau_{\nu(j^\wedge)} \rrbracket.$$

Заметим, что для каждого $x \in X$

$$\begin{aligned} b_{i,j} &\leq \llbracket \tau_{\nu(i^\wedge)} = \beta_{i,j} \tau_{\nu(j^\wedge)} \rrbracket \leq \llbracket \tau_{\nu(i^\wedge)}(x^\wedge) \\ &= \beta_{i,j} \tau_{\nu(j^\wedge)}(x^\wedge) \rrbracket \wedge \llbracket \tau_{\nu(i^\wedge)}(x^\wedge) = S_i x \rrbracket \wedge \llbracket \tau_{\nu(j^\wedge)}(x^\wedge) = S_j x \rrbracket \leq \llbracket S_i x = \beta_{i,j} S_j x \rrbracket. \end{aligned}$$

Полагая $\pi_{i,j} := \chi(b_{i,j})$ и $\alpha_{i,j} := \pi_{i,j} \beta_{i,j}$ и используя (\mathbb{G}) , получаем $\pi_{i,j} S_i x = \alpha_{i,j} S_j x$, откуда $S_i = \sum_{j=1}^n \alpha_{i,j} S_j$, что и требовалось.

(3) \implies (2) Нужно использовать те же рассуждения, что и выше, применяя леммы 4.6–4.8. \square

4.10. ЗАМЕЧАНИЕ. Все факты об n -дизъюнктных операторах, приведенные после определения 4.4, могут быть также сведены к случаю функционалов в силу лемм 4.7 и 4.8.

4.11. ЗАМЕЧАНИЕ. Пусть X, Y, Z — векторные решетки, причем Z порядково полна. Будем говорить, что конечные наборы $\{x_0, x_1, \dots, x_n\} \subset X$ и $\{y_0, y_1, \dots, y_n\} \subset Y$ бидизъюнкты, если для любой пары натуральных чисел $0 \leq i, j \leq n$, $i \neq j$, либо $x_i \perp x_j$, либо $y_i \perp y_j$. Билинейный оператор B из $X \times Y$ в Z называется n -дизъюнктным, если

$$|B(x_0, y_0)| \wedge |B(x_1, y_1)| \wedge \dots \wedge |B(x_n, y_n)| = 0$$

для любых бидизъюнктных наборов $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ в X и $\{y_0, y_1, \dots, y_n\}$ в Y . Для регулярного билинейного оператора из $B : X \times Y$ в Z существует линейный регулярный оператор $T : X \bar{\otimes} Y \rightarrow Z$ такой, что $B = T \otimes$, где $X \bar{\otimes} Y$ — тензорное произведение Фремлина пространств X и Y (см. [20]). В [15] было доказано, что оператор B n -дизъюнктен тогда и только тогда, когда T n -дизъюнктен. Эти факты позволяют перенести некоторые результаты о регулярных n -дизъюнктных линейных операторах на регулярные n -дизъюнктные билинейные операторы. В частности, для билинейных операторов справедлив аналог теоремы 4.9.

4.12. ЗАМЕЧАНИЕ. Ввиду [10, 21] и теорем 3.4 и 3.5 естественно возникает задача: описать порядково ограниченные линейные и билинейные n -дизъюнктные операторы в терминах их ядер. У нас нет удовлетворительного решения этой задачи даже в случае функционалов.

§ 5. Множества операторов, сохраняющие дизъюнктность

Цель настоящего параграфа — дать полное описание максимальных n -дизъюнктных множеств операторов. В частном случае операторов, сохраняющих дизъюнктность, мотивацией этой задачи были работы Бенамора и Булабьяра [22–24]. Она была явно сформулирована в работе Булабьяра [25] как проблема 5.8.

5.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Непустое подмножество \mathcal{D} пространства $L^\sim(X, Y)$ называется *n -дизъюнктивным* в $L^\sim(X, Y)$, если $|T_0x_0| \wedge \cdots \wedge |T_nx_n| = 0$ для всех $T_0, \dots, T_n \in \mathcal{D}$ и попарно дизъюнктивных наборов $x_0, \dots, x_n \in X$. Говорят, что n -дизъюнктивное множество \mathcal{M} в $L^\sim(X, Y)$ *максимально*, если всякое n -дизъюнктивное множество в $L^\sim(X, Y)$, содержащее \mathcal{M} , совпадает с \mathcal{M} . 1-Дизъюнктивное множество операторов также называется сохраняющим дизъюнктивность. Более точно, непустое подмножество \mathcal{D} в $L^\sim(X, Y)$ *сохраняет дизъюнктивность* в $L^\sim(X, Y)$, если $S(u) \perp T(v)$ для всех $S, T \in \mathcal{D}$ и $u, v \in X$ с условием $u \perp v$.

Отметим некоторые непосредственные следствия определения. Порядково ограниченный оператор T из X в Y n -дизъюнктивен тогда и только тогда, когда одноточечное множество $\{T\}$ является n -дизъюнктивным множеством в $L^\sim(X, Y)$. Поэтому каждый элемент n -дизъюнктивного множества в $L^\sim(X, Y)$ является порядково ограниченным n -дизъюнктивным оператором. Кроме того, непустое подмножество \mathcal{D} в $L^\sim(X, Y)$ n -дизъюнктивно в $L^\sim(X, Y)$, если и только если каждый набор из $n + 1$ элементов $\{T_0, \dots, T_n\}$ из \mathcal{D} n -дизъюнктивен.

5.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Пусть X — векторная подрешетка в Y . Отображение $T : X \rightarrow Y$ называется *орторморфизмом*, если T порядково ограничено и из $x \perp y$ следует, что $Tx \perp y$ для всех $x \in X$ и $y \in Y$. Легко видеть, что если T — орторморфизм из X в Y , то $T(X) \subset X^{\perp\perp}$. Множество всех орторморфизмов из X в Y обозначается символом $\text{Orth}(X, Y)$.

5.3. Лемма. Если X — векторная подрешетка в Y , то

$$\text{Orth}(X, Y) = \{T|_X : T \in \text{Orth}(Y^{\cup}), T(X) \subset Y\}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Универсальное пополнение Y^{\cup} векторной решетки Y является f -алгеброй с мультипликативной единицей. Всякий орторморфизм T из X в Y единственным образом продолжается до орторморфизма \hat{T} на Y^{\cup} . Каждый орторморфизм на Y^{\cup} является оператором умножения. Поэтому если $T \in \text{Orth}(X, Y)$, то существует некоторое $y \in X^{\cup}$ такое, что $T(x) = yx$ для всех $x \in X$, так что $y \cdot X \subset Y$ (см. [1, теорема 2.63]). \square

5.4. ПРИМЕР. Для $\mathcal{D} \subset L^\sim(Y, Z)$ и $T : X \rightarrow Y$ положим $\mathcal{D} \circ T := \{S \circ T : S \in \mathcal{D}\}$. Если T, T_1, \dots, T_n — решеточные гомоморфизмы из X в Y , то $\text{Orth}(T(X), Y) \circ T$ — множество, сохраняющее дизъюнктивность, и множество $\text{Orth}(T_1(X), Y) \circ T_1 + \cdots + \text{Orth}(T_n(X), Y) \circ T_n$ является n -дизъюнктивным. Наша следующая цель — показать, что этот пример типичен.

5.5. Лемма. Пусть даны n попарно дизъюнктивных ненулевых вещественнозначных решеточных гомоморфизмов h_1, \dots, h_n на векторной решетке X . Существуют попарно дизъюнктивные элементы $x_1, \dots, x_n \in X$ такие, что $h_i(x_j) = \delta_{ij}$ для всех $i, j := 1, \dots, n$ (здесь δ_{ij} — символ Кронекера).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Выберем $u_i \in X_+$ такое, что $h_i(u_i) > 0$, и положим $u := u_1 + \cdots + u_n$. В силу теоремы Крейна — Какутани о представлении можно отождествить порядковый идеал X_u в X , порожденный u , с плотной по норме векторной подрешеткой в $C(Q)$, содержащей константы и разделяющей точки, где $C(Q)$ — банахова решетка непрерывных функций на хаусдорфовом компактном топологическом пространстве Q . Кроме того, при этом отождествлении u соответствует функция $\mathbb{1} \in C(Q)$, тождественно равная единице. Тогда ограничения $h_1|_{X_u}, \dots, h_n|_{X_u}$ — попарно дизъюнктивные решеточные гомоморфизмы.

Пусть \hat{h}_i обозначает расширение $h_i|_{X_u}$ на $C(Q)$ по непрерывности (в норме). Ясно, что $\hat{h}_1, \dots, \hat{h}_n$ также являются попарно дизъюнктными ненулевыми решеточными гомоморфизмами, и потому найдутся различные точки $q_1, \dots, q_n \in Q$ такие, что \hat{h}_i совпадает с мерой Дирака $\delta_{q_i} : x \mapsto x(q_i)$ ($x \in C(Q)$). В силу теоремы Титце — Урысона можно найти попарно дизъюнктные непрерывные функции $y_1, \dots, y_n \in C(Q)$ такие, что $y_i(q_i) = 1$ и $0 \leq y_i(q) \leq 1$ для всех $q \in Q$ и $i := 1, \dots, n$. Возьмем $\bar{y}_i \in X_u$ так, что $\|y_i - \bar{y}_i\| < \varepsilon < 1/2$, и заметим, что $h_i(\bar{y}_i) - \varepsilon > 1 - 2\varepsilon > 0$ и $\bar{y}_i - \varepsilon \mathbf{1} \leq y_i$. Положив $x_i := (h_i(\bar{y}_i) - \varepsilon)^{-1}(\bar{y}_i - \varepsilon \mathbf{1}) \vee 0$, видим, что $\{x_1, \dots, x_n\} \subset X$ — требуемый набор. \square

5.6. Лемма. *Непустое множество \mathcal{D} в X^\sim является n -дизъюнктным тогда и только тогда, когда существуют попарно дизъюнктные решеточные гомоморфизмы $h_1, \dots, h_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ такие, что $\mathcal{D} \subset \mathbb{R} \cdot h_1 + \dots + \mathbb{R} \cdot h_n$. Кроме того, множество \mathcal{D} максимально тогда и только тогда, когда либо $\mathcal{D} = \text{Hom}(X, \mathbb{R}) = \{0\}$, либо $\mathcal{D} = \mathbb{R} \cdot h_1 + \dots + \mathbb{R} \cdot h_m$ с ненулевыми h_1, \dots, h_m для некоторого $m \leq n$. Набор $\{h_1, \dots, h_m\}$ единствен с точностью до перестановки.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Достаточность очевидна. Докажем необходимость. Пусть $\mathcal{D} \neq \{0\}$. Предположим без потери общности, что из $f \in \mathcal{D}$ следует, что $|f| \in \mathcal{D}$. Согласно [18, теорема 6] всякий функционал в \mathcal{D} разлагается в сумму компонент, сохраняющих дизъюнктность. Пусть символ \mathcal{D}_0 обозначает множество всех таких компонент всех функционалов из \mathcal{D} . Утверждается, что в предположении n -дизъюнктности \mathcal{D} в \mathcal{D}_0 существует не более n ненулевых попарно дизъюнктных элементов. Пусть $\{h_1, \dots, h_m\}$ — набор ненулевых попарно дизъюнктных решеточных гомоморфизмов из \mathcal{D}_0 . В силу леммы 5.5 мы можем подобрать m ненулевых попарно дизъюнктных элементов $x_0, \dots, x_m \in X_+$ таких, что $h_i(x_j) = \delta_{i,j}$ для всех $1 \leq i, j \leq m$. По построению для каждого $i \leq m$ можно выбрать $0 \leq f_i \in \mathcal{D}$ со свойством $f_i = h_i + \dots$, так что $f_i(x_i) = h_i(x_i) + \dots \geq h_i(x_i) = 1$. Следовательно, $|f_i(x_i)| \wedge \dots \wedge |f_m(x_m)| \geq 1$, а значит, $m \leq n$ по предположению. Очевидно, что $\mathbb{R} \cdot h_1 + \dots + \mathbb{R} \cdot h_m$ — максимальное n -дизъюнктное множество в X^\sim , содержащее \mathcal{D} . \square

5.7. Лемма. *Для непустого множества \mathcal{D} в $L^\sim(X, \mathcal{R}\downarrow)$ обозначим $\mathcal{D}\uparrow := \{T\uparrow : T \in L^\sim(X, \mathcal{R}\downarrow)\}$ и $\Delta := (\mathcal{D}\uparrow)\uparrow$. Если множество \mathcal{D} n -дизъюнктно в $L^\sim(X, \mathcal{R}\downarrow)$ для некоторого натурального $n \in \mathbb{N}$, то*

$$\llbracket \Delta \text{ } n^\wedge\text{-дизъюнктно в } (X^\wedge)^\sim \rrbracket = \mathbf{1}.$$

Кроме того, \mathcal{D} максимально тогда и только тогда, когда $\llbracket \Delta \text{ максимально} \rrbracket = \mathbf{1}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предполагая, что \mathcal{D} n -дизъюнктно в $L^\sim(X, \mathcal{R}\downarrow)$, покажем, что Δ n^\wedge -дизъюнктно в $(X^\wedge)^\sim$ в $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$. Предложение « Δ n^\wedge -дизъюнктно в $(X^\wedge)^\sim$ » может быть записано следующим образом:

$$\begin{aligned} \Phi \equiv & (\forall \tau : \{0, \dots, n\}^\wedge \rightarrow \Delta) (\forall \varkappa : \{0, \dots, n\}^\wedge \rightarrow X^\wedge) \\ & \left((\forall i, j \leq n^\wedge) (i \neq j \rightarrow \varkappa(i) \perp \varkappa(j)) \rightarrow \bigwedge_{i \leq n^\wedge} |\tau(i) \varkappa(i)| = 0 \right). \end{aligned}$$

Нужно показать, что $\llbracket \Phi \rrbracket = \mathbf{1}$. Вычисляя булевы оценки истинности для универсальных кванторов и учитывая 2.8, видим, что $\llbracket \Phi \rrbracket = \mathbf{1}$ тогда и только тогда, когда $\llbracket |\mathcal{S}(0)k(0)| \wedge \dots \wedge |\mathcal{S}(n)k(n)| = 0 \rrbracket = \mathbf{1}$ для всех отображений $\mathcal{S} = \tau\downarrow : \{0, \dots, n\} \rightarrow \Delta\downarrow$ и $k = \varkappa\downarrow : \{0, \dots, n\} \rightarrow X^\wedge\downarrow$ таких, что $\llbracket \varkappa(i^\wedge) \perp \varkappa(j^\wedge) \rrbracket = \mathbf{1}$ для всех $i \neq j$. Поскольку $\Delta\downarrow = \text{mix}(\mathcal{D}\uparrow)$ и $X^\wedge\downarrow = \text{mix}(\{x^\wedge : x \in X\})$, существует

разбиение единицы $(b_\xi)_{\xi \in \Xi}$ в \mathbb{B} и для каждого $i = 0, \dots, n$ найдутся семейства $(T_{\xi,i})_{\xi \in \Xi}$ в $L^\sim(X, \mathcal{R}\downarrow)$ и $(x_{\xi,i})_{\xi \in \Xi}$ в X такие, что $\mathcal{T}(i) = \text{mix}_{\xi \in \Xi}(b_\xi T_{\xi,i} \uparrow)$ и $k(i) = \text{mix}_{\xi \in \Xi}(b_\xi x_{\xi,i}^\wedge)_{\xi \in \Xi}$. Заметим, что $b_\xi \leq \llbracket \mathcal{I}(i^\wedge) = k(i) = x_{\xi,i}^\wedge \rrbracket$, так что $x_{\xi,i} \perp x_{\xi,j}$ при $b_\xi \neq 0$ и $i \neq j$. Таким образом, из n -дизъюнктивности \mathcal{D} выводим:

$$\begin{aligned} b_\xi &\leq \llbracket |T_{\xi,0}x_{\xi,0}| \wedge \dots \wedge |T_{\xi,n}x_{\xi,n}| = 0 \rrbracket \wedge \bigwedge_{i \leq n} \llbracket \mathcal{T}(i)x_{\xi,i}^\wedge = T_{\xi,i}(x_{\xi,i}) \rrbracket \wedge \llbracket k(i) = x_{\xi,i}^\wedge \rrbracket \\ &\leq \llbracket |\mathcal{T}(0)k(0)| \wedge \dots \wedge |\mathcal{T}(n)k(n)| = 0 \rrbracket. \end{aligned}$$

Это дает требуемое соотношение, поскольку $\bigvee_{\xi \in \Xi} b_\xi = \mathbf{1}$. \square

5.8. Лемма. Для непустого подмножества $\mathcal{D} \subset L(X, \mathcal{R}\downarrow)$ положим $R_{\mathcal{D}} := \bigvee \{R_T : T \in \mathcal{D}\}$. Тогда

$$R_{\mathcal{D}} = \chi(\llbracket \Delta \neq 0 \rrbracket).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Лемма сразу следует из леммы 4.2 и определения Δ из леммы 5.7. \square

Итак, все готово для доказательства основного результата этого параграфа.

5.9. Теорема. Пусть X и Y — векторные решетки, причем Y обладает свойством проецирования. Непустое множество \mathcal{D} в $L^\sim(X, Y)$ n -дизъюнктивно тогда и только тогда, когда существуют попарно дизъюнктивные решеточные гомоморфизмы T_1, \dots, T_n из X в Y^\cup такие, что \mathcal{D} содержится в $\text{Orth}(T_1(X), Y) \circ T_1 + \dots + \text{Orth}(T_n(X), Y) \circ T_n$. Кроме того, множество \mathcal{D} максимально тогда и только тогда, когда дополнительно существует разбиение единицы π_0, \dots, π_n в $\mathbb{P}(Y^\cup)$ такое, что

$$\begin{aligned} \mathcal{D} &= \text{Orth}(T_1(X), Y) \circ T_1 + \dots + \text{Orth}(T_m(X), Y) \circ T_m, \\ \pi_0 \circ \mathcal{D} &= \text{Hom}(X, \pi_0 Y) = \{0\}, \quad \pi_m + \dots + \pi_n = R_{T_m} \quad (m := 1, \dots, n). \end{aligned}$$

В этом представлении набор T_1, \dots, T_n единствен с точностью до $\mathbb{P}(Y)$ -перестановки.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Лемма 5.6 сводит теорему к случаю, когда решетка Y универсально полна, поскольку по теореме Гордона можно считать без ограничения общности, что $Y = \mathcal{R}\downarrow$.

Пусть \mathcal{D} — n -дизъюнктивное множество в $L^\sim(X, \mathcal{R}\downarrow)$, и пусть Δ означает то же, что и в лемме 5.7. Работая в $\mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ и используя принцип переноса, заключаем, что Δ является n^\wedge -дизъюнктивным множеством в $(X^\wedge)^\sim$, и по лемме 5.6 $\Delta \subset \mathcal{R} \cdot \tau(1^\wedge) + \dots + \mathcal{R} \cdot \tau(n^\wedge)$ для некоторого $\tau : \{1, \dots, n\}^\wedge \rightarrow \text{Hom}(X^\wedge, \mathcal{R})$. Как и в лемме 5.7, положим $\mathcal{T} := \tau \downarrow$ и заметим, что \mathcal{T} отображает $\{1, \dots, n\}$ в $\text{Hom}(X^\wedge, \mathcal{R})\downarrow$. Если $T \in \mathcal{D}$, то $\llbracket T \uparrow \in \Delta \rrbracket = \mathbf{1}$, так что существует $\alpha \in \mathbb{V}^{(\mathbb{B})}$ со свойством

$$\llbracket \alpha : \{1, \dots, n\}^\wedge \rightarrow \mathcal{R} \rrbracket = \llbracket T \uparrow = \sum_{i \leq n^\wedge} \alpha(i) \mathcal{T}(i) \rrbracket = \mathbf{1}.$$

Положим $\alpha_i := \alpha \downarrow(i)$ и $T_i := \mathcal{T}(i) \downarrow$ для $i := 1, \dots, n$. Тогда $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathcal{R}\downarrow$, $T_1, \dots, T_n \in \text{Hom}(X, \mathcal{R}\downarrow)$ и потому цепочка тождеств

$$Tx = T \uparrow x^\wedge = \sum_{i \leq n^\wedge} \alpha(i) \mathcal{T}(i) x^\wedge = \sum_{i \leq n} \alpha_i \mathcal{T}(i) \downarrow x = \sum_{i \leq n} \alpha_i T_i x,$$

где $x \in X$ произвольно, дает требуемое представление $T = \sum_{i=1}^n \alpha_i T_i$. На самом деле, мы доказали больше: из приведенного выше рассуждения следует, что двойной спуск $(\Lambda \downarrow) \downarrow := \{\tau \downarrow : \tau \in \Lambda \downarrow\}$ суммы $\Lambda := \mathcal{R} \cdot \tau(1^\wedge) + \dots + \mathcal{R} \cdot \tau(n^\wedge)$ состоит из всех операторов, представимых в виде $\sum_{i \leq n} \alpha_i T_i$ для некоторых $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathcal{R} \downarrow$.

Предположим, что множество \mathcal{D} максимально. Тогда $\llbracket \Delta \text{ максимально} \rrbracket = 1$ в силу леммы 5.7. Условие максимальной в лемме 5.6 можно записать следующим образом:

$$\Psi \equiv (\Delta = \text{Hom}(X^\wedge, \mathcal{R}) = \{0\}) \\ \vee (\exists m \in \{1, \dots, n\}^\wedge) (\forall i \leq m) (\tau(i) \neq 0) \wedge (\Delta = \mathbb{R} \cdot \tau(1) + \dots + \mathbb{R} \cdot \tau(m)).$$

Положим $b_0 := \llbracket \Delta = \text{Hom}(X^\wedge, \mathcal{R}) = \{0\} \rrbracket$. В силу принципа переноса $\llbracket \Psi \rrbracket = 1$ и вычисление булевых оценок истинности дает

$$b_0^* = \llbracket \Delta \neq 0 \rrbracket = \bigvee_{m=1}^n \llbracket \Delta = \mathbb{R} \cdot \mathcal{T}(1) + \dots + \mathbb{R} \cdot \mathcal{T}(m) \rrbracket \wedge \bigwedge_{i=1}^m \llbracket \mathcal{T}(i) \neq 0 \rrbracket.$$

Следовательно, существует конечное разбиение единицы $\{b_0, b_1, \dots, b_n\}$ в \mathbb{B} такое, что $b_m \leq \llbracket \Delta = \mathbb{R} \cdot \mathcal{T}(1) + \dots + \mathbb{R} \cdot \mathcal{T}(m) \rrbracket$ и $b_m \leq \llbracket \mathcal{T}(i) \neq 0 \rrbracket$ ($i \leq m$) для всех $m := 1, \dots, n$. Положим $\pi_m := \chi(b_m)$ и заметим, что $\{\pi_0, \pi_1, \dots, \pi_n\}$ — разбиение единицы в $\mathbb{P}(\mathcal{R} \downarrow)$. Отметим также, что $(\Lambda \downarrow) \downarrow = \text{mix}(\mathcal{D})$, и потому $(\Lambda \downarrow) \downarrow = \mathcal{D}$ ввиду максимальной \mathcal{D} . Учитывая вышесказанное и применяя лемму 5.8, имеем

$$R_{\mathcal{D}} = \pi_0^\perp = \pi_1 + \dots + \pi_n, \quad \pi_m \leq R_{T_1} \circ \dots \circ R_{T_m}, \\ \pi_m \circ \mathcal{D} = \pi_m \circ (\mathcal{R} \downarrow \cdot T_1 + \dots + \mathcal{R} \downarrow \cdot T_m) \quad (m := 1, \dots, n).$$

Первое равенство дает $\pi_0 \circ \mathcal{D} = \text{Hom}(X, \pi_0 Y) = \{0\}$. Второе влечет, что $\pi_m + \dots + \pi_n \leq R_{T_m}$ ($m := 1, \dots, n$). Заменяя T_m на $(\pi_m + \dots + \pi_n) T_m$, если нужно, и суммируя третьи тождества по m , получаем требуемые условия максимальной. \square

5.10. Следствие. Пусть X и Y — векторные решетки, причем Y порядково полна. Для любого конечного набора $\{T_1, \dots, T_N\}$ в $L^\sim(X, Y)$ следующие условия эквивалентны:

- (1) $\{T_1, \dots, T_N\}$ сохраняет дизъюнктность в $L^\sim(X, Y)$;
- (2) $|T_1| + \dots + |T_N|$ — решеточный гомоморфизм;
- (3) существуют решеточный гомоморфизм $T \in L^\sim(X, Y)$ и ортоморфизмы $S_1, \dots, S_N \in \text{Orth}(Y)$ такие, что $T_k = S_k \circ T$ для всех $k := 1, \dots, N$.

В частности, сумма $T_1 + \dots + T_N$ сохраняет дизъюнктность, если выполнено одно из этих эквивалентных условий.

5.11. Следствие. Пусть X и Y — векторные решетки, где Y порядково полна, и пусть \mathcal{D} — максимальное множество, сохраняющее дизъюнктность в $L^\sim(X, Y)$. Тогда существует решеточный гомоморфизм T из X в Y^Ψ такой, что $\mathcal{D} = \text{Orth}(T(X), Y) \circ T$.

5.12. Замечание. Заметим, что определение 5.2 ортоморфизма не является общепринятым (ср. с [1, определения 2.35 и 2.41; 3, определение 3.1.1]), но оно с очевидностью эквивалентно стандартному определению в случае $X = Y$.

Тем не менее определение 5.2 иногда удобно и появляется в литературе в различных контекстах (см. [16, 26]).

5.13. ЗАМЕЧАНИЕ. Следующий вопрос был задан в [25, проблема 5.8]. Пусть дан решеточный гомоморфизм T из X в Y . При каких условиях множество $\mathcal{D} := \text{Orth}(Y) \circ T$ максимально? Из следствия 5.11 вытекает, что \mathcal{D} максимально тогда и только тогда, когда $\text{Orth}(T(X), Y) = \text{Orth}(Y_0)$, где $Y_0 = T(X)^{\perp\perp}$. Ясно, что $\text{Orth}(L^p, L^1) = L^q \neq \text{Orth}(L^1) = L^\infty$ для $1 < p < \infty$ и $q = p/(p-1)$ и, стало быть, это условие выполняется не всегда.

5.14. ЗАМЕЧАНИЕ. Некоторые аспекты теории операторов, сохраняющих дизъюнктивность, изложены в [2, 27]. Обзор недавних результатов об операторах, сохраняющих дизъюнктивность, можно найти в [25]. В частности, понятие множества операторов, сохраняющих дизъюнктивность, и некоторые порядковые свойства максимального множества операторов, сохраняющего дизъюнктивность, представлены в [25].

ЛИТЕРАТУРА

1. Aliprantis C. D., Burkinshaw O. Positive operators. New York: Springer-Verl., 1985.
2. Kusraev A. G. Dominated operators. Dordrecht: Kluwer Acad. Publ., 2000.
3. Meyer-Nieberg P. Banach lattices. Berlin etc.: Springer-Verl., 1991.
4. Zaanen A. C. Riesz Spaces. Amsterdam: North-Holland, 1983. V. 2.
5. Bell J. L. Boolean valued models and independence proofs in set theory. New York: Clarendon Press, 1985.
6. Takeuti G., Zaring W. M. Axiomatic set theory. New York: Springer-Verl., 1973.
7. Kusraev A. G., Kutateladze S. S. Boolean valued analysis. Dordrecht: Kluwer, 1999.
8. Кусраев А. Г., Кутателадзе С. С. Введение в булевозначный анализ. М.: Наука, 2005.
9. Гордон Е. И. Вещественные числа в булевозначных моделях теории множеств и K -пространства // Докл. АН СССР. 1977. Т. 237, № 4. С. 773–775.
10. Кутателадзе С. С. О разностях решеточных гомоморфизмов // Сиб. мат. журн. 2005. Т. 46, № 2. С. 393–396.
11. Кусраев А. Г., Табуев С. Н. О мультипликативном представлении билинейных операторов, сохраняющих дизъюнктивность // Сиб. мат. журн. 2008. Т. 49, № 2. С. 357–366.
12. Vu Q., Buskes G., Kusraev A. G. Bilinear maps on product of vector lattices: A survey // Positivity (Eds. K. Boulabiar, G. Buskes, A. Triki). Basel etc.: Birkhäuser, 2007. P. 97–126.
13. Buskes G., Kusraev A. G. Representation and extension of orthoregular bilinear operators // Владикавк. мат. журн. 2007. Т. 9, № 1. С. 16–29.
14. Boulabiar K., Buskes G., Page R. On some properties of bilinear maps of order bounded variation // Positivity. 2005. V. 9, N 3. P. 401–414.
15. Кусраев А. Г., Табуев С. Н. О билинейных операторах, сохраняющих дизъюнктивность // Владикавк. мат. журн.. 2004. Т. 6, № 1. С. 58–70.
16. Boulabiar K., Buskes G. Polar decomposition of order bounded disjointness preserving operators // Proc. Amer. Math. Soc. 2003. V. 132, N 3. P. 799–806.
17. de Pagter B. and Schep A. R. Band decomposition for disjointness preserving operators // Positivity. 2000. V. 4, N 3. P. 259–288.
18. Bernau C. B., Huijsmans C. B., de Pagter B. Sums of lattice homomorphisms // Proc. Amer. Math. Soc. 1992. V. 115, N 1. P. 151–156.
19. Radnaev V. A. On n -disjoint operators // Siberian Adv. Math. 1997. V. 7, N 4. P. 44–78.
20. Fremlin D. H. Tensor product of Archimedean vector lattices // Amer. J. Math. 1972. V. 94, N 3. P. 777–798.
21. Кутателадзе С. С. О подпространствах Гротендика // Сиб. мат. журн. 2005. Т. 46, № 3. С. 620–624.
22. Benamor F. Riesz spaces of order bounded disjointness preserving operators // Comment. Math. Univ. Carolinae. 2007. V. 48. P. 607–622.
23. Benamor F., Boulabiar K. Maximal ideals of disjointness preserving operators // J. Math. Anal. Appl. 2006. V. 322. P. 599–609.

24. Benamor F., Boulabiar K. On the modulus of disjointness preserving operators on complex vector lattices // Algebra Univ. 2005. V. 54. P. 185–193.
25. Boulabiar K. Recent trends on order bounded disjointness preserving operators // Irish Math. Soc. Bull. 2008. V. 62. P. 43–69.
26. Wickstead A. W. The injective hull of an Archimedean f -algebra // Compositio Math. 1987. V. 62, N 4. P. 329–342.
27. Gutman A. E. Disjointness preserving operators // Vector lattices and integral operators. Dordrecht etc.: Kluwer Acad. Publ., 1996. P. 361–454.

Статья поступила 19 июня 2014 г.

Кусраев Анатолий Георгиевич
Северо-Осетинский гос. университет им. К. Л. Хетагурова,
ул. Ватутина, 46, Владикавказ 362025;
Южный математический институт ВШЦ РАН
ул. Маркуса, 22, Владикавказ 362027
kusraev@smath.ru

Кутателадзе Семен Самсонович
Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН,
пр. Академика Коптюга, 4, Новосибирск 630090
sskut@member.ams.org