

УДК 517.518+517.54

МОДУЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЙ С ВЕСОВЫМ ОГРАНИЧЕННЫМ (p, q) -ИСКАЖЕНИЕМ

М. В. Трямкин

Аннотация. Получены аналоги неравенств Полецкого и Вайсяля для отображений с $(\theta, 1)$ -весовым ограниченным (p, q) -искажением без дополнительного предположения об \mathcal{N} -свойстве Лузина.

DOI 10.17377/smzh.2015.56.616

Ключевые слова: отображение с весовым ограниченным (p, q) -искажением, функция Полецкого, модуль семейства кривых.

§ 1. Введение

Понятие модуля семейства кривых на плоскости было введено в 1950 г. Альфорсом и Бьерлингом [1], а затем распространено на многомерные пространства Фугледе [2] и Б. В. Шабатом [3]. На языке этого понятия было сформулировано одно из эквивалентных описаний квазиконформных отображений, в связи с чем метод модулей приобрел важное значение в работе с этим классом отображений, позволив найти альтернативный подход к их изучению. Необходимость в таком подходе была вызвана отсутствием в многомерных пространствах теоремы Римана.

В 1960-е годы Ю. Г. Решетняк начал систематическое исследование отображений с ограниченным искажением, представляющих собой неоднолиственный аналог квазиконформных отображений (подробное изложение содержится в [4]). Пусть Ω — область в евклидовом пространстве \mathbb{R}^n , $n \geq 2$. Отображение $f = (f_1, \dots, f_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ класса Соболева $W_{n, \text{loc}}^1(\Omega)$ называется *отображением с ограниченным искажением*, если для почти всех $x \in \Omega$ выполняется неравенство $|Df(x)|^n \leq KJ(x, f)$, где $K \in [1, \infty)$ — постоянная,

$$Df(x) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) \right)_{i,j=1,\dots,n}$$

— матрица Якоби, $|Df(x)|$ и $J(x, f)$ — ее операторная норма и определитель соответственно.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 14-01-00552), Совета по грантам президента РФ и государственной поддержке ведущих научных школ (код проекта НШ-2263.2014.1) и Гранта Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований (договор № 14.В25.31.0029).

Основополагающий топологический результат Ю.Г. Решетняка заключается в том, что всякое непостоянное отображение с ограниченным искажением непрерывно, открыто и дискретно (см. [4, гл. 2, § 6]).

Впервые метод модулей к исследованию отображений с ограниченным искажением применил Е. А. Полецкий в 1970 г. [5]. Опираясь на упомянутые топологические характеристики, Е. А. Полецкий с помощью процедуры поднятия путей установил свойства некоторого специального отображения, известного сегодня как функция Полецкого. Это позволило показать, что для отображений с ограниченным искажением модуль образа семейства кривых не превосходит модуля прообраза [5, теорема 1]. Последнее утверждение в наши дни называется *неравенством Полецкого*. В той же работе [5] получено некоторое улучшение этого неравенства в нормальных областях (см. [5, теорема 2]). Полезная интерпретация последнего была получена Ю. Вайсяля [6, 3.1] и называется в литературе *неравенством Вайсяля*. Немногом ранее были установлены аналогичные оценки для емкости (см. [7, 8]). Отметим, однако, что модульные неравенства суть более общие, чем соответствующие емкостные (см., например, [9, пример 1]).

Оценки для модуля и емкости играют ключевую роль в исследовании поведения отображения на границе, в теории распределения значений в духе Неванлинны (теоремы типа Лиувилля и Пикара, устранение особенностей) (см. [10]), в связи дилатации с минимальной кратностью ветвления и др. Отметим также, что модульная техника нашла применение в метрических пространствах с мерой, что привело к рассмотрению так называемых пространств Левнера (см., например, [11]).

Метод модулей, как показывает ряд недавно вышедших работ (см., например, [12], а также [13–15]), продолжает оставаться основным инструментом в изучении различных обобщений отображений с ограниченным искажением. В [12] рассматриваются Q -гомеоморфизмы с функцией Q из различных классов (интегрируемые, с ограниченным средним и с ограниченным конечным колебанием), отображения с конечным искажением длины и с конечным искажением площади и для них устанавливаются результаты о дифференцируемости, поведении на границе, устранении особенностей, нормальных семействах и пр. В [13] установлены модульные и емкостные неравенства для отображений с конечным искажением при минимальных условиях регулярности в предположении об \mathcal{N} -свойстве Лузина на исходное отображение. В [14] аналогичные неравенства получены для отображений с конечным (p, q) -искажением длины. В [15] оценка на модуль доказана для некоторого специального класса отображений, обладающих следующими свойствами: открытость, дискретность, дифференцируемость почти всюду, \mathcal{N} - и \mathcal{N}^{-1} -свойства Лузина и так называемое свойство абсолютной непрерывности в обратном направлении.

Задача нашей работы — установить модульные неравенства для естественного обобщения класса отображений с ограниченным искажением без некоторых аналитических предположений, характерных для вывода результатов упомянутых выше работ. В настоящей статье основным является следующее

ОПРЕДЕЛЕНИЕ [16]. Пусть $\theta, \sigma : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$ — локально суммируемые функции (называемые *весовыми*) такие, что $\theta > 0$, $\sigma > 0$ почти всюду. Отображение $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется *отображением с (θ, σ) -весовым ограниченным (p, q) -искажением*, $n - 1 < q \leq p < \infty$, если

- 1) f непрерывно, открыто и дискретно;

- 2) f принадлежит классу Соболева $W_{q,\text{loc}}^1(\Omega)$;
- 3) $J(x, f) \geq 0$ для почти всех $x \in \Omega$;
- 4) отображение f имеет *конечное искажение*, т. е. для почти всех $x \in \Omega$ из $J(x, f) = 0$ вытекает $Df(x) = 0$;
- 5) функция (θ, σ) -весового (p, q) -искажения

$$\Omega \ni x \mapsto \mathcal{K}_q^{\theta, \sigma}(x, f) = \begin{cases} \frac{\theta^{\frac{1}{q}}(x)|Df(x)|}{\sigma^{\frac{1}{p}}(f(x))J(x, f)^{\frac{1}{p}}}, & \text{если } J(x, f) \neq 0, \\ 0, & \text{если } J(x, f) = 0, \end{cases} \quad (1)$$

принадлежит классу $L_{\varkappa}(\Omega)$, где \varkappa находится из условия $\frac{1}{\varkappa} = \frac{1}{q} - \frac{1}{p}$ ($\varkappa = \infty$ при $q = p$).

Через $K_{q,p}^{\theta, \sigma}(f; \Omega)$ обозначим величину $\|\mathcal{K}_q^{\theta, \sigma}(\cdot, f) | L_{\varkappa}(\Omega)\|$.

В этом определении наличие пункта 1 связано с тем, что при $q \in (n - 1, n)$ отображение может не обладать требуемыми топологическими свойствами. Отметим, что при $\theta = \sigma \equiv 1$ и $p = q = n$ получаем отображения, введенные Ю. Г. Решетняком.

В [16] получены емкостные неравенства для введенного класса отображений без требования \mathcal{N} -свойства Лузина. Подчеркнем, что ранее модульные и емкостные неравенства устанавливались в предположении, что отображение обладает \mathcal{N} -свойством Лузина, которое заключается в том, что образ множества меры нуль также имеет меру нуль. Это требование необходимо было для того, чтобы образ множества точек ветвления имел нулевую меру. В настоящей статье доказываем модульные неравенства без дополнительного предположения об \mathcal{N} -свойстве Лузина. Это оказывается возможным благодаря следующему замечательному факту, установленному в [17] (см. также [16, 18–20]): частные производные функции Полецкого обращаются в нуль почти всюду на образе множества точек ветвления. В § 3 остановимся на этом подробнее. Этот факт использовался в [16] для получения оценок на емкости. Отметим, что при $q \in (n - 1, n)$ отображение f не обязательно обладает \mathcal{N} -свойством Лузина, что продемонстрировано в [21].

Во всех наших последующих рассуждениях отображение f имеет $(\theta, 1)$ -весовое (p, q) -искажение, т. е. $\sigma \equiv 1$.

§ 2. Предварительные сведения

2.1. В этом пункте дадим сводку определений и результатов, связанных с топологическими свойствами отображений.

Всюду в тексте символ Ω обозначает область (т. е. открытое связное множество) в пространстве \mathbb{R}^n , символ m_n — n -мерную меру Лебега в \mathbb{R}^n , m_1 — линейную меру Лебега в \mathbb{R} . Для области $U \subset \mathbb{R}^n$ запись $U \Subset \Omega$ означает, что множество U ограничено и $\bar{U} \subset \Omega$.

Пусть $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ — непрерывное отображение, $U \Subset \Omega$, $y \notin f(\partial U)$. Символом $\mu(y, f, U)$ будем обозначать *степень отображения f в точке y* . Подробную информацию об этом понятии можно найти, например, в [4, 2.1; 10, I.4]. Если $\mu(y, f, U) > 0$ для любой области $U \Subset \Omega$ и любой точки $y \in f(U) \setminus f(\partial U)$, то говорят, что отображение f *сохраняет ориентацию*.

Рассмотрим непрерывное открытое и дискретное отображение $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ и точку $x \in \Omega$. Существует область $V \Subset \Omega$ такая, что $x \in V$ и $\bar{V} \cap f^{-1}(f(x)) = \{x\}$. Если $V' \Subset \Omega$ — другая область с таким свойством, то можно показать (см.

[10, с. 18]), что $\mu(f(x), f, V) = \mu(f(x), f, V')$. Поэтому равенство $i(x, f) = \mu(f(x), f, V)$ корректно определяет величину $i(x, f)$, называемую *локальным индексом отображения f в точке x* .

Область $D \Subset \Omega$ называется *нормальной* для непрерывного открытого и дискретного отображения $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, если $f(\partial D) = \partial f(D)$. Если $x \in \Omega$ и D — нормальная область такая, что $D \cap f^{-1}(f(x)) = \{x\}$, то D называется *нормальной окрестностью* точки x . Согласно [10, I.4.9] всякая точка $x \in \Omega$ имеет нормальную окрестность.

Отметим, что если D — нормальная область для отображения f , то $\mu(y, f, D)$ не зависит от $y \in f(D)$ (см. [10, с. 18]). Эту постоянную будем обозначать через $\mu(f, D)$.

Точка $x \in \Omega$ называется *точкой ветвления* непрерывного отображения $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, если f не является гомеоморфизмом ни в какой окрестности точки x . Множество всех точек ветвления отображения f обозначим символом B_f .

Пусть $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ — непрерывное отображение и $U \subset \Omega$. *Функцией кратности* называется отображение $\mathbb{R}^n \ni y \mapsto N(y, f, U) = \#\{f^{-1}(y) \cap U\}$. Обозначим также

$$N(f, U) = \sup_{y \in \mathbb{R}^n} N(y, f, U).$$

Предложение 1 [10, I.4.10]. Пусть $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ — непрерывное, открытое и дискретное отображение, сохраняющее ориентацию. Тогда

(1) если $U \Subset \Omega$, то $N(y, f, U) \leq \mu(y, f, U)$ для всех $y \notin f(\partial U)$ и $N(y, f, U) = \mu(y, f, U)$ для $y \notin f(\partial U \cup (U \cap B_f))$;

(2) если D — нормальная область, то $N(f, D) = \mu(f, D)$;

(3) если $A \subset \Omega$ — компактное множество, то $N(f, A) < \infty$;

(4) каждая точка $x \in \Omega$ имеет окрестность V такую, что если U — окрестность x и $U \subset V$, то $N(f, U) = i(x, f)$;

(5) $x \in B_f$ тогда и только тогда, когда $i(x, f) \geq 2$.

2.2. Здесь приведем понятия и утверждения, необходимые для описания аналитических свойств отображений.

Пусть $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ — функция класса $L_{1,\text{loc}}(\Omega)$. Если существует функция $v_i \in L_{1,\text{loc}}(\Omega)$, $i = 1, \dots, n$, такая, что для любой функции $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$ справедливо равенство (см. [22])

$$\int_{\Omega} u(x) \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(x) dx = - \int_{\Omega} v_i(x) \varphi(x) dx,$$

то v_i называется *обобщенной частной производной* функции u и обозначается через $\frac{\partial u}{\partial x_i}$. *Обобщенным градиентом* ∇u называется набор $(\frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n})$.

Функция $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, имеющая в области Ω обобщенные частные производные по всем переменным, принадлежит пространству Соболева $W_p^1(\Omega)$, $p \geq 1$, если $u \in L_p(\Omega)$ и $\frac{\partial u}{\partial x_i} \in L_p(\Omega)$ для каждого $i = 1, \dots, n$.

Отображение $f = (f_1, \dots, f_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ принадлежит классу $W_p^1(\Omega)$ ($W_{p,\text{loc}}^1(\Omega)$), если все f_i принадлежат $W_p^1(\Omega)$ (все f_i принадлежат $W_p^1(D)$ для любой области $D \Subset \Omega$). Через $Df(x)$, $|Df(x)|$ и $J(x, f)$ обозначаем матрицу Якоби $(\frac{\partial f_i}{\partial x_j})_{i,j=1,\dots,n}$, ее операторную норму $\sup_{|h|=1} |Df(x)h|$ и якобиан $\det Df(x)$ соответственно.

Для $(n \times n)$ -матрицы $M = (a_{ij})$ через $\text{adj } M$ обозначаем $(n \times n)$ -матрицу, транспонированную к матрице (A_{ij}) , где A_{ij} — алгебраическое дополнение элемента a_{ij} .

Введем проекцию $\pi_j : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n-1}$, которая точке $x = (x_1, \dots, x_n)$ ставит в соответствие точку $\pi_j(x) = (x_1, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_n)$. Обозначим $\bar{x}_j = \pi_j(x)$. Точку $x \in \mathbb{R}^n$ будем записывать в виде $x = (\bar{x}_j, x_j)$. Говорят, что непрерывное отображение $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ принадлежит классу $ACL(\Omega)$, если для любого $j = 1, \dots, n$ отображение $x_j \mapsto f(\bar{x}_j, x_j)$ при почти всех $\bar{x}_j \in \pi_j(\Omega)$ абсолютно непрерывно на любом отрезке $[a, b]$ таком, что $\pi_j(\Omega) \times [a, b] \subset \Omega$.

Известно (см. [23, 26.4]), что если $f \in ACL(\Omega)$, то f имеет почти всюду в Ω обычные частные производные, которые будут борелевскими функциями.

Отображение $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ принадлежит классу $ACL^p(\Omega)$, $p \geq 1$, если $f \in ACL(\Omega)$ и все частные производные f принадлежат классу $L_{p,loc}(\Omega)$.

Предложение 2 [10, I.1.2]. Отображение $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ принадлежит классу $ACL^p(\Omega)$ тогда и только тогда, когда f непрерывно и $f \in W_{p,loc}^1(\Omega)$. При этом обобщенные и обычные частные производные совпадают почти всюду.

Нам понадобятся также следующие предложения.

Предложение 3 [24, гл. VI, § 3, теорема 1]. Пусть функция f интегрируема на $[a, b]$. Тогда

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad \text{почти всюду на } [a, b].$$

Точки, в которых это равенство выполнено, называются точками Лебега функции f .

Отображение $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется аппроксимативно дифференцируемым в точке $x \in \Omega$, если существует линейное отображение $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ такое, что

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{m_n(\{y \in B(x, r) : |f(y) - f(x) - L(y - x)| > \varepsilon\})}{r^n} = 0$$

для любого $\varepsilon > 0$.

Предложение 4 [20, лемма 1]. Пусть функция $\psi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, обладает \mathcal{N} -свойством Лузина, имеет аппроксимативную производную $\text{ар } \psi'(t)$ почти всюду на $[a, b]$ и $\int_a^b |\text{ар } \psi'(t)| dt < \infty$. Тогда функция $\psi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ абсолютно непрерывна и для почти всех $t \in [a, b]$ ее обычная производная $\psi'(t)$ совпадает с $\text{ар } \psi'(t)$.

Формула замены переменной [25, 3.2.20] Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — открытое множество и $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ — измеримое отображение, аппроксимативно дифференцируемое почти всюду и обладающее \mathcal{N} -свойством Лузина. Через $J(x, f)$ обозначим определитель матрицы Якоби, составленной из аппроксимативных частных производных. Тогда для всякого измеримого множества $A \subset \Omega$ и всякой неотрицательной измеримой функции $u : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ функции $u(f(x))|J(x, f)|$, $u(y)N(y, f, A)$ измеримы, где полагаем $u(f(x))|J(x, f)| = 0$, если $u(f(x))$ не определено. Если одна из этих функций интегрируема, то такова и вторая, причем

$$\int_A u(f(x))|J(x, f)| dx = \int_{\mathbb{R}^n} u(y)N(y, f, A) dy.$$

Известно [26, 6.1.3, замечание (ii)], что отображение класса Соболева аппроксимативно дифференцируемо почти всюду, причем аппроксимативные и обобщенные частные производные совпадают почти всюду.

2.3. Этот пункт посвящен понятию модуля семейства кривых, которое обобщим нужным нам образом.

Кривая в пространстве \mathbb{R}^n — это непрерывное отображение $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, где I — промежуток в \mathbb{R} (т. е. множество вида $\langle a, b \rangle$, где каждая из угловых скобок может быть круглой или квадратной, $a \leq b$, $a, b \in \mathbb{R}$; допускаются также бесконечные промежутки). Кривая α называется *замкнутой (открытой)*, если промежуток I компактен (открыт). Обозначим $|\alpha| = \alpha(I)$. Запись $\gamma' \subset \gamma$ будет означать, что кривая γ' есть сужение кривой γ на подынтервал или точку.

Если $\alpha : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ — замкнутая кривая, то ее *длиной* назовем величину

$$\ell(\alpha) = \sup \sum_{i=1}^l |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i+1})|, \quad (2)$$

где точная верхняя грань берется по всем конечным разбиениям $a = t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_l \leq t_{l+1} = b$. Если кривая α не замкнута, то положим ее длину равной $\ell(\alpha) = \sup \ell(\alpha|_J)$, где супремум берется по всем замкнутым подынтервалам J интервала I .

Кривая $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется *спрямляемой*, если $\ell(\alpha) < \infty$. Кривая называется *локально спрямляемой*, если каждая ее замкнутая подкривая спрямляема.

Рассмотрим замкнутую кривую $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Предположим, что она спрямляема. Определим функцию $s_\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ равенством $s_\alpha(t) = \ell(\alpha|_{[a,t]})$. Для спрямляемой кривой α существует единственная кривая $\alpha^0 : [0, \ell(\alpha)] \rightarrow \mathbb{R}^n$, полученная из α монотонно возрастающей заменой параметра, такая, что $s_{\alpha^0}(t) = t$ и $\alpha = \alpha^0 \circ s_\alpha$ [23, 2.4]. Кривая α^0 называется *натуральной параметризацией* кривой α .

Пусть $A \subset \mathbb{R}^n$ — борелевское множество и $\rho : A \rightarrow [0, \infty]$ — борелевская функция. Интеграл от ρ вдоль спрямляемой кривой $\alpha : [a, b] \rightarrow A$ определяется следующим образом:

$$\int_\alpha \rho ds = \int_0^{\ell(\alpha)} \rho(\alpha^0(t)) dt,$$

где справа стоит обычный интеграл Лебега. Если кривая α абсолютно непрерывна, то [23, 4.1]

$$\int_\alpha \rho ds = \int_a^b \rho(\alpha(t)) |\dot{\alpha}(t)| dt. \quad (3)$$

Для локально спрямляемой кривой $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ полагаем

$$\int_\alpha \rho ds = \sup_\beta \int_\beta \rho ds, \quad (4)$$

где супремум берется по всем замкнутым подкривым β кривой α .

Пусть Γ — семейство кривых в \mathbb{R}^n , $n \geq 2$. Борелевская функция $\rho : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$ называется *допустимой* для Γ , если

$$\int_\gamma \rho ds \geq 1 \quad (5)$$

для каждой локально спрямляемой кривой $\gamma \in \Gamma$. Совокупность всех допустимых функций обозначаем через $\text{adm } \Gamma$. Для весовой функции $\omega : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$ и $p \in [1, \infty)$ определим ω -весовой p -модуль семейства Γ формулой

$$\text{mod}_p^\omega \Gamma = \inf_{\rho \in \text{adm } \Gamma} \int_{\mathbb{R}^n} \rho^p \omega \, dm_n.$$

Свойства весовой функции будем оговаривать отдельно (как минимум предполагается, что она локально суммируема и почти всюду $\omega > 0$). При $\omega \equiv 1$ получаем обычное определение p -модуля и вместо $\text{mod}_p^\omega \Gamma$ будем писать $\text{mod}_p \Gamma$. Если $\text{adm } \Gamma = \emptyset$ (этот случай реализуется только тогда, когда в семействе Γ есть хотя бы одна кривая, задающая постоянное отображение), то полагаем $\text{mod}_p^\omega \Gamma = \infty$.

Если Γ — семейство кривых в области Ω и $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ — непрерывное отображение, то через $f(\Gamma)$ обозначаем семейство кривых $f \circ \gamma$, где $\gamma \in \Gamma$.

ЗАМЕЧАНИЕ 1. Как следует из определения модуля, кривые, которые не являются локально спрямляемыми, можно не учитывать. Точнее, если Γ — семейство кривых и Γ_1 — семейство таких $\gamma \in \Gamma$, что γ локально спрямляема, то $\text{mod}_p^\omega \Gamma = \text{mod}_p^\omega \Gamma_1$. В связи с этим, допуская известную вольность, будем говорить, что семейство кривых, которые не являются локально спрямляемыми, имеет нулевой модуль.

Пусть α — спрямляемая замкнутая кривая в \mathbb{R}^n . Отображение $g : |\alpha| \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется абсолютно непрерывным на α , если $g \circ \alpha^0$ абсолютно непрерывно на $[0, \ell(\alpha)]$.

Теорема Фугледе [2]. Пусть $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ — отображение класса $\text{ACL}^p(\Omega)$, $p \geq 1$, и Γ — семейство локально спрямляемых кривых в Ω такое, что каждая кривая имеет замкнутую подкривую, на которой f не абсолютно непрерывно. Тогда $\text{mod}_p \Gamma = 0$.

Из теоремы Фугледе и некоторых дополнительных соображений (см. [12, замечание 2.13]) можно вывести

Предложение 5. Пусть функция $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, принадлежащая классу $\text{ACL}^p(\Omega)$, абсолютно непрерывна на спрямляемой кривой $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$. Тогда

$$|u(\gamma(a)) - u(\gamma(b))| \leq \int_{\gamma} |\nabla u| \, ds.$$

§ 3. Аналог леммы Полецкого

В доказательстве модульных неравенств проводятся рассуждения, обосновывающие возможность параметризации кривой некоторым специальным образом. Впервые эти рассуждения были реализованы в лемме 6 из [5], которая в дальнейшем получила название леммы Полецкого. Нам потребуется ее аналог. Прежде чем его сформулировать, выясним содержание понятия абсолютной преднепрерывности, которое заключает в себе описание специального типа параметризации.

Предположим, что $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ — непрерывное открытое дискретное отображение. Пусть $\beta : I_0 \rightarrow \mathbb{R}^n$ — замкнутая спрямляемая кривая и $\alpha : I \rightarrow \Omega$ — кривая такая, что $f \circ \alpha \subset \beta$, т. е. $I \subset I_0$. Если функция $s_\beta : I_0 \rightarrow [0, \ell(\beta)]$

постоянна на некотором интервале $J \subset I$, то и отображение β постоянно на J . В свою очередь, ввиду дискретности f отображение α также постоянно на J . Следовательно, существует единственное отображение $\alpha^* : s_\beta(I) \rightarrow \Omega$ такое, что $\alpha = \alpha^* \circ s_\beta|_I$. Легко видеть, что α^* непрерывно и $f \circ \alpha^* \subset \beta^0$. Кривая α^* называется *f-представителем кривой α (относительно β)*, если $\beta = f \circ \alpha$. Предположим теперь, что $\beta = f \circ \alpha$. Отображение f называется *абсолютно преднепрерывным на α* , если α^* абсолютно непрерывно.

Приведем аналог леммы Полецкого.

Лемма 1. Пусть $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ — отображение с $(\theta, 1)$ -весовым ограниченным (p, q) -искажением, $n - 1 < q \leq p < \infty$, а весовая функция $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x)$ локально суммируема. Предположим, что Γ — семейство кривых в Ω такое, что для любой кривой $\gamma \in \Gamma$ выполнено следующее: кривая $f \circ \gamma$ локально спрямляема и γ имеет замкнутую подкривую α , на которой f не абсолютно преднепрерывно. Тогда $\text{mod}_{p'} f(\Gamma) = 0$, где $p' = \frac{p}{p-(n-1)}$.

В доказательстве этой леммы большое значение имеют свойства функции Полецкого, которая определяется следующим образом. Пусть $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ — непрерывное открытое дискретное отображение, сохраняющее ориентацию, $U \subset \Omega$ — нормальная область и $N = \mu(f, U)$. На множестве $V = f(U)$ определим отображение $g_U : V \rightarrow \mathbb{R}^n$, называемое функцией Полецкого, равенством

$$V \ni y \mapsto g_U(y) = \frac{1}{N} \sum_{x \in f^{-1}(y) \cap U} i(x, f)x. \quad (6)$$

Необходимые нам свойства отображения (6) будут приведены в предложении 6, для формулировки которого нужно сделать следующее замечание. Поскольку отображение $f : \Omega \rightarrow \Omega' = f(\Omega)$ принадлежит классу Соболева, оно аппроксимативно дифференцируемо почти всюду. Следовательно (см., например, [27; 25, теорема 3.1.8]), существует борелевское множество $\Sigma \subset \Omega$, $m_n(\Sigma) = 0$, вне которого f обладает \mathcal{N} -свойством Лузина. Обозначим $Z = \{x \in \Omega \setminus \Sigma : J(x, f) = 0\}$. С точностью до множества меры нуль множество Z можно считать борелевским. Кроме того, $m_n(Z) = 0$. Также можно считать, что $B_f \subset Z \cup \Sigma$, так как $Df(x) = 0$ в точках $x \in B_f$, где $Df(x)$ существует.

Дополнение $\Omega \setminus \Sigma$ можно разложить на счетную совокупность дизъюнктивных измеримых множеств F_k , $k \in \mathbb{N}$, таких, что $\bigcup F_k = \Omega \setminus \Sigma$ и отображение $f|_{F_k} : F_k \rightarrow \Omega'$ липшицево для всех $k \in \mathbb{N}$ (см. [27; 25, теорема 3.1.8]). Каждое множество $F_k \setminus Z$ представимо в виде объединения счетного семейства дизъюнктивных измеримых множеств F_{km} , $m \in \mathbb{N}$, таких, что отображение $f|_{F_{km}} : F_{km} \rightarrow \Omega'$ билипшицево для всех $m \in \mathbb{N}$ [25, лемма 3.2.2]. Согласно теореме Радемахера [25, теорема 3.1.6] отображения $f|_{F_{km}} : F_{km} \rightarrow \Omega'$ дифференцируемы почти всюду на области определения, а в силу теоремы Лебега о дифференцировании аддитивной функции [28, 29] множества F_{km} можно считать состоящими только из точек плотности. Переобозначим семейство дизъюнктивных множеств $\{F_{km}\}$ как $\{E_l\}$. Получим разложение

$$\Omega = \Sigma \cup Z \cup \bigcup_{l \in \mathbb{N}} E_l, \quad (7)$$

в правой части которого все множества дизъюнктивны. Ему соответствует разложение в образе:

$$\Omega' = Z' \cup \Sigma' \cup \bigcup_{l \in \mathbb{N}} E'_l,$$

где $Z' = f(\Sigma)$, $\Sigma' = f(Z)$, $E'_l = f(E_l)$, причем $m_n(\Sigma') = 0$, а Z' может иметь положительную m_n -меру. Можно считать, что $f(B_f) \subset Z' \cup \Sigma'$.

Сформулируем свойства функции Полецкого.

Предложение 6 [17, теорема 1]. *Предположим, что непрерывное, открытое и дискретное отображение $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ принадлежит классу $W^1_{q,\text{loc}}(\Omega)$, $q > n - 1$, $J(x, f) \geq 0$ почти всюду и f имеет конечное коискажение: $\text{adj } Df = 0$ почти всюду на множестве $Z = \{x \in \Omega : J(x, f) = 0\}$. Тогда*

1) f сохраняет ориентацию;

2) отображение g_U , определенное равенством (6), непрерывно, принадлежит классу Соболева $W^1_1(V)$ и имеет конечное искажение, т. е. $Dg_U(y) = 0$ почти всюду на множестве нулей якобиана $\det Dg_U(y)$. Более того, $f((\Sigma \cup Z) \cap U) \subset \{y \in V : Dg_U(y) = 0\}$, в частности, $f(B_f \cap U) \subset \{y \in V : Dg_U(y) = 0\}$.

ЗАМЕЧАНИЕ 2. Отображение с $(\theta, 1)$ -весовым ограниченным (p, q) -искажением в силу конечности искажения имеет конечное коискажение, поэтому согласно предложению 6 сохраняет ориентацию.

Также нам потребуется

Предложение 7 [18, следствие 4]. *Пусть гомеоморфизм $\varphi : \Omega \rightarrow \Omega'$ областей пространства \mathbb{R}^n принадлежит классу Соболева $W^1_{q,\text{loc}}(\Omega)$, $n - 1 \leq q \leq \infty$, и имеет конечное коискажение: $\text{adj } D\varphi = 0$ почти всюду на множестве $Z = \{x \in \Omega : J(x, \varphi) = 0\}$. Тогда обратный гомеоморфизм φ^{-1} принадлежит классу Соболева $W^1_{1,\text{loc}}(\Omega')$ и имеет конечное искажение: $D\varphi^{-1}(y) = 0$ почти всюду на множестве $Z' = \{y \in \Omega' : J(y, \varphi^{-1}) = 0\}$.*

Доказательству леммы 1 предпошлем несколько утверждений.

Лемма 2. *Пусть $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ — отображение с $(\theta, 1)$ -весовым ограниченным (p, q) -искажением, $n - 1 < q \leq p < \infty$, а весовая функция $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x)$ локально суммируема. Тогда отображение g_U , определенное равенством (6), принадлежит классу $\text{ACL}^{p'}(V)$, где $p' = \frac{p}{p-(n-1)}$.*

ЗАМЕЧАНИЕ 3. Это утверждение может быть получено как следствие более общей теоремы 4 из [16]. Тем не менее приведем непосредственное доказательство, так как его элементы потребуются нам в дальнейшем. Данное доказательство не повторяет рассуждений из [16], хотя и основано на сходных идеях.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно предложению 6 отображение g_U непрерывно и $g_U \in W^1_1(V)$, следовательно, $g_U \in \text{ACL}(V)$ в силу предложения 2. Осталось показать, что частные производные отображения g_U принадлежат классу $L_{p'}(V)$. Пусть $y_0 \in V' = V \setminus f(B_f \cap U)$. Тогда ввиду пп 1, 2 предложения 1 множество $f^{-1}(y_0) \cap U$ состоит из N точек x_1, \dots, x_N . Через U_1, \dots, U_N обозначим непересекающиеся нормальные окрестности точек x_1, \dots, x_N . Отображения $f|_{U_j} : U_j \rightarrow f(U_j)$, $j = 1, \dots, N$, являются гомеоморфизмами, удовлетворяющими условию предложения 7. Тогда если возьмем область W такую, что $y_0 \ni W \subset f(U_1) \cap \dots \cap f(U_N)$, то получим обратные гомеоморфизмы $h_j : W \rightarrow f^{-1}(W) \cap U_j$ класса $W^1_{1,\text{loc}}(W)$. Эти соображения позволяют сделать следующий вывод: если $\{B_i\}_{i=1}^\infty$ — счетный набор непересекающихся открытых шаров, покрывающих V' с точностью до множества меры нуль (существующий по теореме Витали (см., например, [26, 1.5.1, следствие 2])), то каждое множество $f^{-1}(B_i) \cap U$ имеет N компонент связности D_{ij} , $j = 1, \dots, N$, при этом возникают гомеоморфизмы $h_{ij} : B_i \rightarrow D_{ij}$, $j = 1, \dots, N$, класса $W^1_1(B_i)$. Таким

образом, почти всюду в B_i определена матрица Якоби Dh_{ij} . Из (6) следует, что для $y \in B_i$

$$g_U(y) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N h_{ij}(y).$$

Если $g_{s,U}$ — s -я координатная функция отображения g_U , то для почти всех $y \in B_i$ справедлива цепочка неравенств, где $k = 1, \dots, n$:

$$\left| \frac{\partial g_{s,U}}{\partial y_k}(y) \right|^{p'} \leq |Dg_U(y)|^{p'} \leq \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N |Dh_{ij}(y)| \right)^{p'} \leq \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N |Dh_{ij}(y)|^{p'}.$$

На множестве $B_i \setminus (Z' \cup \Sigma')$ справедливы известные из алгебры соотношения

$$Dh_{ij}(y) = \frac{\text{adj } Df(h_{ij}(y))}{J(h_{ij}(y), f)}, \quad |\text{adj } Df(h_{ij}(y))| \leq |Df(h_{ij}(y))|^{n-1}.$$

Используя их и формулу замены переменной, перейдем от интегрирования по $B_i \setminus (Z' \cup \Sigma')$ к интегрированию по $D_{ij} \setminus (Z \cup \Sigma) = h_{ij}(B_i) \setminus (Z \cup \Sigma)$:

$$\begin{aligned} \int_{B_i \setminus (Z' \cup \Sigma')} |Dh_{ij}(y)|^{p'} dy &= \int_{B_i \setminus (Z' \cup \Sigma')} \frac{|\text{adj } Df(h_{ij}(y))|^{p'}}{J(h_{ij}(y), f)^{p'}} dy \\ &\leq \int_{D_{ij} \setminus (Z \cup \Sigma)} \frac{|Df(x)|^{p'(n-1)}}{J(x, f)^{p'}} J(x, f) dx. \quad (8) \end{aligned}$$

Рассмотрим два случая.

СЛУЧАЙ I: $q < p$. К последнему интегралу в (8) применим неравенство Гёльдера с показателями q'/p' и $q'/(q' - p')$, где $q' = q/(q - (n - 1))$, предварительно умножив и поделив подынтегральное выражение на $\omega^{p'/q'}$:

$$\begin{aligned} \int_{D_{ij} \setminus (Z \cup \Sigma)} \frac{\omega^{p'/q'}(x) |Df(x)|^{p'(n-1)}}{\omega^{p'/q'}(x) J(x, f)^{p'}} J(x, f) dx \\ \leq \left(\int_{D_{ij} \setminus (Z \cup \Sigma)} \omega(x) dx \right)^{\frac{p'}{q'}} \left(\int_{D_{ij} \setminus (Z \cup \Sigma)} \frac{|Df(x)|^{\frac{p'q'(n-1)}{q'-p'}}}{\omega^{\frac{p'}{q'-p'}}(x) J(x, f)^{\frac{(p'-1)q'}{q'-p'}}} dx \right)^{\frac{q'-p'}{q'}}. \end{aligned}$$

Элементарные вычисления показывают, что

$$\frac{p'q'(n-1)}{q'-p'} = \frac{pq}{p-q}, \quad \frac{p'}{q'-p'} \cdot \frac{-(n-1)}{q-(n-1)} = -\frac{p}{p-q}, \quad \frac{(p'-1)q'}{q'-p'} = \frac{q}{p-q}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \int_{B_i \setminus (Z' \cup \Sigma')} |Dh_{ij}(y)|^{p'} dy \\ \leq \left(\int_{D_{ij} \setminus (Z \cup \Sigma)} \omega(x) dx \right)^{\frac{p'}{q'}} \left(\int_{D_{ij} \setminus (Z \cup \Sigma)} \left(\frac{\theta^{\frac{1}{q}}(x) |Df(x)|}{J(x, f)^{\frac{1}{p}}} \right)^{\frac{pq}{p-q}} dx \right)^{\frac{q'-p'}{q'}}. \end{aligned}$$

Далее, в силу предложения 6 почти всюду на $(Z' \cup \Sigma') \cap U$ частные производные g_U обращаются в нуль, значит, интеграл по V можно заменить интегралом по объединению множеств $B_i \setminus (Z' \cup \Sigma')$; применяя также неравенство Гёльдера для сумм с показателями q'/p' и $q'/(q' - p')$, вспоминая (1) и учитывая суммируемость ω , получаем

$$\begin{aligned} \int_V \left| \frac{\partial g_{s,U}}{\partial y_k}(y) \right|^{p'} dy &= \sum_{i \in \mathbb{N}} \int_{B_i \setminus (Z' \cup \Sigma')} \left| \frac{\partial g_{s,U}}{\partial y_k}(y) \right|^{p'} dy \\ &\leq \frac{1}{N} \sum_{i \in \mathbb{N}} \sum_{j=1}^N \int_{B_i \setminus (Z' \cup \Sigma')} |Dh_{ij}(y)|^{p'} dy \\ &\leq \frac{1}{N} \left(\sum_{i,j} \int_{D_{ij} \setminus (Z \cup \Sigma)} \omega(x) dx \right)^{\frac{p'}{q'}} \left(\sum_{i,j} \int_{D_{ij} \setminus (Z \cup \Sigma)} \left(\frac{\theta^{\frac{1}{q}}(x) |Df(x)|}{J(x, f)^{\frac{1}{p}}} \right)^{\frac{pq}{p-q}} dx \right)^{\frac{q'-p'}{q'}} \\ &= \frac{1}{N} \|\omega \mid L_1(\bigcup D_{ij} \setminus (Z \cup \Sigma))\|_{\frac{p'}{q'}}^{\frac{p'}{q'}} \|\mathcal{H}_{p,q}^{\theta,1}(\cdot, f) \mid L_{\frac{pq}{p-q}}(\bigcup D_{ij} \setminus (Z \cup \Sigma))\|_{\frac{pq}{p-q}}^{\frac{q'-p'}{q'}} \\ &\leq \frac{1}{N} \|\omega \mid L_1(U)\|_{\frac{p'}{q'}}^{\frac{p'}{q'}} K_{p,q}^{\theta,1}(f; U)^{p'(n-1)} < \infty. \end{aligned}$$

Случай II: $p = q$. К последнему интегралу из (8) применим неравенство Гёльдера с показателями 1 и ∞ , предварительно умножив и поделив подынтегральное выражение на ω :

$$\begin{aligned} \int_{D_{ij} \setminus (Z \cup \Sigma)} \frac{\omega(x) |Df(x)|^{p'(n-1)}}{\omega(x) J(x, f)^{p'}} J(x, f) dx \\ \leq \left(\int_{D_{ij} \setminus (Z \cup \Sigma)} \omega(x) dx \right) \operatorname{ess\,sup}_{x \in D_{ij} \setminus (Z \cup \Sigma)} \frac{|Df(x)|^{p'(n-1)}}{\omega(x) J(x, f)^{p'-1}}. \end{aligned}$$

Учитывая, что

$$\frac{p' - 1}{p'(n - 1)} = \frac{1}{p}, \quad -\frac{n - 1}{q - (n - 1)} \cdot \frac{1}{p'(n - 1)} = -\frac{n - 1}{p - (n - 1)} \cdot \frac{1}{p'(n - 1)} = -\frac{1}{p},$$

получаем

$$\begin{aligned} \int_{B_i \setminus (Z' \cup \Sigma')} |Dh_{ij}(y)|^{p'} dy \\ \leq \left(\int_{D_{ij} \setminus (Z \cup \Sigma)} \omega(x) dx \right) \operatorname{ess\,sup}_{x \in D_{ij} \setminus (Z \cup \Sigma)} \left(\frac{\theta^{\frac{1}{p}}(x) |Df(x)|}{J(x, f)^{\frac{1}{p}}} \right)^{p'(n-1)}. \end{aligned}$$

Принимая во внимание соотношения

$$\begin{aligned} \operatorname{ess\,sup}_{x \in D_{ij} \setminus (Z \cup \Sigma)} \left(\frac{\theta^{\frac{1}{p}}(x) |Df(x)|}{J(x, f)^{\frac{1}{p}}} \right)^{p'(n-1)} \\ \leq \left(\operatorname{ess\,sup}_{x \in \bigcup D_{ij} \setminus (Z \cup \Sigma)} \frac{\theta^{\frac{1}{p}}(x) |Df(x)|}{J(x, f)^{\frac{1}{p}}} \right)^{p'(n-1)} \end{aligned}$$

$$\leq \| \mathcal{K}_{p,q}^{\theta,1}(\cdot, f) | L_\infty(\bigcup D_{ij} \setminus (Z \cup \Sigma)) \|^{p'(n-1)} \leq \| \mathcal{K}_{p,q}^{\theta,1}(\cdot, f) | L_\infty(U) \|^{p'(n-1)},$$

а также предложение 6, выводим

$$\begin{aligned} \int_V \left| \frac{\partial g_{s,U}}{\partial y_k}(y) \right|^{p'} dy &= \sum_{i \in \mathbb{N}} \int_{B_i \setminus (Z' \cup \Sigma')} \left| \frac{\partial g_{s,U}}{\partial y_k}(y) \right|^{p'} dy \\ &\leq \frac{1}{N} \sum_{i \in \mathbb{N}} \sum_{j=1}^N \int_{B_i \setminus (Z' \cup \Sigma')} |Dh_{ij}(y)|^{p'} dy \\ &\leq \frac{1}{N} \| \mathcal{K}_{p,q}^{\theta,1}(\cdot, f) | L_\infty(U) \|^{p'(n-1)} \int_{\bigcup D_{ij} \setminus (Z \cup \Sigma)} \omega(x) dx \\ &\leq \frac{1}{N} \|\omega | L_1(U)\| K_{p,q}^{\theta,1}(f; U)^{p'(n-1)} < \infty. \end{aligned}$$

Лемма доказана.

Для того чтобы перейти к следующей лемме, фиксируем область $D \Subset \Omega$. Удалим из нее множество точек ветвления. Тогда для всякого $x \in D \setminus B_f$ найдется число $r(x) > 0$ такое, что открытый шар $B(x, r(x))$ содержится в $D \setminus B_f$ и f инъективно на $B(x, r(x))$. В силу теоремы Безиковича (см., например, [26, 1.5.2, теорема 2]) в семействе $\{B(x, r(x)) : x \in D \setminus B_f\}$ найдется счетный набор шаров $\{B_j\}$ таких, что

$$D \setminus B_f \subset \bigcup_{j \in \mathbb{N}} B_j, \quad \sum_{j \in \mathbb{N}} \chi_{B_j}(x) \leq C(n),$$

где последнее неравенство выполняется для любой точки $x \in D \setminus B_f$, а постоянная $C(n)$ зависит только от размерности пространства.

Согласно предложению 7 обратные отображения $h_j = (f|_{B_j})^{-1} : f(B_j) \rightarrow B_j$ принадлежат классу Соболева $W_1^1(f(B_j))$ и имеют конечное искажение. Через A_j обозначим борелевское множество точек $y \in f(B_j)$, в которых определена матрица Якоби Dh_j . Поскольку h_j принадлежит классу Соболева, $m_n(f(B_j) \setminus A_j) = 0$. Положив $Dh_j(y) = 0$ в точках $y \in f(B_j) \setminus A_j$, получим борелевские функции $|Dh_j| : f(B_j) \rightarrow \mathbb{R}$. Определим борелевскую функцию $\rho_0 = \sup_{j \in \mathbb{N}} |Dh_j| \chi_{f(B_j)}$.

Положим $B_f^k = \{x \in D : i(x, f) = k\}$, $k \geq 2$. Каждая точка $x \in B_f^k$ обладает нормальной окрестностью $U \subset D$. Покроем множество B_f^k такими нормальными окрестностями U_{ki} , $i \in \mathbb{N}$, и обозначим через g_{ki} отображения $g_{U_{ki}}$, определенные формулой (6). Через G_{ki} обозначим борелевское множество точек $y \in f(U_{ki})$, в которых определена матрица Якоби Dg_{ki} . Поскольку g_{ki} принадлежит классу Соболева, $m_n(f(U_{ki}) \setminus G_{ki}) = 0$. Положив $Dg_{ki}(y) = 0$ в точках $y \in f(U_{ki}) \setminus G_{ki}$, получим борелевские функции $|Dg_{ki}| : f(U_{ki}) \rightarrow \mathbb{R}$. Определим борелевские функции $\eta_{ki} = |Dg_{ki}| \chi_{f(U_{ki})}$. Введем также борелевское множество

$$F = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} (f(B_j) \setminus A_j) \cup \bigcup_{\substack{k \geq 2, \\ i \in \mathbb{N}}} (f(U_{ki}) \setminus G_{ki}).$$

Легко видеть, что $m_n(F) = 0$.

Лемма 3 (ср. с [10, II.7.2]). Пусть $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ — отображение с $(\theta, 1)$ -весовым ограниченным (p, q) -искажением, $n - 1 < q \leq p < \infty$, а весовая функция $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x)$ локально суммируема. Через Γ_0 обозначим семейство замкнутых кривых α в области D таких, что либо кривая $f \circ \alpha$ неспрямляема, либо $f \circ \alpha$ спрямляема и по крайней мере одно из следующих условий неверно:

- 1) $\int_{f \circ \alpha} \chi_F ds = 0$;
- 2) $\int_{f \circ \alpha} \rho_0 ds < \infty$;
- 3) если β — замкнутая подкривая кривой α и $|\beta| \subset B_j$, то h_j абсолютно непрерывно на $f \circ \beta$;
- 4) если β — замкнутая подкривая кривой α и $|\beta| \subset U_{ki}$, то g_{ki} абсолютно непрерывно на $f \circ \beta$;
- 5) если β — замкнутая подкривая кривой α и $|\beta| \subset U_{ki}$, то

$$\int_{f \circ \beta} \eta_{ki} ds < \infty.$$

Тогда $\text{mod}_{p'} f(\Gamma_0) = 0$, где $p' = \frac{p}{p-(n-1)}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если семейство Γ_0 состоит из замкнутых кривых α таких, что кривые $f \circ \alpha$ неспрямляемы, то $\text{mod}_{p'} f(\Gamma_0) = 0$ в силу замечания 1. Далее будем считать, что все кривые $f \circ \alpha$ спрямляемы. Через Γ_q , $q = 1, \dots, 5$, обозначим совокупность кривых $\alpha \in \Gamma_0$, для которых условие q) не выполняется. Если покажем, что $\text{mod}_{p'} f(\Gamma_q) = 0$ для всех q , то отсюда будет следовать, что $\text{mod}_{p'} f(\Gamma_0) = 0$.

1. Если $\alpha \in \Gamma_1$, то $f \circ \alpha$ — кривые такие, что $\int_{f \circ \alpha} \chi_F ds > 0$. Определим борелевскую функцию $\tau : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$, полагая $\tau(x) = \infty$, если $x \in F$, и $\tau(x) = 0$, если $x \notin F$. Тогда $\tau \in \text{adm } f(\Gamma_1)$, поскольку $\int_{f \circ \alpha} \tau ds = \infty$. Следовательно,

$$\text{mod}_{p'} f(\Gamma_1) \leq \int_{\mathbb{R}^n} \tau^{p'}(x) dx = \int_F \tau^{p'}(x) dx = 0, \quad \text{так как } m_n(F) = 0.$$

2. Согласно неравенству Гёльдера с показателями p' и p'' , $1/p' + 1/p'' = 1$, имеем (учтено, что характеристическая функция равна 1 или 0)

$$\begin{aligned} \sum_{j \in \mathbb{N}} |Dh_j(y)| \chi_{f(B_j)}(y) &= \sum_{j \in \mathbb{N}} (|Dh_j(y)| \chi_{f(B_j)}(y) \cdot \chi_{f(B_j)}(y)) \\ &\leq \left(\sum_{j \in \mathbb{N}} |Dh_j(y)|^{p'} \chi_{f(B_j)}(y) \right)^{1/p'} \left(\sum_{j \in \mathbb{N}} \chi_{f(B_j)}(y) \right)^{1/p''} \\ &\leq (C(n))^{1/p''} \left(\sum_{j \in \mathbb{N}} |Dh_j(y)|^{p'} \chi_{f(B_j)}(y) \right)^{1/p'}. \end{aligned}$$

Предложение 7 говорит о том, что $Dh_j = 0$ почти всюду на $Z' \cap f(B_j)$. Принимая во внимание полученное неравенство, определение функции ρ_0 , конечнократность покрытия, а также что $m_n(\Sigma') = 0$, и проделав те же выкладки, что и в доказательстве леммы 2, получаем (знак интеграла и знак суммы переставлены по теореме Бешпо Леви для рядов [24, гл. V, § 5, п. 5])

$$\int_{\mathbb{R}^n} \rho_0^{p'} dm_n = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\sup_{j \in \mathbb{N}} |Dh_j(y)| \chi_{f(B_j)}(y) \right)^{p'} dy \leq \int_{\mathbb{R}^n} \left(\sum_{j \in \mathbb{N}} |Dh_j(y)| \chi_{f(B_j)}(y) \right)^{p'} dy$$

$$\begin{aligned} &\leq (C(n))^{\frac{p'}{p''}} \sum_{j \in \mathbb{N}} \int_{f(B_j) \setminus (Z' \cup \Sigma')} |Dh_j(y)|^{p'} dy \\ &\leq (C(n))^{\frac{p'}{p''}} C(n) \|\omega\| L_1(D) \|K_{p,q}^{\theta,1}(f; D)\|^{p'(n-1)} < \infty. \end{aligned}$$

В частности, $h_j \in \text{ACL}^{p'}(f(B_j))$.

Если $\alpha \in \Gamma_2$, то $\int_{f \circ \alpha} \rho_0 ds = \infty$. Следовательно, $\rho/\nu \in \text{adm } f(\Gamma_2)$ для всех $\nu \in \mathbb{N}$, и, значит,

$$\text{mod}_{p'} f(\Gamma_2) \leq \frac{1}{\nu^{p'}} \int_{\mathbb{R}^n} \rho_0^{p'} dm_n \quad \text{для всех } \nu \in \mathbb{N}.$$

Последнее неравенство означает, что $\text{mod}_{p'} f(\Gamma_2) = 0$.

3. Теорема Фуглде и $h_j \in \text{ACL}^{p'}(f(B_j))$ влекут равенство $\text{mod}_{p'} f(\Gamma_3) = 0$.
4. Из теоремы Фуглде и леммы 2 следует, что $\text{mod}_{p'} f(\Gamma_4) = 0$.
5. Из определения функции η_{ki} и леммы 2 получаем

$$\int_{\mathbb{R}^n} \eta_{ki}^{p'} dm_n = \int_{f(U_{ki})} |Dg_{ki}(y)|^{p'} dy < \infty.$$

Если $\alpha \in \Gamma_5$ и β — замкнутая подкривая кривой α , $|\beta| \subset U_{ki}$, то $\int_{f \circ \beta} \eta_{ki} ds = \infty$ и тем более $\int_{f \circ \alpha} \eta_{ki} ds = \infty$. Следовательно, $\eta_{ki}/\nu \in \text{adm } f(\Gamma_5)$ для всех $\nu \in \mathbb{N}$, и, значит,

$$\text{mod}_{p'} f(\Gamma_5) \leq \frac{1}{\nu^{p'}} \int_{\mathbb{R}^n} \eta_{ki}^{p'} dm_n \quad \text{для всех } \nu \in \mathbb{N},$$

откуда выводим, что $\text{mod}_{p'} f(\Gamma_5) = 0$. Лемма доказана.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЛЕММЫ 1. Пусть D — область, о которой шла речь выше, $\alpha : I_0 \rightarrow D$ — замкнутая кривая такая, что кривая $f \circ \alpha$ спрямляема и условия 1–5 из леммы 3 выполнены. Покажем, применяя предложение 4, что в таком случае отображение f абсолютно преднепрерывно на α , т. е. кривая $\alpha^* : I \rightarrow D$, где $I = s_{f \circ \alpha}(I_0)$, абсолютно непрерывна.

Заметим, что $f \circ \alpha^* = (f \circ \alpha)^0$. Таким образом, кривая $f \circ \alpha^*$ имеет натуральную параметризацию и, значит, липшицева. Поэтому интегрирование по этой кривой можно выполнять, используя формулу (3), в которой $|D(f \circ \alpha^*)(t)| = 1$ для почти всех $t \in I$.

ШАГ I. Здесь покажем, что α^* обладает \mathcal{N} -свойством Лузина. Очевидно, достаточно показать, что каждая координатная функция α_r^* , $r = 1, \dots, n$, отображения $\alpha^* = (\alpha_1^*, \dots, \alpha_n^*)$ обладает этим свойством на I . Пусть $J \subset I$ и $m_1(J) = 0$. Установим, что $m_1(\alpha_r^*(J)) = 0$. Дизъюнктному разложению $I = (I \setminus \alpha^{*-1}(B_f)) \cup \alpha^{*-1}(B_f)$ соответствует дизъюнктное разложение $J = J_1 \cup J_2$, где $J_1 \subset I \setminus \alpha^{*-1}(B_f)$, $J_2 \subset \alpha^{*-1}(B_f)$, $m_1(J_1) = m_1(J_2) = 0$.

Так как B_f — замкнутое множество, $\alpha^{*-1}(B_f)$ также замкнуто и, следовательно, множество $I \setminus \alpha^{*-1}(B_f)$ можно покрыть замкнутыми промежутками $\{I_\mu\}_{\mu \in \mathbb{N}}$ с не пересекающимися в $I \setminus \alpha^{*-1}(B_f)$ внутренностями таким образом, что множество $\alpha^*(I_\mu)$ содержится в некотором шаре B_{j_μ} . Поскольку $\alpha^*|_{I_\mu} = h_{j_\mu} \circ f \circ \alpha^*|_{I_\mu}$ для всякого $\mu \in \mathbb{N}$ и условие 3 леммы 3 выполнено,

функция $\alpha_r^*|_{I_\mu}$ абсолютно непрерывна для всех $r = 1, \dots, n$ и $\mu \in \mathbb{N}$ и, значит, $m_1(\alpha_r^*(J_1)) = 0$.

Теперь перейдем к множеству $J_2 \subset \alpha^{*-1}(B_f)$. Разложению

$$\alpha^{*-1}(B_f) = \bigcup_{k \geq 2} \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \alpha^{*-1}(B_f^k \cap U_{ki})$$

соответствует разложение

$$J_2 = \bigcup_{k \geq 2} \bigcup_{i \in \mathbb{N}} J_{2,ki},$$

где $J_{2,ki} \subset \alpha^{*-1}(B_f^k \cap U_{ki})$, и $m_1(J_{2,ki}) = 0$ для всех $k \geq 2, i \in \mathbb{N}$. Пусть замкнутый промежуток $J'_{2,ki} \subset I$ таков, что $|\beta| \subset U_{ki}$, где $\beta = \alpha^*|_{J'_{2,ki}}$. Так как выполнено условие 4 леммы 3 и $J_{2,ki} \subset J'_{2,ki}$, то $m_1((g_{ki} \circ f \circ \alpha^*)(J_{2,ki})) = 0$. Если $t \in \alpha^{*-1}(B_f^k \cap U_{ki})$, то $\alpha^*(t) = g_{ki} \circ f \circ \alpha^*(t)$. Таким образом, $m_1(\alpha_r^*(J_{2,ki})) = 0$. Поскольку объединение счетного семейства множеств меры нуль тоже имеет меру нуль, $m_1(\alpha_r^*(J_2)) = 0$.

Окончательно

$$m_1(\alpha_r^*(J)) = m_1(\alpha_r^*(J_1)) + m_1(\alpha_r^*(J_2)) = 0.$$

ШАГ II. Здесь установим один вспомогательный факт. Пусть замкнутый промежуток $J \subset I$ таков, что $|\beta| \subset U_{ki}$, где $\beta = \alpha^*|_J$. Так как свойство 4 леммы 3 выполнено, функция $g_{r,ki} \circ f \circ \beta$, где $g_{r,ki}$ — r -я координатная функция отображения g_{ki} , абсолютно непрерывна на J . Следовательно, $g_{r,ki} \circ f \circ \beta$ дифференцируема для m_1 -почти всех точек интервала J . Как уже отмечали, если $t \in \alpha^{*-1}(B_f^k \cap U_{ki})$, то $\alpha_r^*(t) = g_{r,ki} \circ f \circ \alpha^*(t)$. Отсюда следует, что функция $\alpha_r^* : \alpha^{*-1}(B_f^k \cap U_{ki}) \rightarrow \mathbb{R}$ аппроксимативно дифференцируема почти всюду на $\alpha^{*-1}(B_f^k \cap U_{ki})$, причем если $t_0 \in \alpha^{*-1}(B_f^k \cap U_{ki})$ — точка плотности множества $\alpha^{*-1}(B_f^k \cap U_{ki})$ и точка дифференцируемости функции $g_{r,ki} \circ f \circ \alpha^*$, то $\text{ар } \dot{\alpha}_r^*(t_0) = \frac{d}{dt}(g_{r,ki} \circ f \circ \alpha^*)(t_0)$. Докажем следующий факт: *аппроксимативная производная ар $\dot{\alpha}_r^*$ функции α_r^* обращается в нуль на множестве $\alpha^{*-1}(B_f^k \cap U_{ki})$ почти всюду относительно меры m_1 .*

Так как формулировка доказываемого факта содержит слова «почти всюду», случай, когда $m_1(\alpha^{*-1}(B_f)) = 0$, можно не рассматривать. Отметим, что в [10, с. 47, доказательство утверждения 5.1] доказательство проводится в предположении $m_1(\alpha^{*-1}(B_f)) = 0$, которое оказывается законным, так как в [10] отображение f обладает \mathcal{N} -свойством Лузина. Итак, рассмотрим случай $m_1(\alpha^{*-1}(B_f)) > 0$. Тогда для некоторых значений k и i имеем $m_1(\alpha^{*-1}(B_f^k \cap U_{ki})) > 0$. Возьмем точку $t_0 \in \alpha^{*-1}(B_f^k \cap U_{ki})$. Можно предполагать, что точка t_0 такова, что существует последовательность $\delta_l \rightarrow +0$ при $l \rightarrow \infty$ такая, что $t_0 + \delta_l \in \alpha^{*-1}(B_f^k \cap U_{ki})$ при каждом $l \in \mathbb{N}$. В самом деле, если ни одна точка множества $\alpha^{*-1}(B_f^k \cap U_{ki})$ не удовлетворяет этому условию, то это множество состоит из изолированных точек, и поэтому $m_1(\alpha^{*-1}(B_f^k \cap U_{ki})) = 0$. Можно также считать, что t_0 — точка дифференцируемости функции $g_{r,ki} \circ f \circ \alpha^*$ и точка плотности множества $\alpha^{*-1}(B_f^k \cap U_{ki})$. Поскольку условие 1 леммы 3 выполнено, для m_1 -почти всех $t \in J$ имеем $f(\alpha^*(t)) \notin F$. Вспоминая определение множества F , получаем, что для m_1 -почти всех $t \in J$ в точке $f(\alpha^*(t))$ определена матрица Якоби Dg_{ki} . Будем считать, что матрица Dg_{ki} определена в точке

$f(\alpha^*(t_0))$. Принимая во внимание условие 5 леммы 3, определение η_{ki} , формулу (3), а также то, что $|D(f \circ \alpha^*)(t)| = 1$ для почти всех $t \in J$, получаем

$$\int_J |\nabla g_{r,ki}(f(\alpha^*(t)))| dt \leq \int_J |Dg_{ki}(f(\alpha^*(t)))| dt = \int_{f \circ \beta} \eta_{ki} ds < \infty,$$

откуда следует, что функция $|\nabla g_{r,ki}(f(\alpha^*(t)))|$ интегрируема на J .

В силу предложения 3 можно считать, что t_0 — точка Лебега функции $|\nabla g_{r,ki}(f(\alpha^*(t)))|$. Определение производной, предложения 3 и 5, условие 4 леммы 3, формула (3) позволяют написать следующую цепочку соотношений:

$$\begin{aligned} \text{ар } \dot{\alpha}_r^*(t_0) &= \frac{d}{dt}(g_{r,ki} \circ f \circ \alpha^*)(t_0) = \lim_{l \rightarrow \infty} \frac{g_{r,ki} \circ f \circ \alpha^*(t_0 + \delta_l) - g_{r,ki} \circ f \circ \alpha^*(t_0)}{\delta_l} \\ &\leq \lim_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{\delta_l} \int_{(f \circ \alpha^*)|_{[t_0, t_0 + \delta_l]}} |\nabla g_{r,ki}| ds = \lim_{l \rightarrow \infty} \frac{1}{\delta_l} \int_{t_0}^{t_0 + \delta_l} |\nabla g_{r,ki}(f(\alpha^*(t)))| dt \\ &= |\nabla g_{r,ki}(f(\alpha^*(t_0)))| = 0, \end{aligned}$$

где последнее равенство выполняется в силу предложения 5: $Dg_{ki} = 0$ почти всюду на $f(B_f \cap U_{ki})$.

Шаг III. На этом шаге покажем, что модуль аппроксимативной производной $|\text{ар } \dot{\alpha}_r^*|$ интегрируем на I . Отметим, что функция α_r^* аппроксимативно дифференцируема m_1 -почти всюду на I . В самом деле, для каждого μ функция $\alpha_r^*|_{I_\mu}$ абсолютно непрерывна (см. шаг I) и, значит, дифференцируема почти всюду на I_μ (тем более аппроксимативно дифференцируема, причем $\text{ар } \dot{\alpha}_r^* = \dot{\alpha}_r^*$ почти всюду на I_μ); на предыдущем шаге показано, что α_r^* аппроксимативно дифференцируема почти всюду на $\alpha^{*-1}(B_f)$. Согласно утверждению, установленному на шаге II, имеем

$$\int_I |\text{ар } \dot{\alpha}_r^*| dm_1 = \sum_{\mu \in \mathbb{N}} \int_{I_\mu} |\dot{\alpha}_r^*| dm_1 \leq \sum_{\mu \in \mathbb{N}} \int_{I_\mu} |\dot{\alpha}^*| dm_1, \tag{9}$$

где промежутки I_μ те же, что и на шаге I.

Если кривая α^* спрямляема на промежутке I_μ (ниже покажем, что это действительно так), то согласно [30, теорема (8.4), п. (iv)] имеем

$$\int_{I_\mu} |\dot{\alpha}^*| dm_1 \leq \ell(\alpha^*|_{I_\mu}). \tag{10}$$

Установим оценку для величины $\ell(\alpha^*|_{I_\mu})$. Из определения (2), элементарного неравенства

$$\sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2} \leq |a_1| + \dots + |a_n|,$$

условия 1 леммы 3, которое означает, что для m_1 -почти всех $t \in I_\mu$ точка $f \circ \alpha^*(t)$ лежит в $f(B_{j_\mu})$ и в ней определен Dh_{j_μ} , а также из предложения 5, условия 3 леммы 3, соотношения $\alpha^*|_{I_\mu} = h_{j_\mu} \circ f \circ \alpha^*|_{I_\mu}$, формулы (3) и верного для почти всех $t \in I$ равенства $|D(f \circ \alpha^*)(t)| = 1$ получаем (супремум берется по всевозможным разбиениям промежутка I_μ точками t_1, \dots, t_{l+1})

$$\ell(\alpha^*|_{I_\mu}) = \sup \sum_{i=1}^l |\alpha^*(t_i) - \alpha^*(t_{i+1})| \leq \sup \sum_{i=1}^l \sum_{r'=1}^n |\alpha_{r'}^*(t_i) - \alpha_{r'}^*(t_{i+1})|$$

$$\begin{aligned} &\leq \sup_{i=1}^l \sum_{r'=1}^n \int_{(f \circ \alpha^*)|_{[t_i, t_{i+1}]}} |\nabla h_{r', j_\mu}| ds = \sup_{i=1}^l \int_{t_i}^{t_{i+1}} \sum_{r'=1}^n |\nabla h_{r', j_\mu}(f(\alpha^*(t)))| dt \\ &\leq n \sup_{i=1}^l \int_{t_i}^{t_{i+1}} |Dh_{j_\mu}(f(\alpha^*(t)))| dt \leq n \int_{I_\mu} |Dh_{j_\mu}(f \circ \alpha^*)| dm_1. \end{aligned}$$

С учетом полученного соотношения, а также используя (9), (10), условие 2 леммы 3 и определение функции ρ_0 , выводим

$$\int_I |\operatorname{ap} \dot{\alpha}_r^*| dm_1 \leq n \sum_{\mu \in \mathbb{N}} \int_{I_\mu} |Dh_{j_\mu}(f \circ \alpha^*)| dm_1 \leq n \int_{f \circ \alpha^*} \rho_0 ds < \infty.$$

ШАГ IV. Результаты шагов I и III вместе с предложением 4 говорят о том, что координатные функции α_r^* , $r = 1, \dots, n$, а значит, и кривая α^* абсолютно непрерывны, т. е. если $f \circ \alpha^*$ спрямляема и условия 1–5 леммы 3 выполнены, то f абсолютно преднепрерывно на α .

Чтобы завершить доказательство леммы 1, представим область Ω в виде $\Omega = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} D_i$, где $D_i \Subset \Omega$, $i \in \mathbb{N}$. Через Γ_i обозначим семейство замкнутых кривых α в D_i таких, что $f \circ \alpha$ спрямляема и f не абсолютно преднепрерывно на α . В силу сказанного выше это означает, что хотя бы одно из условий 1–5 не выполнено, и согласно заключению леммы 3 получаем $\operatorname{mod}_{p'} f(\Gamma_i) = 0$. Следовательно,

$$\operatorname{mod}_{p'} f(\Gamma) \leq \operatorname{mod}_{p'} \bigcup_{i \in \mathbb{N}} f(\Gamma_i) \leq \sum_{i \in \mathbb{N}} \operatorname{mod}_{p'} f(\Gamma_i) = 0.$$

Лемма доказана.

§ 4. Модульные неравенства

Сформулируем аналог неравенства Полецкого (ср. с [5, теорема 1]).

Теорема 1. Пусть $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ — отображение с $(\theta, 1)$ -весовым ограниченным (p, q) -искажением, $n - 1 < q \leq p < \infty$, а весовая функция $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x)$ локально суммируема. Если Γ — семейство кривых в области Ω , то справедливо неравенство

$$(\operatorname{mod}_{p'} f(\Gamma))^{1/p'} \leq K_{p,q}^{\theta,1}(f; \Omega)^{n-1} (\operatorname{mod}_q^\omega \Gamma)^{1/q'}, \tag{11}$$

где $p' = \frac{p}{p-(n-1)}$, $q' = \frac{q}{q-(n-1)}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В разложении (7) каждое множество E_l можно представить в виде $E_l = E_l^{\natural} \cup E_l^0$, где $m_n(E_l^0) = 0$, а в каждой точке множества E_l^{\natural} билипшицево отображение $f_l = f|_{E_l^{\natural}}$ дифференцируемо. Отметим, что множества E_l^{\natural} и E_l^0 борелевские. Обозначим $E^0 = \bigcup E_l^0$, тогда $m_n(E^0) = 0$ и, значит, $m_n(f(E^0)) = 0$, поскольку отображение f обладает \mathcal{N} -свойством Лузина вне множества Σ .

По функции $\rho \in \operatorname{adm} \Gamma$ построим борелевскую функцию $\tilde{\rho} : \Omega \rightarrow [0, \infty]$, положив

$$\tilde{\rho}(x) = \begin{cases} \frac{\rho(x)J(x,f)}{|\operatorname{adj} Df(x)|}, & \text{если } x \in \bigcup_{l \in \mathbb{N}} E_l^{\natural}, \\ 0 & \text{иначе.} \end{cases}$$

Определим также функцию $\hat{\rho} : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$ равенством

$$\hat{\rho}(y) = \chi_{f(\Omega \setminus E^0)}(y) \sup_{x \in f^{-1}(y) \cap \Omega \setminus E^0} \tilde{\rho}(x).$$

Легко видеть, что $\hat{\rho}(y) = \sup_{l \in \mathbb{N}} \hat{\rho}_l(y)$, где

$$\hat{\rho}_l(y) = \begin{cases} \tilde{\rho}(f_l^{-1}(y)), & \text{если } y \in f(E_l^\natural), \\ 0 & \text{иначе.} \end{cases} \quad (12)$$

Отметим, что функция $\hat{\rho}$ борелевская (см. [25, 2.3.2]).

ШАГ I. Здесь покажем, что $\hat{\rho} \in \text{adm } f(\Gamma)$. Ввиду замечания 1 считаем, что для любой кривой $\gamma \in \Gamma$ кривая $f \circ \gamma$ локально спрямляема.

Пусть $\gamma \in \Gamma$ и α — замкнутая подкривая кривой γ . Тогда для некоторой области $D \Subset \Omega$ имеем $\alpha : I \rightarrow D$. Согласно лемме 1 можно считать, что отображение f абсолютно преднепрерывно на α . Через α^* обозначаем f -представитель кривой α .

Вспомним множество F из леммы 3 (мы также будем использовать, не оговаривая особо, обозначения из последних двух абзацев, расположенных перед формулировкой этой леммы). Обозначим $C = F \cup f(E^0) \cup f(Z)$, где Z — множество из разложения (7). Можно считать, что $\int_{f \circ \alpha} \chi_C ds = 0$, поскольку p' -модуль семейства кривых, не удовлетворяющих этому условию, равен нулю, ибо $m_n(C) = 0$. Таким образом, предполагаем, что

$$\int_J \chi_C(f \circ \alpha^*(t)) dt = 0, \quad \text{где } J = s_{f \circ \alpha}(I).$$

Следовательно, для почти всех $t \in J$ имеем

$$f \circ \alpha^*(t) \in \bigcup_{l \in \mathbb{N}} f(E_l^\natural) \cup f(\Sigma), \quad f \circ \alpha^*(t) \in \bigcup_{j \in \mathbb{N}} A_j. \quad (13)$$

Положим $J = J_1 \cup J_2$, где $J_1 = \alpha^{*-1}(B_f)$, $J_2 = J \setminus J_1$. Пусть $\rho \in \text{adm } \Gamma$. Возможны несколько случаев.

СЛУЧАЙ I: $m_1(J_2 \cap \alpha^{*-1}(\Sigma)) = 0$ и $m_1(J_2) > 0$. Тогда можно считать, что для почти всех $t \in J_2$ верно включение $f \circ \alpha^*(t) \in \bigcup_{l \in \mathbb{N}} f(E_l^\natural)$. Учитывая дифференцируемость отображения f на множествах E_l^\natural , натуральную параметризацию кривой $f \circ \alpha^*$, а также справедливые для любой обратимой матрицы M соотношения

$$|Mh|_{|h|=1} \geq \inf_{|h|=1} |Mh| = |M^{-1}| = \frac{|\text{adj } M|}{|\det M|},$$

применяя правило дифференцирования композиции, для почти всех $t \in J_2$ получаем

$$1 = |D(f \circ \alpha^*)(t)| = \left| Df(\alpha^*(t)) \frac{\dot{\alpha}^*(t)}{|\dot{\alpha}^*(t)|} \right| |\dot{\alpha}^*(t)| \geq \frac{|\text{adj } Df(\alpha^*(t))|}{J(\alpha^*(t), f)} |\dot{\alpha}^*(t)|,$$

откуда

$$\tilde{\rho}(\alpha^*(t)) = \frac{\rho(\alpha^*(t)) J(\alpha^*(t), f)}{|\text{adj } Df(\alpha^*(t))|} \geq \rho(\alpha^*(t)) |\dot{\alpha}^*(t)| \quad \text{для почти всех } t \in J_2. \quad (14)$$

Поскольку $B_f \subset \Sigma \cup Z$, исходя из определения функции $\tilde{\rho}$, имеем

$$\tilde{\rho}(\alpha^*(t)) = 0 \quad \text{для всех } t \in J_1. \tag{15}$$

В силу утверждения, установленного на шаге II в доказательстве леммы 1, на J_1 почти всюду выполнено равенство $|\dot{\alpha}^*(t)| = 0$. Учитывая его, абсолютную непрерывность кривой α^* , формулу (3), соотношения (14), (15), а также определения функций $\tilde{\rho}$ и $\hat{\rho}$, выводим

$$\begin{aligned} \int_{\alpha} \rho ds &= \int_J (\rho \circ \alpha^*) |\dot{\alpha}^*| dm_1 = \int_{J_2} (\rho \circ \alpha^*) |\dot{\alpha}^*| dm_1 + \int_{J_1} (\rho \circ \alpha^*) |\dot{\alpha}^*| dm_1 \\ &\leq \int_{J_2} \tilde{\rho} \circ \alpha^* dm_1 + \int_{J_1} \tilde{\rho} \circ \alpha^* dm_1 = \int_J \tilde{\rho} \circ \alpha^* dm_1 \leq \int_J \hat{\rho} \circ f \circ \alpha^* dm_1 = \int_{f \circ \alpha} \hat{\rho} ds. \end{aligned}$$

Согласно (4) и (5) получаем $\hat{\rho} \in \text{adm } f(\Gamma)$.

СЛУЧАЙ II: $m_1(J_2 \cap \alpha^{*-1}(\Sigma)) > 0$ и $m_1(J_2) \neq m_1(\alpha^{*-1}(\Sigma))$. Представим J_2 в виде $J_2 = J_2^1 \cup J_2^2$ таким образом, что для почти всех точек $t \in J_2^1$ верно включение $f \circ \alpha^*(t) \in \bigcup_{l \in \mathbb{N}} f(E_l^{\natural})$, а для почти всех $t \in J_2^2$ выполнено включение $\alpha^*(t) \in \Sigma$, и значит, $f \circ \alpha^*(t) \in f(\Sigma)$. Рассуждая, как в случае I, имеем

$$\tilde{\rho}(\alpha^*(t)) \geq \rho(\alpha^*(t)) |\dot{\alpha}^*(t)| \quad \text{для почти всех } t \in J_2^1, \tag{16}$$

$$\tilde{\rho}(\alpha^*(t)) = 0 \quad \text{для почти всех } t \in J_2^2, \tag{17}$$

$$\tilde{\rho}(\alpha^*(t)) = 0 \quad \text{для всех } t \in J_1. \tag{18}$$

Докажем, что $|\dot{\alpha}^*(t)| = 0$ для почти всех $t \in J_2^2$. Пусть $t_0 \in J_2^2$ — точка дифференцируемости кривой α^* . Точка t_0 лежит в некотором замкнутом промежутке I_μ таком, что $\alpha^*(I_\mu) \subset B_{j_\mu}$ (см. шаг I доказательства леммы 1). Поскольку $m_1(J_2^2 \cap \alpha^{*-1}(\Sigma)) > 0$, можно считать, что существует последовательность $\delta_k \rightarrow +0$ при $k \rightarrow \infty$ такая, что $t_0 + \delta_k \in I_\mu \cap J_2^2$, т. е. $\alpha^*(t_0 + \delta_k) \in B_{j_\mu} \cap \Sigma$ для всех $k \in \mathbb{N}$. В силу (13) для m_1 -почти всех $t \in I_\mu$ имеем $f(\alpha^*(t)) \in A_{j_\mu}$. Будем считать, что матрица Dh_{j_μ} определена в точке $f(\alpha^*(t_0))$. Пусть α_r^* и h_{r,j_μ} — r -е координатные функции отображений α^* и h_{j_μ} соответственно. Поскольку $|\nabla h_{r,j_\mu}| \leq |Dh_{j_\mu}|$, ввиду условия 2 леммы 3 можно считать, что функция $|\nabla h_{r,j_\mu}(f(\alpha^*(t)))|$ интегрируема на I_μ . В силу предложения 3 можно предполагать, что t_0 — ее точка Лебега. Используя определение производной, предложения 3 и 5, условие 3 леммы 3, формулу (3) и равенство $\alpha^*|_{I_\mu} = h_{j_\mu} \circ f \circ \alpha^*|_{I_\mu}$, получаем

$$\begin{aligned} \dot{\alpha}_r^*(t_0) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\alpha_r^*(t_0 + \delta_k) - \alpha_r^*(t_0)}{\delta_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{h_{j_\mu} \circ f \circ \alpha^*(t_0 + \delta_k) - h_{j_\mu} \circ f \circ \alpha^*(t_0)}{\delta_k} \\ &\leq \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\delta_k} \int_{(f \circ \alpha^*)|_{[t_0 + \delta_k, t_0]}} |\nabla h_{r,j_\mu}| ds = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\delta_k} \int_{t_0}^{t_0 + \delta_k} |\nabla h_{r,j_\mu}(f(\alpha^*(t)))| dt \\ &= |\nabla h_{r,j_\mu}(f(\alpha^*(t_0)))| \leq |Dh_{j_\mu}(f(\alpha^*(t_0)))| = 0, \end{aligned}$$

где последнее равенство выполнено в силу предложения 7: гомеоморфизм h_{j_μ} имеет конечное искажение, т. е. $Dh_{j_\mu} = 0$ почти всюду на $Z' = f(\Sigma)$.

Теперь, учитывая, что $|\dot{\alpha}^*| = 0$ почти всюду на J_2^2 и на J_1 , а также принимая во внимание соотношения (16)–(18), абсолютную непрерывность кривой α^* , формулу (3) и определения функций $\tilde{\rho}$, $\hat{\rho}$, имеем

$$\begin{aligned} \int_{\alpha} \rho ds &= \int_J (\rho \circ \alpha^*) |\dot{\alpha}^*| dm_1 = \int_{J_2^2} (\rho \circ \alpha^*) |\dot{\alpha}^*| dm_1 + \int_{J_2^2} (\rho \circ \alpha^*) |\dot{\alpha}^*| dm_1 \\ &+ \int_{J_1} (\rho \circ \alpha^*) |\dot{\alpha}^*| dm_1 \leq \int_{J_2^2} \tilde{\rho} \circ \alpha^* dm_1 + \int_{J_2^2} \tilde{\rho} \circ \alpha^* dm_1 + \int_{J_1} \tilde{\rho} \circ \alpha^* dm_1 \\ &= \int_J \tilde{\rho} \circ \alpha^* dm_1 \leq \int_J \hat{\rho} \circ f \circ \alpha^* dm_1 = \int_{f \circ \alpha} \hat{\rho} ds. \end{aligned}$$

Ввиду (4) и (5) получаем $\hat{\rho} \in \text{adm } f(\Gamma)$.

СЛУЧАЙ III: $m_1(J_2) = 0$ или $m_1(J_2 \cap \alpha^{*-1}(\Sigma)) = m_1(J_2) = m_1(\alpha^{*-1}(\Sigma)) > 0$. В этой ситуации для почти всех $t \in J$ имеем $|\dot{\alpha}^*(t)| = 0$. Последнее означает, что абсолютно непрерывная кривая α^* задает постоянное отображение, но тогда $\text{mod}_{q'}^{\omega} \Gamma = \infty$, и неравенство (11) становится тривиальным.

ШАГ II. Установим неравенство (11). Учитывая определение функции $\hat{\rho}_l$, используя формулу замены переменной и неравенство $|\text{adj } Df_l| \leq |Df_l|^{n-1}$, имеем

$$\begin{aligned} \int_{\bigcup_{l \in \mathbb{N}} f(E_l^{\natural})} \hat{\rho}_l^{p'}(y) dy &= \int_{f(E_l^{\natural})} \frac{\rho^{p'}(f_l^{-1}(y)) J(y, f_l^{-1})^{p'}}{|\text{adj } Df_l^{-1}(y)|^{p'}} dy \\ &= \int_{E_l^{\natural}} \frac{\rho^{p'}(x) |\text{adj } Df_l(x)|^{p'}}{J(x, f_l)^{p'}} J(x, f_l) dx \leq \int_{E_l^{\natural}} \frac{\rho^{p'}(x) |Df_l(x)|^{p'(n-1)}}{J(x, f_l)^{p'}} J(x, f_l) dx. \end{aligned} \quad (19)$$

Далее рассмотрим два случая.

СЛУЧАЙ I: $q < p$. Рассуждаем точно так же, как и в случае I доказательств леммы 2. К последнему интегралу в (19) применим неравенство Гёльдера с показателями q'/p' и $q'/(q' - p')$, предварительно умножив и поделив подынтегральное выражение на $\omega^{p'/q'}$ (напомним, что $\varkappa = pq/(p - q)$), поэтому $(q' - p')/q' = p'(n - 1)/\varkappa$:

$$\begin{aligned} \int_{E_l^{\natural}} \frac{\rho^{p'}(x) \omega^{p'/q'}(x) |Df_l(x)|^{p'(n-1)}}{J(x, f_l)^{p'} \omega^{p'/q'}(x)} J(x, f_l) dx \\ \leq \left(\int_{E_l^{\natural}} \rho^{q'}(x) \omega(x) dx \right)^{\frac{p'}{q'}} \left(\int_{E_l^{\natural}} \left(\frac{\theta^{\frac{1}{q}}(x) |Df_l(x)|}{J(x, f_l)^{\frac{1}{p}}} \right)^{\varkappa} dx \right)^{\frac{p'(n-1)}{\varkappa}} \\ = \left(\int_{E_l^{\natural}} \rho^{q'}(x) \omega(x) dx \right)^{\frac{p'}{q'}} \left(\int_{E_l^{\natural}} \mathcal{K}_{p,q}^{\theta,1}(x, f)^{\varkappa} dx \right)^{\frac{p'(n-1)}{\varkappa}}. \end{aligned} \quad (20)$$

Заметим, что $\hat{\rho} = 0$ на $f(\Sigma)$ и $f(Z)$ и $m_n(E^0) = m_n(f(E^0)) = m_n(Z) = m_n(\Sigma) = 0$. С учетом (19), (20), (12) выводим, применяя неравенство Гёльдера для сумм с показателями q'/p' и $\varkappa/(p'(n-1))$ и теорему Бешпо Леви для рядов [24, гл. V, §5, п. 5]

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{\rho}^{p'}(y) dy &= \int_{\bigcup_{l \in \mathbb{N}} f(E_l^\natural)} \hat{\rho}^{p'}(y) dy = \int_{\bigcup_{l \in \mathbb{N}} f(E_l^\natural)} \sup_{l \in \mathbb{N}} \hat{\rho}_l^{p'}(y) dy \leq \int_{\bigcup_{l \in \mathbb{N}} f(E_l^\natural)} \sum_{l=1}^{\infty} \hat{\rho}_l^{p'}(y) dy \\ &\leq \sum_{l=1}^{\infty} \left(\int_{E_l^\natural} \rho^{q'}(x) \omega(x) dx \right)^{\frac{p'}{q'}} \left(\int_{E_l^\natural} \mathcal{K}_{p,q}^{\theta,1}(x, f)^\varkappa dx \right)^{\frac{p'(n-1)}{\varkappa}} \\ &\leq \left(\int_{\bigcup_{l \in \mathbb{N}} E_l^\natural} \rho^{q'}(x) \omega(x) dx \right)^{\frac{p'}{q'}} \left(\int_{\bigcup_{l \in \mathbb{N}} E_l^\natural} \mathcal{K}_{p,q}^{\theta,1}(x, f)^\varkappa dx \right)^{\frac{p'(n-1)}{\varkappa}} \\ &= K_{p,q}^{\theta,1}(f; \Omega)^{p'(n-1)} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \rho^{q'}(x) \omega(x) dx \right)^{\frac{p'}{q'}}. \end{aligned}$$

Чтобы вывести неравенство (11), осталось возвести первый и последний члены полученного соотношения в степень $1/p'$ и воспользоваться определением ω -веса модуля.

СЛУЧАЙ II: $p = q$. Действуя, как в случае II доказательства леммы 2, к последнему интегралу в (19) применим неравенство Гёльдера с показателями 1 и ∞ (так как $p = q$, то $p' = q'$):

$$\begin{aligned} \int_{E_l^\natural} \frac{\rho^{p'}(x) \omega(x) |Df_l(x)|^{p'(n-1)}}{J(x, f_l)^{p'} \omega(x)} J(x, f_l) dx \\ \leq \int_{E_l^\natural} \rho^{q'}(x) \omega(x) dx \cdot \operatorname{ess\,sup}_{x \in E_l^\natural} \left(\frac{\theta^{\frac{1}{q}}(x) |Df_l(x)|}{J(x, f_l)^{\frac{1}{p}}} \right)^{p'(n-1)} \\ \leq K_{p,q}^{\theta,1}(f; \Omega)^{p'(n-1)} \int_{E_l^\natural} \rho^{q'}(x) \omega(x) dx. \quad (21) \end{aligned}$$

Снова $\hat{\rho} = 0$ на $f(\Sigma)$ и $f(Z)$ и $m_n(E^0) = m_n(f(E^0)) = m_n(Z) = m_n(\Sigma) = 0$. Применяя (19), (21), (12) и теорему Бешпо Леви для рядов, получаем

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{\rho}^{p'}(y) dy &= \int_{\bigcup_{l \in \mathbb{N}} f(E_l^\natural)} \hat{\rho}^{p'}(y) dy = \int_{\bigcup_{l \in \mathbb{N}} f(E_l^\natural)} \sup_{l \in \mathbb{N}} \hat{\rho}_l^{p'}(y) dy \leq \int_{\bigcup_{l \in \mathbb{N}} f(E_l^\natural)} \sum_{l=1}^{\infty} \hat{\rho}_l^{p'}(y) dy \\ &\leq K_{p,q}^{\theta,1}(f; \Omega)^{p'(n-1)} \sum_{l=1}^{\infty} \int_{E_l^\natural} \rho^{q'}(x) \omega(x) dx = K_{p,q}^{\theta,1}(f; \Omega)^{p'(n-1)} \int_{\mathbb{R}^n} \rho^{q'}(x) \omega(x) dx, \end{aligned}$$

откуда после возведения в степень $1/p'$ приходим к (11). Теорема доказана.

Неравенство Полецкого имеет обобщение, известное в литературе как неравенство Вайсяля [6, 3.1]. Сформулируем его аналог.

Теорема 2. Пусть $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ — отображение с $(\theta, 1)$ -весовым ограниченным (p, q) -искажением, $n - 1 < q \leq p < \infty$, а весовая функция

$$\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x)$$

локально суммируема. Пусть Γ — семейство кривых в Ω , Γ' — семейство кривых в \mathbb{R}^n и m — положительное целое число. Предположим, что выполняется следующее условие: для каждой кривой $\beta : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ в Γ' существуют кривые $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ в Γ такие, что для всех $x \in \Omega$ и $t \in I$ равенство $\alpha_j(t) = x$ справедливо не более чем для $i(x, f)$ значений индекса j . Тогда

$$(\text{mod}_{p'} \Gamma')^{1/p'} \leq \frac{K_{p,q}^{\theta,1}(f; \Omega)^{n-1}}{m^{1/p'}} (\text{mod}_{q'}^\omega \Gamma)^{1/q'}, \quad (22)$$

где $p' = \frac{p}{p-(n-1)}$, $q' = \frac{q}{q-(n-1)}$.

Доказательство. Будем опираться на доказательство теоремы 1. По функции $\rho \in \text{adm } \Gamma$ построим функцию $\hat{\rho} : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty]$, полагая

$$\hat{\rho}(y) = \frac{1}{m} \chi_{f(\Omega \setminus E^0)}(y) \sup_Q \sum_{x \in Q} \tilde{\rho}(x),$$

где супремум берется по всем подмножествам Q множества $f^{-1}(y) \cap \Omega \setminus E^0$ таким, что $\#C \leq m$, а функция $\tilde{\rho}$ и множество E^0 те же, что и в доказательстве теоремы 1. Легко видеть, что

$$\hat{\rho}(y) = \frac{1}{m} \sup \sum_{i=1}^r \hat{\rho}_{l_i}(y), \quad (23)$$

где точная верхняя грань берется по всевозможным наборам $\{l_1, \dots, l_r\}$ попарно различных натуральных чисел, а r пробегает все значения от 1 до m ; функция $\hat{\rho}_{l_i}$ определена в (12). Отметим, что $\hat{\rho}$ — борелевская функция (см. [25, 2.3.2]).

Шаг I. Покажем, что $\hat{\rho} \in \text{adm } \Gamma'$. Пусть $\beta : I_0 \rightarrow \mathbb{R}^n$ — замкнутая кривая в Γ' . Ввиду замечания 1 можно считать, что она спрямляема. Согласно предположению теоремы существуют кривые $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ в Γ такие, что $f \circ \alpha_j \subset \beta$ и $\#\{j : \alpha_j(t) = x\} \leq i(x, f)$ для всех $t \in I_0$ и $x \in \Omega$. Имеем $\alpha_j(t) = \alpha_j^* \circ s_\beta(t)$ и $f \circ \alpha_j^* \subset \beta^0$, где $\alpha_j^* : I_j \rightarrow \Omega$ обозначает f -представитель кривой α_j относительно β . Лемма 1 позволяет считать, что все α_j^* абсолютно непрерывны. Возвращаясь к множеству C из доказательства теоремы 1, можно предполагать, что $\int_{\beta} \chi_C ds = 0$. Повторяя рассуждения случаев I и II шага I доказательства теоремы 1 (случай III тривиален) для кривой α_j^* , получаем

$$1 \leq \int_{\alpha_j} \rho ds \leq \int_{I_j^1} \tilde{\rho} \circ \alpha_j^* dm_1, \quad (24)$$

где $I_j^1 = I_j \cap \alpha_j^{*-1}(\cup E_i^1)$. Интегрируем по I_j^1 , поскольку на остальных частях промежутка I_j , как показано в упомянутых выше случаях, интеграл обращается в нуль.

Для $t \in [0, \ell(\beta)]$ определим $\tilde{\rho}_j(t) = \tilde{\rho}(\alpha_j^*(t))\chi_{I_j^1}(t)$ и $J_t = \{j : t \in I_j^1\}$. Поскольку локальный индекс отображения f во всякой точке $x \in \cup E_i^{\sharp}$ равен 1, для почти всех $t \in [0, \ell(\beta)] \cap I_j^1$ точки $\alpha_j^*(t)$, $j \in J_t$, являются различными точками в $f^{-1}(\beta^0(t))$. Из этого наблюдения и определения функции $\hat{\rho}$ вытекает справедливое для почти всех $t \in [0, \ell(\beta)]$ неравенство

$$\hat{\rho}(\beta^0(t)) \geq \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \tilde{\rho}_j(t).$$

Из последнего соотношения с учетом (24) выводим

$$\int_{\beta} \hat{\rho} ds = \int_0^{\ell(\beta)} \hat{\rho}(\beta^0(t)) dt \geq \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \int_0^{\ell(\beta)} \tilde{\rho}_j(t) dt = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \int_{I_j^1} \tilde{\rho} \circ \alpha_j^* dm_1 \geq 1.$$

Ввиду (4) и (5) имеем $\hat{\rho} \in \text{adm } f(\Gamma')$.

ШАГ II. Установим (22). Пользуясь равенством (23) и выкладками шага II доказательства теоремы 1, получаем

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{\rho}^{p'} dy &= \int_{\bigcup_{l \in \mathbb{N}} f(E_l^{\sharp})} \hat{\rho}^{p'} dy = \int_{\bigcup_{l \in \mathbb{N}} f(E_l^{\sharp})} \sup \left(\frac{1}{m} \sum_{i=1}^r \hat{\rho}_{l_i} \right)^{p'} dy \\ &\leq \frac{1}{m} \int_{\bigcup_{l \in \mathbb{N}} f(E_l^{\sharp})} \sup \sum_{i=1}^r \hat{\rho}_{l_i}^{p'} dy \leq \frac{1}{m} \int_{\bigcup_{l \in \mathbb{N}} f(E_l^{\sharp})} \sum_{l=1}^{\infty} \hat{\rho}_l^{p'} dy \\ &\leq \frac{K_{p,q}^{\theta,1}(f; \Omega)^{p'(n-1)}}{m} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \rho^{q'}(x) \omega(x) dx \right)^{p'/q'}. \end{aligned}$$

Возведя первый и последний члены полученного соотношения в степень $1/p'$ и воспользовавшись определением ω -веса модуля, приходим к неравенству (22). Теорема доказана.

Из установленной теоремы получим следствие. Сначала сформулируем

Предложение 8 [10, следствие II.3.4]. Пусть $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ — непрерывное открытое дискретное отображение, сохраняющее ориентацию, D — нормальная область для f , $\beta : [a, b] \rightarrow f(D)$ — кривая и $m = N(f, D)$. Тогда существуют кривые $\alpha_j : [a, b] \rightarrow D$, $1 \leq j \leq m$, такие, что

- 1) $f \circ \alpha_j = \beta$,
- 2) $\#\{j : \alpha_j(t) = x\} = i(x, f)$ для $x \in D \cap f^{-1}(\beta(t))$,
- 3) $|\alpha_1| \cup \dots \cup |\alpha_m| = D \cap f^{-1}(|\beta|)$.

Из теоремы 2 выводим (ср. с [5, теорема 2])

Следствие 1. Пусть $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ — отображение с $(\theta, 1)$ -весовым ограниченным (p, q) -искажением, $n - 1 < q \leq p < \infty$, а весовая функция $\omega(x) = \theta^{-\frac{n-1}{q-(n-1)}}(x)$ локально суммируема. Если D — нормальная область для f , Γ' — семейство кривых в $f(D)$, Γ — семейство кривых α в D такое, что $f \circ \alpha \in \Gamma'$, то

$$(\text{mod}_{p'} \Gamma')^{1/p'} \leq \frac{K_{p,q}^{\theta,1}(f; \Omega)^{n-1}}{N(f, D)^{1/p'}} (\text{mod}_{q'}^{\omega} \Gamma)^{1/q'}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Неравенство вытекает из теоремы 2 с $m = N(f, D)$, условие которой выполнено ввиду предложения 8.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ahlfors L., Beurling A. Conformal invariants and function-theoretic null-sets // Acta Math. 1964. N 83. P. 101–129.
2. Fuglede B. Extremal length and functional completion // Acta Math. 1957. V. 98. P. 171–219.
3. Шабат Б. В. Метод модулей в пространстве // Докл. АН СССР. 1960. Т. 130, № 6. С. 1210–1213.
4. Решетняк Ю. Г. Пространственные отображения с ограниченным искажением. Новосибирск: Наука, 1982.
5. Полецкий Е. А. Метод модулей для негомеоморфных квазиконформных отображений // Мат. сб. 1970. Т. 83, № 2. С. 261–272.
6. Väisälä J. Modulus and capacity inequalities for quasiregular mappings // Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. AI. 1972. N 509. P. 1–14.
7. Martio O., Rickman S., Väisälä J. Definitions for quasiregular mappings // Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. AI. 1969. N 448. P. 5–40.
8. Martio O. A capacity inequality for quasiregular mappings // Ann. Sci. Fenn. Ser. AI. 1970. N 474. P. 1–18.
9. Полецкий Е. А. О стирании особенностей квазиконформных отображений // Мат. сб. 1973. Т. 92, № 2. С. 242–256.
10. Rickman S. Quasiregular mappings. Berlin: Springer-Verl., 1993.
11. Heinonen J., Koskela P. Quasiconformal maps in metric spaces with controlled geometry // Acta Math. 1998. N 181. P. 1–41.
12. Martio O., Ryazanov V., Srebro U., Yakubov E. Moduli in modern mapping theory. New York: Springer-Verl., 2009.
13. Koskela P., Onninen J. Mappings of finite distortion: Capacity and modulus inequalities // J. Reine Angew. Math. 2006. N 599. P. 1–26.
14. Salimov R., Sevost'yanov E. The Poletskii and Väisälä inequalities for the mappings with (p, q) -distortion // Complex variables and elliptic equations. 2014. V. 59, N 2. P. 217–231.
15. Sevost'yanov E. About one modulus inequality of the Väisälä type // preprint. 2013. <http://arxiv.org/abs/1204.3810v4>.
16. Байкин А. Н., Водопьянов С. К. Емкостные оценки, теоремы Лиувилля и об устранении особенностей для отображений с ограниченным (p, q) -искажением // Сиб. мат. журн. 2015. Т. 56, № 2. С. 290–321.
17. Водопьянов С. К. О регулярности функции Полецкого при слабых аналитических предположениях исходного отображения // Докл. АН. 2014. Т. 455, № 2. С. 130–134.
18. Водопьянов С. К. О регулярности отображений, обратных к соболевским // Докл. АН. 2008. Т. 423, № 5. С. 592–596.
19. Водопьянов С. К. Отображения с конечным коискажением и классы Соболева // Докл. АН. 2011. Т. 440, № 3. С. 301–305.
20. Водопьянов С. К. О регулярности отображений, обратных к соболевским // Мат. сб. 2012. Т. 203, № 10. С. 3–32.
21. Пономарев С. П. Об N -свойстве гомеоморфизмов класса W_p^1 // Сиб. мат. журн. 1987. Т. 28, № 2. С. 140–148.
22. Соболев С. Л. Некоторые применения функционального анализа в математической физике. М.: Наука, 1988.
23. Väisälä J. Lectures on n -dimensional quasiconformal mappings. Berlin; Heidelberg; New York: Springer-Verl., 1971. (Lect. Notes Math.; V. 229).
24. Колмогоров А. Н., Фомин С. В. Элементы теории функций и функционального анализа. М.: Физматлит, 2004.
25. Федерер Г. Геометрическая теория меры. М.: Наука, 1987.
26. Эванс Л. К., Гариепи Р. Ф. Теория меры и тонкие свойства функций. Новосибирск: Науч. кн., 2002.
27. Whitney H. On totally differentiable and smooth functions // Pac. J. Math. 1951. V. 1. P. 143–159.
28. Radó N., Reichelderfer P. V. Continuous transformation in analysis. Berlin: Springer-Verl., 1955.

-
- 29.** *Vodopyanov S. K., Ukhlov A. D.* Set functions and their applications in the theory of Lebesgue and Sobolev spaces. I // *Sib. Adv. Math.* 2004. V. 14, N 4. P. 78–125.
- 30.** *Сакс С.* Теория интеграла. М.: Изд. иностр. лит., 1949.

Статья поступила 3 февраля 2015 г.

Трямкин Максим Владимирович
Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН,
пр. Академика Коптюга, 4, Новосибирск 630090;
Новосибирский гос. университет,
ул. Пирогова, 2, Новосибирск 630090
maxtryamkin@yandex.ru