

# Liénard equations without limit cycle

名大 教養 大 和 一 夫

## Liénard equation

$$(*) \quad \begin{cases} \dot{x} = y - f(x), \\ \dot{y} = -x, \end{cases} \quad \text{但し}$$

(1)  $f$ : odd,  $C^1$ 級,  $f_x(0) < 0$ ,  
の limit cycles の 個数を 数える という 問題が  
ある. ここでは limit cycle が あらわれないうための  
条件(十分)を 与える.

この方程式を扱う理由は, 物理工学的には,  
(\*) は  $\ddot{x} + f_x(x)\dot{x} + x = 0$  と表わされ 振動  
現象を記述し, 数学的には  $f(x)$  という 一変数  
の関数ひとつの性質の研究 という意味で  
もっとも簡単だからである.

Remark. グラフ  $y = f(x)$  を Liénard の 特性曲線と  
この曲線上で 接ベクトル (\*) の が  $y$  軸に 平行になる.

仮定  $f_x(0) < 0$  は原点  $(0, 0)$  が *unstable singular point* であること,  $f: \text{odd}$  はこの方程式が原点に関して対称であることを意味する.

次の事実が知られている.

(Liénard)  $\exists a > 0$  s.t.  $f(x) < 0, x \in (0, a), f(a) = 0$   
 $f_x(x) > 0, x \in (a, \infty),$

$\Rightarrow \exists^1$  limit cycle, 且つこれは *stable*, i.e., 任意の nontrivial integral curve はこの limit cycle に  $t \rightarrow \infty$  のとき近づく.

(Graef [1])  $\exists b > 0, \exists c > 0$  : constants s.t.  $f(x) > c$   
 $x \in (b, \infty)$

$\Rightarrow \exists K \subset \mathbb{R}^2$ , compact, 全ての integral curve は,  $t \rightarrow \infty$  のとき  $K$  に入る. 従って少なくともひとつ limit cycle がある.

そこで  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$  のとき どうなるか知りたいたい.

もし  $\sup f(x) > 0$  が十分小, 且つ十分速く  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$  ならば limit cycle があらわれないと期待される.

以下, 簡単のため 次の仮定をする.

(2)  $\exists a > 0, f(a) = 0, f(x) < 0, x \in (0, a)$   
 $f(x) > 0, x \in (a, \infty).$

Theorem. 次の条件が満たされるとは limit cycle は:

$$\alpha = 2 + \frac{1+a^2}{2} \max_{|x| \leq a} |f(x)|^2 \quad \text{と } \alpha < .$$

$$\frac{-\int_0^a x f(x) dx}{\int_a^\infty x f(x) dx} > \alpha ,$$

$$-\int_0^a x f(x) dx > \left(1 + \frac{\alpha}{2} \left(\int_0^a x f(x) dx\right)^2 + \frac{\alpha}{2} x^2\right) f(x) + \alpha \int_a^x x f(x) dx, \\ \text{for } \forall x > a .$$

Proof. Liapunov function とし

$$V(x, y) = \frac{1}{2} \alpha (x^2 + y^2) + \log(x^2 + (y - h(x))^2)$$

但し,  $\alpha > 0$  定数,  $h(x)$ : odd は あとで 適当に

$$\text{定める. } \alpha, h(x) \text{ を 選んで } \dot{V}(x, y) = \frac{d}{dt} V(x, y) \geq 0$$

$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ , と できれば よい.

Lemma 1.

$$\dot{V}(x, y) = -\alpha x f(x) + 2 \cdot \frac{-x(f(x) - h(x)) - h_x(x)(y - h(x))(y - h(x))}{x^2 + (y - h(x))^2}$$

以下  $h(x)$  について 次の仮定をする:

$$(3) \quad h_x(0) = 0, \quad h_x(x) > 0, \quad x \in (0, a), \quad h_x(a) = 0, \\ h_x(x) < 0, \quad x \in (a, \infty)$$

222

$$h(x) - f(x) > 0, \quad h(x) > 0, \quad x \in (0, \infty)$$

よて、次の二つの条件を整理すればよい。

$$(i) \quad \dot{V}(x, y) \geq 0, \quad \forall x \in (0, a), \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

$$(ii) \quad \dot{V}(x, y) \geq 0, \quad \forall x \in (a, \infty), \quad \forall y \in \mathbb{R}.$$

(3) を考慮すると

$$(i) \iff \alpha \geq -\frac{h_x}{xf} + \frac{h-f}{x^2f} - \frac{\sqrt{(xh_x + h-f)^2 + h_x^2(h-f)^2}}{x^2f}$$

$$\forall x \in (0, a)$$

$$(ii) \iff -\alpha x f - h_x + \frac{h-f}{x} \geq 0$$

$$\begin{aligned} & (x f)^2 - 2x f \left(-h_x + \frac{h-f}{x}\right) \\ & - 4 h_x \cdot \frac{h-f}{x} - \frac{h_x^2 (h-f)^2}{x^2} \geq 0 \end{aligned}$$

$$\forall x \in (a, \infty)$$

この右辺の不等式は適当な評価によって Th. の条件になる。

証明終

#### Reference

- [1] J.R. Graef: On the Generalized Liénard Equation  
J. of Diff. Eqs., 12, 34-62 (1972)