

既約曲線の exponents について

埼玉大 矢野 環

§1. exponents の問題

(1.1) 孤立特異点の重要な numerical invariants としてある "exponents" を, 既約曲線の場合に決定したい. "exponents" には, 三通りの種類があり, 一つは一般的には定義されてない. 残りの二つは "b-exponents" 即ち, Gauss-Mannin connection の saturated lattice を用いたものであり, あるいは "MH-exponents" 即ち, Mixed-Hodge structure に関係して定められたものである. 一つは exponents は μ (\in Milnor 数) 個の正の有理数 $\alpha_1, \dots, \alpha_\mu$ であり, $\exp(2\pi\sqrt{-1}\alpha_i) = \omega_i$ は, 局所モノドロミ ω の i 個の固有値の全体と, 重複度は α_i と一致してゐる. (こゝでは前者, "b-exponents" を扱う.)

(1.2) $f: \mathbb{C}^2, 0 \rightarrow \mathbb{C}, 0$ を解析函数の芽, $f^{-1}(0)$ は原点で既約曲線を定め, 特異点 $\sigma = (m, \beta_1, \dots, \beta_g)$ でありとせよ. 例として n 次 Puiseux 級数 $y = x^{1/m} + \dots + x^{\beta_g/m}$.

$$y = x^{\beta_1/m} + x^{\beta_2/m} + \dots + x^{\beta_g/m}$$

特性列の性質より,

$$(1.2.1) \quad e^{(i)} = \text{g.c.d.} (n, \beta_1, \dots, \beta_g) \quad i=1, \dots, g$$

と表すと, $e^{(i)}$ は $e^{(i-1)}$ の真の約数であり, $e^{(g)} = 1$.

(1.3) b -exponents は (n, β) を与えたとき決定される.

このとき内題は次のようになる.

(a) A. f の特性列が (n, β) であり, β_j が b -exponents となるとき, n 数の組を指定せよ.

(b) B. 特性列 (n, β) を与えよ, 一般に f について, b -exponents は (n, β) による.

(1.4) 実用上, 又理論上も, exponents $\alpha_1, \dots, \alpha_\mu$ は, f の母函数 $P(t)$ によって与えられる.

$$(1.4.1) \quad P(t) = \sum_{i=1}^{\mu} t^{\alpha_i}$$

$$(1.4.2) \quad f = x^2 + y^3, \quad \alpha_1 = 5/6, \quad \alpha_2 = 7/6.$$

$$\begin{aligned} P(t) &= t^{5/6} + t^{7/6} = \frac{(t^{1/2}-t)(t^{1/3}-t)}{(1-t^{1/2})(1-t^{1/3})} \\ &= t^{5/6} \frac{1-t}{1-t^{1/6}} - t^{2/2} \frac{1-t}{1-t^{1/2}} - t^{3/3} \frac{1-t}{1-t^{1/3}} + t \end{aligned}$$

(1.5) $\alpha_f = \min_{i=1, \dots, \mu} \alpha_i$ と表す minimal exponent とする. この値は (n, β) によって決定される. (Varchenko, Kato-Yano)

(Kato-Yano)

$$(1.5.1) \quad \alpha_f = \frac{1}{n} + \frac{1}{\beta_1}$$

§ 2. 定義. 予想

(2.1) 定義. (n, β) に対し, 下記の自然数を定めた.

$$e^{(i)} = \text{g.c.d.}(\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_i) \quad i=1, \dots, g, \quad \beta_0 = e^{(0)} = n.$$

$$\begin{cases} r_i = (\beta_i + n) / e^{(i)} \\ R_i = (\beta_i e^{(i-1)} + \beta_{i-1} (e^{(i-1)} - e^{(i-2)}) + \dots + \beta_1 (n - e^{(1)})) / e^{(i)}, \\ r'_i = [r_i e^{(i)} / e^{(i-1)}] + 1 = r_{i-1} + [(\beta_i - \beta_{i-1}) / e^{(i-1)}] + 1 \\ R'_i = R_i e^{(i)} / e^{(i-1)} = R_{i-1} + \beta_i - \beta_{i-1} \\ r'_0 = 2, \quad R'_0 = n. \end{cases}$$

(2.2) 定義. (n, β) に対応する分数巾多項式とは,

$$\begin{aligned} R(n, \beta, t) &= \sum_{i=1}^g t^{r_i/R_i} \frac{1-t}{1-t^{1/R_i}} \\ &\quad - \sum_{i=0}^g t^{r'_i/R'_i} \frac{1-t}{1-t^{1/R'_i}} + t. \end{aligned}$$

(2.3) 命題. 特種列 (n, β) に対し, $R(n, \beta, t)$ を展開すれば, 非負整数係数の分数巾多項式となる. //

この命題は, 次の2つの補題に帰着する.

(2.3.1) 補題. $i=1, \dots, g$ について2次の関係が成立する.

$$1) R'_i | R_i \quad 2) r'_i / R'_i > r_i / R_i \quad 3) (r'_i - 1) / R'_i \leq (r_i - 1) / R_i.$$

(2.3.2) 補題. さらに, 1) $r'_0 / R'_0 > r_1 / R_1$ //

$$2) (r'_0 - 1) / R'_0 \leq (r_1 - 1) / R_1 \quad 3) e^{(1)} | R_2 \quad 4) e^{(1)} \nmid R'_2$$

$$5) r_4 / R_2 < 1 / e^{(1)}. //$$

(2.4) 予想. 特性列 (m, β) が与えられたとき, n 階の \mathbb{P}^n の特異点について

$$P(t) = R((m, \beta), t).$$

ここで「 \mathbb{P}^n の特異点」は, 特性列 (m, β) が与えられたとき, n 階の n 変数 modality 次元の $(\mu$ -constant) stratum によって, open dense 存在している, ことを意味する.

上記は §1 の (a) B に対しては, 解答が与えられる. (a) A については, B.L. Lichtin 氏が次の予想を提示している.

(2.5) 予想. 特性列 (m, β) が与えられたとき, n 階の特異点については, b -exponents は $r_1/R_1, r_2/R_2, \dots, r_g/R_g$ を含む.

(1.5) には $g=1$ のとき (2.5) は正しい.

§3. 定理.

(3.1) 定理. (2.4) は \mathbb{P}^n の m -modal 特異点 $(m \leq 3)$ について, 既述の通り成り立つ. //

$n=4$ 以外については,

(3.2) 命題. (加藤清生) (2.4) は 特性列

$(5, 7), (4, 9)$ については成り立つ. (1174 (4-modal)).

実際, (2.4) の $g=1$ の場合は, 加藤氏による予想と一致している. //

このように, 特異点解消の図式による同変変換も考慮し, \mathbb{P}^n を省略する. (尚, (3.1) は 特性列 $(4, 6, 2p+5)$ を含む.)