

## Banach 空間における最良近似度について

琉球大理 西白保敏彦 (Toshihiko Nishishiraho)

[1]  $X$  を Banach 空間とし,  $B[X]$  は  $X$  からそれ自身への有界線形作用素全体の成す Banach 代数を表す.  $N$  を自然数全体の集合とし,  $N_0 = N \cup \{0\}$ ,  $\mathbb{Z}$  は整数全体の集合を表す.  $\{P_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$  は  $B[X]$  に属する射影作用素の列で, 次の 3 条件を満たすとする:

(P-1) (Orthogonal)  $P_j P_m = \delta_{jm} P_m$ ,  $\forall j, m \in \mathbb{Z}$ ,  $\delta_{jm}$  は Kronecker の  $\delta$  関数を表す.

(P-2) (Total)  $f \in X$ ,  $P_j(f) = 0$ ,  $\forall j \in \mathbb{Z} \Rightarrow f = 0$ .

(P-3) (fundamental)  $\text{span} \bigcup_{j \in \mathbb{Z}} P_j(X)$  は  $X$  で稠密である.

各  $n \in N_0$  に対して,  $M_n$  は  $\{P_j(X) : |j| \leq n\}$  で生成される  $X$  の線形部分空間を表す.  $f \in X$  に対して,

$$E_n(f) = E_n(X; f) = \inf \{ \|f - g\| : g \in M_n \}$$

を  $M_n$  に属する  $f$  の  $n$  次最良近似度という. 明らかに,  $\{E_n(f)\}$  は単調減少し, 条件 (P-3) によって, すべての  $f \in X$  に対

(2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n(f) = 0$  である。こゝでの目的は、この収束する速さの度合の評価を与えることである (cf. [19]). 得られる結果は有次 Banach 空間 (cf. [10], [15], [20]) の場合へ適用された。従つて、特に、 $C_{2\pi} \times L_{2\pi}^p$  ( $1 \leq p < \infty$ ) において三角多項式による最良近似度に関する Jackson 型の古典的結果 (e.g., [1], [4], [9], [22] を参照) を拡張する。

[2]  $\{T_t : t \in \mathbb{R}\}$  は  $B[X]$  に属する作用素の一様有界な強連続群、すなわち、次の4条件を満たす作用素の族とする:

$$(T-1) \quad A = \sup \{ \|T_t\| : t \in \mathbb{R} \} < \infty.$$

$$(T-2) \quad T_0 = I \text{ (恒等作用素)}.$$

$$(T-3) \quad T_{s+t} = T_s T_t, \quad \forall s, t \in \mathbb{R}.$$

$$(T-4) \quad \forall f \in X, \forall u \in \mathbb{R}, \quad \lim_{t \rightarrow u} \|T_t(f) - T_u(f)\| = 0.$$

$\{T_t\}$  の生成作用素  $G$  は

$$G(f) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} (T_t(f) - f)$$

によつて、定義される。  $D(G)$  はその定義域を表す。  $r \in \mathbb{N}$  に対して、  $D(G^r)$  は  $X$  の稠密な線形部分空間で、  $G^r$  は閉線形作用素である (cf. [3, Propositions 1.1.4 and 1.1.6]). 作用素の半群についての基本的な事項については、 [3], [6], [7], [8] を参照。

各  $r \in \mathbb{N}_0$ ,  $t \in \mathbb{R}$  に対して、

$$\Delta_t^0 = I, \quad \Delta_t^r = (T_t - I)^r = \sum_{m=0}^r (-1)^{r-m} \binom{r}{m} T_{mt} \quad (r \geq 1)$$

と定義する。明らに、各  $\Delta_t^r$  は  $B[X]$  に属し、

$$\|\Delta_t^r\| \leq A_r, \quad A_r = \min \{ (A+1)^r, 2^r A \}$$

が成り立つ。  $r \in \mathbb{N}_0$ ,  $f \in X$ ,  $\delta \geq 0$  のとき、

$$\omega_r(f, \delta) = \omega_r(X; f, \delta) = \sup \{ \|\Delta_t^r(f)\| : |t| \leq \delta \}$$

と定義し、これを  $\{T_t\}$  に関する  $f$  の  $r$  次連続率とす。このほかの基本的な性質を述べよう。

補題 1.  $r \in \mathbb{N}$ ,  $f \in X$  とする。

$$(a) \quad \omega_r(f, \delta) \leq A_r \|f\| \quad (\forall \delta \geq 0).$$

$$(b) \quad \omega_r(f, \cdot) \text{ は } [0, \infty) \text{ で単調増加連続で、} \omega_r(f, 0) = 0.$$

$$(c) \quad \omega_{r+s}(f, \delta) \leq A_r \omega_s(f, \delta) \quad (\forall s \in \mathbb{N}_0, \delta \geq 0).$$

特に,  $\lim_{\delta \rightarrow 0} \omega_r(f, \delta) = 0.$

$$(d) \quad \omega_r(f, \xi \delta) \leq A(1+\xi)^r \omega_r(f, \delta) \quad (\forall \xi, \delta \geq 0).$$

$$(e) \quad 0 < \delta \leq \xi \Rightarrow \omega_r(f, \xi) / \xi^r \leq 2^r A \omega_r(f, \delta) / \delta^r.$$

$$(f) \quad f \in D(G^r) \Rightarrow \omega_{r+s}(f, \delta) \leq A \delta^r \omega_s(G^r(f), \delta) \quad (\forall s \in \mathbb{N}_0, \delta \geq 0).$$

$r \in \mathbb{N}$ ,  $\alpha > 0$  に対して、 $X$  の要素  $f$  は、ある  $\delta > 0$  に対して、 $\omega_r(f, \delta) \leq H \delta^\alpha$  であるとき、 $f$  を  $\text{Lip}_r(\alpha, H)$  に属するとす。すなわち、 $\text{Lip}_r \alpha = \cup \{ \text{Lip}_r(\alpha, H) : H > 0 \}$  とおく。各  $r \in \mathbb{N}$  に対して、 $D(G^r) \subset \text{Lip}_r r$  であり、 $\alpha > r$  のときは、 $f \in \text{Lip}_r \alpha$  と  $\omega_r(f, \delta) = o(\delta^r)$  ( $\delta \rightarrow +0$ ) とは同値である。

[3] 各  $f \in X$  に対して,  $\sum_{j=-\infty}^{\infty} P_j(f) \in \mathcal{P}_j$  に属する  $f$  の Fourier 級数といふ,

$$f \sim \sum_{j=-\infty}^{\infty} P_j(f)$$

と書く.  $T \in \mathcal{B}(X)$  が  $\mathcal{M}$  の  $\mathcal{M}$ -作用素であるとは, あるスカラ一列  $\{\tau_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$  が存在して, 全ての  $f \in X$  に対して,  $T(f) \sim \sum_{j=-\infty}^{\infty} \tau_j P_j(f)$  と表すことができる. そして,  $\infty$  のとき,

$$(1) \quad T \sim \sum_{j=-\infty}^{\infty} \tau_j P_j$$

と書く (cf. [5], [15], [16], [23], [2], [13], [20]).

$X$  上の  $\mathcal{M}$  の  $\mathcal{M}$ -作用素の全体の集合を  $M(X)$  で表す.  $M(X)$  は  $\mathcal{B}(X)$  の可換な閉部分代数で,  $I \in M(X)$  である.

$\{T_t : t \in \mathbb{R}\}$  は条件 (T-1) を満たす  $M(X)$  に属する作用素の族で,

$$(2) \quad T_t \sim \sum_{j=-\infty}^{\infty} \exp(\lambda_j t) P_j \quad (t \in \mathbb{R})$$

とある. ここで,  $\{\lambda_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$  はスカラ一列である.  $\infty$  のとき,

$\{T_t : t \in \mathbb{R}\}$  は強連続群になり, 各  $r \in \mathbb{N}$  に対して,

$$G^r(f) \sim \sum_{j=-\infty}^{\infty} \lambda_j^r P_j(f) \quad (f \in D(G^r))$$

が成立する (cf. [15, Proposition 2]).  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  は連続な関数とある.  $R \in L^1_{\pi}$ ,  $T \in \mathcal{B}(X)$  に対して, 合成積作用素  $(R * T)(\varphi; \cdot) \in$

$$(R * T)(\varphi; f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} R(u) T_{\varphi(u)}(T(f)) du \quad (f \in X)$$

で定義する (cf. [15]). 右辺の積分は Bochner 積分として常に存在している. 明らかく,  $(k * T)(\varphi; \cdot)$  は  $B[X]$  に属し,

$$\|(k * T)(\varphi; \cdot)\| \leq B \|k\|_1 \|T\|$$

が成り立つ. 尤も,  $\|B\| = \sup \{ \|T_{\varphi(u)}\| : |u| \leq \pi \}$ .

補題 2.  $k \in L^1_{2\pi}$ ,  $T \in M[X]$  は (1) の通りである.

このとき,  $(k * T)(\varphi; \cdot)$  は  $M[X]$  に属し,

$$(3) \quad (k * T)(\varphi; \cdot) \sim \sum_{j=-\infty}^{\infty} c_j(\varphi; k) \tau_j P_j(\cdot)$$

である. ここで,

$$c_j(\varphi; k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} k(t) \exp(\lambda_j \varphi(t)) dt \quad (j \in \mathbb{Z}).$$

各  $n \in \mathbb{N}_0$  に対して,

$$\pi_n(\varphi) = \{ k \in L^1_{2\pi} : c_j(\varphi; k) = 0, |j| > n \}$$

と置く. 又  $k$ ,  $a \in \mathbb{R}$  に対して,  $\varphi_a(t) = at$ ,  $t \in \mathbb{R}$ , と定義し,

$$(k * T)_a(\cdot) = (k * T)(\varphi_a; \cdot), \quad \pi_{n,a} = \pi_n(\varphi_a)$$

と置く.  $r \in \mathbb{N}$ ,  $k \in L^1_{2\pi} \subset L$ ,

$$L_{k,r} = \sum_{j=1}^r (-1)^{j+1} \binom{r}{j} (k * I)_j$$

と定義する.

補題 3.  $r \in \mathbb{N}$ ,  $k \in L^1_{2\pi}$ ,  $\hat{k}(0) = 1$ ,  $f \in X$  とする. このとき, 任意の  $\delta > 0$  に対して,

$$\|L_{k,r}(f) - f\| \leq A \omega_r(f, \delta) \sum_{j=0}^r \binom{r}{j} \delta^{-j} \mu(k; j)$$

が成り立つ. ここで,  $\mu(k; j)$  は  $k$  の  $j$  次総変形  $\varepsilon - \lambda \perp t \varepsilon$

表す, および,

$$\mu(k; j) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |t|^j |k(t)| dt.$$

[4]  $n$  次以下の三角多項式全体の集合を  $\mathcal{T}_n$  と書く. 本節では,

$$(4) \quad \mathcal{T}_n \subset \bigcap_{m=1}^{\infty} \mathcal{T}_{n,m} \quad (\forall n \in \mathbb{N}_0)$$

を仮定する.

注意.  $\{ \lambda_j \}_{j \in \mathbb{Z}} = \{ -i_j \}_{j \in \mathbb{Z}}$  とする.

$$(a) \quad \mathcal{T}_n \subset \bigcap_{m \in \mathbb{Z}, m \neq 0} \mathcal{T}_{n,m} \quad (\forall n \in \mathbb{N}_0).$$

従って, (4) は常に満たされる.

(b)  $\mathcal{G} = \mathcal{G}_m, m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$  とする.  $n \geq 1$  とし, (3) は

$$(k * T)_m \sim \sum_{j=-\infty}^{\infty} \hat{k}(jm) \tau_j P_j$$

と表す. 特に,  $k \in \mathcal{T}_n$  ならば,

$$(k * T)_m = \sum_{|j| \leq [n/|m|]} \hat{k}(jm) \tau_j P_j$$

である.  $n = \tau[\lambda]$  は Gauss 記号を表す.

さて, 次の一般的有界値式を得る:

定理 1.  $r \in \mathbb{N}$  とする.  $n \geq 1$  とし,  $r$  次の  $f \in X, n \in \mathbb{N}_0$  に対して,

$$\begin{aligned} E_n(f) &\leq \inf \{ \|L_{k,r}(f) - f\| : k \in \mathcal{T}_n' \} \\ &\leq A \inf \{ \omega_r(f, \delta) \sum_{j=0}^r \binom{r}{j} \delta^j \mu(k; j) : \delta > 0, k \in \mathcal{T}_n' \}, \end{aligned}$$

ここで,  $\mathcal{T}_n' = \{k \in \mathcal{T}_n : \hat{k}(0) = 1\}$ .

証明.  $k \in \mathcal{T}_n$ ,  $f \in X$  とする. このとき, 条件 (4) 及び補題 2 より, ある  $m \in \mathbb{N}$  に対して,

$$(k \# I)_m(f) = \sum_{j=-n}^n c_j(\varphi_m; k) P_j(t)$$

が成り立つ. 従って,  $L_{k \# I}(f)$  は  $\mathcal{H}_n$  に属する. 従って,

補題 3 により, 求める等価式を得る. Q.E.D.

この定理で下限をとる  $k$  として, 一般 Jackson 核  $J_{n,m}$  を考えよう. この核は次で与えられる:

$$J_{n,m}(t) = C_{n,m} \left( \frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^{2m} \quad (n, m \in \mathbb{N}),$$

ここで定数  $C_{n,m} > 0$  は

$$\hat{J}_{n,m}(0) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi J_{n,m}(t) dt = 1$$

と取らるるに違いない (cf. [12]). 特に,

$$J_{n,1}(t) = F_n(t) = \sum_{j=1-n}^{n-1} \left(1 - \frac{|j|}{n}\right) \exp(ijt)$$

は Fejér 核であり, 従って,  $J_{n,m}(t) = C_{n,m} \mathcal{N}^m F_n^m(t)$  は非負の  $m(n-1)$  次の偶三角多項式である. また,

$$J_{n,2}(t) = \frac{3}{n(2n^2+1)} \left( \frac{\sin \frac{nt}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \right)^4.$$

は Jackson 核である (cf. [9], [14]).

補題 4.

$$J_{n,m}(t) \leq \left(\frac{\pi}{2}\right)^{4m} n \quad (|t| \leq \pi)$$

及び

$$J_{n,m}(t) \leq \left(\frac{\pi^2}{2nt}\right)^{2m} n \quad (0 < |t| \leq \pi)$$

が成り立つ。

補題 5.

$$\mu(J_{n,m}; j) \leq \left(\frac{\pi}{2}\right)^{4m} \frac{2^{j+1}}{\pi} \left(\frac{1}{j+1} + \frac{1}{2m-j-1}\right) n^{-j}.$$

$$(j = 0, 1, 2, \dots, 2m-2)$$

こゝの評価を用いて、次の Jackson 型の順定理を示すことができる。

定理 2.  $r \in \mathbb{N}$  とする。任意の  $\varepsilon > 0$ , すべて  $f \in X$ ,  $n \in \mathbb{N}$  に対して,

$$(5) \quad E_n(f) \leq A C_r \omega_r(f, \frac{1}{n}),$$

$$\text{ここで, } C_r = 2 \left(\frac{\pi}{2}\right)^{2r+5} (r+4)^r.$$

証明.  $m = [(r+3)/2]$ ,  $\delta = [n/m] + 1$  とおく。任意の  $n$ ,  $J_{\delta,m}$  は  $J_n^1$  に属するから、定理 1 より,

$$E_n(f) \leq A \omega_r(f, \frac{1}{n}) \sum_{j=0}^r \binom{r}{j} n^j \mu(J_{\delta,m}; j).$$

従って、補題 5 を用い、ゆえ、求める不等式 (5) が得られた。

□.E.D.

系 1. (a) ある  $r \in \mathbb{N}$  に対して、 $f \in \text{Lip}_r(\Omega, M)$  ならば、すべての  $n \in \mathbb{N}$  に対して,



$$E_n(f) \leq A M C_r n^{-\alpha}.$$

(b) ある  $r \in \mathbb{N}$  に対して,  $f \in D(G^r)$  ならば, ある  $r$  の  $n \in \mathbb{N}$  に対して,

$$(6) \quad E_n(f) \leq A^2 C_r \|G^r(f)\| n^{-r}.$$

(c)  $f \in \bigcap_{r=1}^{\infty} D(G^r)$  ならば, ある  $r$  の  $\lambda > 0$  に対して

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^\lambda E_n(f) = 0.$$

次の定理は, 高次の連続性による (6) の改良を与える。

定理 3.  $r \in \mathbb{N}$ ,  $f \in D(G^r)$  とする. このとき, ある  $r$  の  $n \in \mathbb{N}$ ,  $s \in \mathbb{N}_0$  に対して,

$$E_n(f) \leq A^2 C_{r+s} n^{-r} \omega_s(G^r(f), \frac{1}{n}).$$

証明. 定理 2 の補題 1 (f) によって,

$$E_n(f) \leq A C_{r+s} \omega_{r+s}(f, \frac{1}{n}) \leq A^2 C_{r+s} n^{-r} \omega_s(G^r(f), \frac{1}{n}).$$

Q.E.D.

定理 3 の直接の結果として, 次を得る。

系 2.  $r \in \mathbb{N}$ ,  $f \in D(G^r)$  とする. もし,  $f \in \text{Lip}_s(d, M)$  ならば, ある  $r$  の  $n \in \mathbb{N}$  に対して,

$$E_n(f) \leq A^2 M C_{r+s} n^{-(d+r)}.$$

[17], [18] に拠るとは,  $r=1$ ,  $s=1, 2$  に対して, 上記類似の挿入式が Fejér-Korovkin 核  $K_n$  を用いて得られる。この核は次の式で定義されるものである (cf. [11]):

$$R_n(t) = \Lambda_n \left| \sum_{j=0}^n \lambda_n(j) e^{ijt} \right|^2 \quad (n \in \mathbb{N}_0, t \in \mathbb{R}),$$

ここで,

$$\lambda_n(j) = \rho \sin\left(\frac{j+1}{n+2}\pi\right) \quad (j=0, 1, 2, \dots, n),$$

$$\Lambda_n = \left( \lambda_n^2(0) + \lambda_n^2(1) + \dots + \lambda_n^2(n) \right)^{-1}.$$

$R_n \in \mathcal{F}_n^1$  で,

$$R_n(t) = 1 + 2 \sum_{m=1}^n \theta_n(m) \cos mt,$$

$$\theta_n(m) = \Lambda_n \sum_{j=0}^{n-m} \lambda_n(j) \lambda_n(m+j) \quad (m=1, 2, \dots, n)$$

と表される。特に,  $\theta_n(1) = \cos\left(\frac{\pi}{n+2}\right)$  である。

定理4.  $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$  は,  $B[X]$  に属する作用素の列で,  
すべての  $g \in M_n$  に対して  $U_n(g) = g$  を満たすとする。この  
とき, すべての  $f \in X$ ,  $n \in \mathbb{N}$  に対して,

$$\|U_n(f) - f\| \leq (\|U_n\| + 1) E_n(f) \leq AC_r (\|U_n\| + 1) \omega_r(f, \frac{1}{n}).$$

証明. 任意の  $g \in M_n$  に対して,

$$\begin{aligned} \|U_n(f) - f\| &\leq \|U_n(f-g)\| + \|g-f\| \\ &\leq (\|U_n\| + 1) \|f-g\| \end{aligned}$$

であるから, (5) より

$$\|U_n(f) - f\| \leq (\|U_n\| + 1) E_n(f) \leq AC_r (\|U_n\| + 1) \omega_r(f, \frac{1}{n})$$

となる。

Q. E. D.

示す。  $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$  は定理 4 の通りとし、  $f \in X$  とする。このとき、  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|U_n\| E_n(f) = 0$  ならば、  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|U_n(f) - f\| = 0$ 。特にある  $r \in \mathbb{N}$  に対して、  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|U_n\| \omega_r(f, \frac{1}{n}) = 0$  ならば、  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|U_n(f) - f\| = 0$ 。

$\{S_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$  と  $\{P_j\}$  は同様の Fourier 級数の部分和作用素列とする。すなわち、  $S_n = \sum_{j=-n}^n P_j$ ,  $n \in \mathbb{N}_0$ 。ここで、定理 4 にあて、次の Lebesgue 型の等価式を得る：

定理 5.  $r \in \mathbb{N}$  とする。ここで、すべての  $f \in X$ ,  $n \in \mathbb{N}$  に対して、

$$\|S_n(f) - f\| \leq (\|S_n\| + 1) E_n(f) \leq A C_r (\|S_n\| + 1) \omega_r(f, \frac{1}{n}).$$

系 4.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|S_n\| E_n(f) = 0$  ならば、  $f$  の Fourier 級数は  $f$  に収束する、すなわち、

$$(6) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{j=-n}^n P_j(f) - f \right\| = 0.$$

特に、ある  $r \in \mathbb{N}$  に対して、  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|S_n\| \omega_r(f, \frac{1}{n}) = 0$  ならば、

(6) が成り立つ。

各  $n \in \mathbb{N}_0$  に対して、  $\sigma_n$  は  $n$  次 Cesàro 平均作用素とする：

$$\sigma_n = \frac{S_0 + S_1 + \dots + S_n}{n+1} = \sum_{j=-n}^n \left(1 - \frac{|j|}{n+1}\right) P_j.$$

また、  $V_n$  は  $n$  次 de la Vallée-Poussin 作用素を表す：

$$V_n = \frac{S_n + S_{n-1} + \dots + S_{2n-1}}{n} = 2\sigma_{2n-1} - \sigma_{n-1} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

$\{\sigma_n\}$  が一様有界、すなわち、

$$C = \sup \{ \|\sigma_n\| : n \in \mathbb{N}_0 \} < \infty$$

とある。このとき、定理4を  $U_n = V_n$  の場合へ適用すれば、次の de la Vallée-Poussin 型の評価式を得る。

定理6.  $r \in \mathbb{N}$  とある。このとき、すべての  $f \in X$ ,  $n \in \mathbb{N}$  に対して、

$$E_{2n-1}(f) \leq \|V_n(f) - f\| \leq (3C+1)E_n(f) \leq A(3C+1)C_r \omega_r(f, \frac{1}{n}).$$

[5] 本節では、 $X$  が有限 Banach 空間の場合を考える。すなわち、 $X$  は次の4条件を満たす  $L_{2\pi}$  の線形部分空間とある。

(H-1)  $X$  は  $L_{2\pi}$  の  $\|\cdot\|$  をもつ Banach 空間である。

(H-2)  $\exists M > 0$ ;  $\|f\|_1 \leq M\|f\|$ ,  $\forall f \in X$ .

(H-3) 各  $t \in \mathbb{R}$  に対して、移動作用素

$$T_t(f)(\cdot) = f(\cdot - t) \quad (\forall f \in X)$$

は  $X$  上で等距離的である。

(H-4) 各  $f \in X$  に対して、写像  $t \mapsto T_t(f)$  は  $\mathbb{R}$  上で強連続である。

このような同族空間の典型的なものとして、 $C_{2\pi}$ ,  $L_{2\pi}^p$  ( $1 \leq p < \infty$ ) である。他の例については、[15] を見よ (cf. [10], [20])。

さて、 $B[X]$  に属する射影作用素の列  $\{P_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$  を、

$$P_j(f)(\cdot) = \hat{f}(j) \exp(ij\cdot) \quad (f \in X)$$

によって定義する。このとき、 $\{P_j\}$  は条件 (P-1), (P-2), (P-3) を満たす (cf. [10], [15])。また、展開式 (2) が  $\lambda_j = -ij$  と

して成立する。従って、 $\varphi = \varphi_m$ ,  $m \in \mathbb{Z}$ ,  $k$  に対して、(3) は

$$(R+T)_m \sim \sum_{j=-\infty}^{\infty} \hat{R}(jm) \tau_j P_j$$

となり, 3k

$$M_n = \mathcal{G}_n \subset \bigcap_{\delta \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \pi_{n,\delta} \quad (n \in \mathbb{N}_0)$$

である (Cf. ④の注意). さらに, 各  $f \in X$  に対して,

$$\Delta_t^0(f) = f, \quad \Delta_t^r(f)(\omega) = \sum_{j=0}^r (-1)^{r-j} \binom{r}{j} f(\omega - jt) \quad (r \geq 1).$$

結局, これまでに行うべき諸結果が上の立場で序次 Banach 空間において適用される. 特に,  $r = 1$  のとき, 定理 2, 定理 5, 系 4 はそれぞれ, [20] における定理 9.3.3.1, 定理 9.3.4.2, 系 9.3.4.3 を含む. さらに, 系 1 (b) は, [20] における定理 9.3.3.2 を含む.

### 参考文献

- [1] N. I. Achieser, Theory of Approximation, Frederick Ungar, New York, 1956.
- [2] H. Buchwalter, Saturation dans un espace norme, C. R. Acad. Sci. Paris 250(1960), 651-653.
- [3] P. L. Butzer and H. Berens, Semi-Groups of Operators and Approximation, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg/New York, 1967.
- [4] P. L. Butzer and R. J. Nessel, Fourier Analysis and Approximation, Vol. I, Academic Press, New York, 1971.
- [5] P. L. Butzer, R. J. Nessel and W. Trebels, On summation processes of Fourier expansions in Banach spaces. I. Comparison theorems, Tohoku Math. J., 24(1972), 127-140; II. Saturation theorems, *ibid.*, 551-569; III. Jackson-and Zamansky-type inequalities for Abel-bounded expansions, *ibid.*, 27(1975), 213-223.

- [6] E. B. Davies, *One-Parameter Semigroups*, Academic Press, New York, 1980.
- [7] J. A. Goldstein, *Semigroups of Linear Operators and Applications*, Oxford Univ. Press, New York, 1985.
- [8] E. Hille and R. S. Phillips, *Functional Analysis and Semi-Groups*, Amer. Math. Soc. Colloq. Publ., Vol. 31, Amer. Math. Soc., Providence, R. I., 1957.
- [9] D. Jackson, *The Theory of Approximation*, Amer. Math. Soc. Colloq. Publ., Vol. 11, Amer. Math. Soc., New York, 1930.
- [10] Y. Katznelson, *An Introduction to Harmonic Analysis*, John Wiley, New York, 1968.
- [11] P. P. Korovkin, *Linear Operators and Approximation Theory*, Hindustan Publ. Corp., Delhi, 1960.
- [12] G. G. Lorentz, *Approximation of Functions*, 2ed. ed., Chelsea, New York, 1986.
- [13] V. D. Milman, Geometric theory of Banach spaces I; The theory of bases and minimal systems, *Russian Math. Surveys* 25(1970), 111-170.
- [14] I. P. Natanson, *Constructive Function Theory, Vol. I; Uniform Approximation*, Frederick Ungar, New York, 1964.
- [15] T. Nishishiraho, Quantitative theorems on linear approximation processes of convolution operators in Banach spaces, *Tohoku Math. J.*, 33(1981), 109-126.
- [16] T. Nishishiraho, Saturation of multiplier operators in Banach spaces, *Tohoku Math. J.*, 34(1982), 23-42.
- [17] T. Nishishiraho, Direct theorems for best approximation in Banach spaces, *Approximation, Optimization and Computing (IMACS, 1990; A. G. Law and C. L. Wang, eds.)*, pp. 155-158, North-Holland, Amsterdam, 1990.

- [18] T. Nishishiraho, The order of best approximation in Banach spaces, Proc. 13-th Symp. Appl. Funct. Analysis (H. Umegaki and W. Takahashi, eds.), pp. 90-104, Tokyo Inst. Technology, Tokyo, 1991.
- [19] T. Nishishiraho, The degree of the best approximation in Banach spaces, Tohoku Math. J., 46(1994), 13-26.
- [20] H. S. Shapiro, Topics in Approximation Theory, Lecture Notes in Math. 187, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg/New York, 1971.
- [21] I. Singer, Bases in Banach Spaces I. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg/New York, 1970.
- [22] A. F. Timan, Theory of Approximation of Functions of a Real Variable, Macmillan, New York, 1963.
- [23] W. Trebels, Multiplier for  $(C, \alpha)$ -Bounded Fourier Expansions in Banach Spaces and Approximation Theory, Lecture Notes in Math. 329, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg/New York, 1973.