

# Congruence Conditional Prime Distributions

大阪大学大学院・理学研究科 小川 裕之

Hiroyuki Ogawa

Department of Mathematics, Osaka University

## §1. 序論

素数の列  $2, 3, 5, 7, 11, \dots$  を  $4$  を法として眺めると  $2, 3, 1, 3, 3, \dots$  と最初の  $2$  を除いて既約剰余類の  $1$  と  $3$  が並びます. Dirichlet の素数定理 (どの既約剰余類にも同じ割合で素数が分布する) より,  $1$  と  $3$  が同じ割合で現れます. 素数定理の誤差評価により均一さの評価もできます.  $1$  をコインの表に  $3$  をコインの裏に, 素数の列をコイン投げに見立てることができるでしょうか.  $6$  を法として既約剰余類  $1$  を表に  $5$  を裏に見立てるのはいかがでしょう. あるいは  $7$  を法にとると, 既約剰余類は  $1, 2, 3, 4, 5, 6$  で賽の目のよう. 素数の列を賽の目に見立てることができるでしょうか. 素数の合同分布に対するある種の乱数性検定はなしです. 現在の目に対して次に現れる目の分布 (合同条件付き素数分布) に一様性は成り立つでしょうか. 筆者は, Hardy-Littlewood の予想を使って, 合同条件付き素数分布の実験値を非常によく近似する確率モデルを与えました ([10]). 確率モデルが合同条件付き素数分布をよく近似しているなら, そのモデルに対する大数の法則 (十分大きい素数に対する分布の漸近挙動) から, 合同条件付き素数分布は漸近的には一様であることがわかりました. ともかく結果を得たところで, 素数の列の代数体への拡張を考え, 合同条件付き素元分布を調べることを思い立ちました.  $2$  匹目のドジョウはいるのでしょうか.

通常素数の列  $2, 3, 5, 7, 11, \dots$  は, 大きさの順に次の素数, 次の素数とたどって並べたものです. 次の素数を指定する仕組みを代数体の素元あるいは素イデアルへ拡張できるでしょうか. 相対極小 (relative minima) を考えるのがスジですが, 近似が強く, 出会う数, 出会う素元が余りに少ない. 計算実験により分布の様子が観察可能なほどの素元の個数が確保でき, 合同条件など他の平易な情報で記述できない系列を与えるのが理想です. §2 で理想をある程度満足する「次の素数を指定する手続き」を類数  $1$  の  $2$  次体の整数環上で定義し, §3 で数値計算実験をお見せします. 2013 年秋の解析的整数論の研究集会で紹介したもの (有理素数の列に対する合同条件付き素数分布) に比べると, 計算した素元 (素数) の個数に約  $2000$  倍の差があり (前回は約  $2 \times 10^8$  個, 今回は  $10^5$  個), 目に見える形で分布を描くことはできませんでした. 今回の素元の列に関しても前回と同様の傾向が観察されたので, 少しは面白いのではないのでしょうか.

## §2. 類数 $1$ の $2$ 次体上の Next Prime 関数

自然数  $n$  に対して,  $n$  より大きい最小の素数を  $n$  の次の素数 (next prime) といい,  $\text{np}(n)$

で表す. 素数の列  $2, 3, 5, 7, 11, \dots$  は, 次の素数関数  $\text{np}(\bullet)$  の反復繰り返し  $\{\text{np}^r(1)\}_r$  で与えられる. 自然数  $n$  の次の素数  $\text{np}(n)$  は,  $n$  に 1 ずつ足していった自然数の列  $n+1, n+2, n+3, \dots$  の中で最初に出会う素数です. 代数体の整数環で類似手続きを考えるなら, 自然数の列  $n+1, n+2, n+3, \dots$  の様な代数的整数の列で, その列の上に十分に多くの素元がのっているものを与え, 列の上で最初に出会う素元を次の素元と呼ばばいい. この手続きを実現するには, 類数 1 の代数体の整数環を選ぶのが妥当で, 計算量の観点から 2 次体から始めるべきでしょう.

$K$  を類数 1 の実または虚の 2 次体,  $\mathcal{O}_K$  をその整数環とする.  $K$  の無限素点に関する完備化  $K_\infty$  は,  $K$  が実か虚かに応じて  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$  または  $\mathbb{C}$  で, いずれにせよ 2 次元実線形空間である.  $K_\infty$  において,  $K$  は稠密で,  $\mathcal{O}_K$  は格子をなす.  $\mathbb{Z}$  の場合に 1 ずつ足していったことを格子  $\mathcal{O}_K$  で実現するためには, 一步の歩幅と向かう方向を指定しなければならない. 歩幅は  $\mathbb{Z}$ -基底に選べばよいだろう. 埋め込み  $\mathcal{O}_K \subset K \subset K_\infty \simeq \mathbb{R}^2$  で自然に方向が定まるのだが, これとは異なるもので, 代数的な意味をもち計算も易しいものを導入する.

## 2.1. 代数的極座標と降下 Kummer 理論

$K/k$  を 2 次拡大体とする.  $\omega \in K \setminus k$  をとり,  $\omega'$  をその共役とする. 次の一次分数変換を考える.

$$h: \mathbb{P}^1 \ni x \mapsto \frac{x - \omega}{x - \omega'} \in \mathbb{P}^1$$

乗法群  $\mathbb{G}_m$  を  $\mathbb{G}_m = \mathbb{P}^1 \setminus \{0, \infty\} \subset \mathbb{P}^1$  と見て,  $A_{K/k}^\times = h^{-1}(\mathbb{G}_m)$  とおく.  $a, b \in A_{K/k}^\times$  に対して

$$a \otimes b = h^{-1}(h(a)h(b)) = \frac{ab - \omega\omega'}{a + b - (\omega + \omega')}$$

とおく.  $\omega + \omega', \omega\omega' \in k$  なので,  $(A_{K/k}^\times, \otimes)$  は  $\infty$  を単位元とする  $k$ -代数群である.  $A_{K/k}^\times$  は  $\omega$  に依るが,  $\omega$  を取り替えても  $k$ -同型なので  $\omega$  に依らない表記にした. 有理部分群  $A_{K/k}^\times(k)$  は集合として  $\mathbb{P}^1(k)$  に等しく, 群として  $\ker(N_{K/k}: K^\times \rightarrow k^\times) / \{\pm 1\}$  に同型である. 複素数における極座標

$$\begin{aligned} \mathbb{C}^\times &\longrightarrow \mathbb{R}_+ \times S^1 & \mathbb{R}_+ &= (0, \infty) \\ z &\longmapsto (|z|, z/\bar{z}) & S^1 &= \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\} \end{aligned}$$

によく似た群準同型

$$\begin{aligned} K^\times &\longrightarrow k^\times \times A_{K/k}^\times(k) \\ \xi &\longmapsto (N_{K/k}(\xi), h^{-1}(\xi/\xi')) \end{aligned}$$

を定義できる. 代数的極座標と呼ぶ. 全射でも単射でもないので座標と呼ぶのは不適切かもしれないが, 核は  $\{\pm 1\}$  なので座標の様に扱える. 複素数の偏角にあたるのが  $A_{K/k}^\times(k)$ -成分である.

簡単のため  $m$  を奇数とする.  $\zeta_m$  を 1 の原始  $m$  乗根とし,  $\zeta + \bar{\zeta}_m \in k$ ,  $K = k(\zeta_m)$  とする. このとき Hilbert Theorem 90 の類似が成り立つ.

**定理 2.1.** (Komatsu [6], O. [9])  $H^1(\text{Gal}(\bar{k}/k), A_{K/k}^\times(\bar{k})) [m] = \{1\}$

**系 2.2.** (実 Kummer 理論)  $A^\times(k)/A^\times(k)^{[m]} \simeq H^1(\text{Gal}(\bar{k}/k), A_{K/k}^\times [m])$

$A_{K/k}^\times$  の  $m$ -倍写像の核  $A_{K/k}^\times[m]$  は  $m$  次巡回群なので、基礎体が  $\zeta_m$  を含まなくても  $\zeta_m + \overline{\zeta_m}$  を含めば Kummer 理論が適用できる. 実 Kummer 理論もしくは 2 次降下 Kummer 理論と言う. 基礎体の次数を 2 次降下させたに過ぎないが、木田雅成氏はトーラス群を利用して更に小さい基礎体上での Kummer 理論 (高次降下 Kummer 理論) を得ている ([5]).

## 2.2. Walk on $K$

$K$  を 2 次体,  $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\omega]$  を整数環とする. 代数的極座標を使って,  $K^\times$  の元に偏角を定義する.

$$h: \mathbb{P}^1 \ni x \mapsto \frac{x+\omega}{x+\omega'} \in \mathbb{P}^1 \quad (\omega' \text{ は } \omega \text{ の共役})$$

とする.  $A_K^\times = h^{-1}(G_m)$  は  $\mathbb{Q}$ -代数群で, 有理部分群  $A_K^\times(\mathbb{Q})$  は集合として  $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$  に等しい. 代数群由来であることを強調する必要はないので,  $A_K^\times(\mathbb{Q})$  でなく  $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$  で話を進める. 代数的極座標  $K^\times \rightarrow \mathbb{Q}^\times \times \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$  において, 偏角は  $h^{-1}(\xi/\xi') \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$  ( $\xi \in K^\times$ ) で与えられる. これを  $\arg_K(\xi)$  と書く.  $\xi = a + b\omega \in K^\times$  ( $a, b \in \mathbb{Q}$ ) に対して,  $\arg_K(\xi) = h^{-1}(\xi/\xi') = a/b \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$  である. 偏角  $\arg_K$  は基底  $1, \omega$  に関する係数の比を取っただけのことで, 代数的極座標や降下 Kummer 理論を持ち出すまでもなく, ごく自然に思いつく. 面倒な理屈を持ち出したのは, 偏角と言うにふさわしい姿をしていることを代数的に描き出したからである. 更に, 偏角を比較するために偏角を捉える空間を明確にしたかったからである.

2 次体  $K$  上に偏角  $\arg_K$  を定義した. 次の目標は, 予め指定した向きに対してそちらに向かって進んで行く数の列を生成することである. 数の列が進むに従い, 偏角の分母, 分子は大きくなるので, 数の列の進む向きは, 偏角の属する集合  $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$  のアルキメデスの付値に関する閉包  $\mathbb{P}^1(\mathbb{R})$  の中で考えるのが適当であろう.  $\mathbb{P}^1(\mathbb{R})$  において, 向き  $\gamma \in \mathbb{P}^1(\mathbb{R})$  と数  $\xi \in K$  の偏角  $\arg_K(\xi)$  の向きの差は, 正接関数の加法公式と単調性により定量的に測ることができる.

$$d_K(\xi; \gamma) = \left| \frac{\gamma - \arg_K(\xi)}{1 + \gamma \arg_K(\xi)} \right|$$

の値が小さいほど, 向きが  $\gamma$  に近いと定める.

歩幅を基底  $1, \omega$  とする. 向き  $\gamma \in \mathbb{P}^1(\mathbb{R})$  に対して,  $\xi = a + b\omega \in K$  ( $a, b \in \mathbb{Q}$ ) の次の数は  $\xi + 1$  か  $\xi + \omega$  で向きが  $\gamma$  に近い方になる.  $\arg_K(\xi + 1) = \frac{a+1}{b}$ ,  $\arg_K(\xi + \omega) = \frac{a}{b+1}$  なので,  $\arg_K(\xi + 1) = \arg_K(\xi + \omega)$  となるための必要十分条件は  $a + b + 1 = 0$  である.  $\delta(\xi) = a + b$  とおく.  $\delta(\xi + 1) = \delta(\xi + \omega) = \delta(\xi) + 1$  なので, 歩みを進めるに従って  $\delta$  の値が大きくなる. 歩みによりいずれ原点から離れて  $\delta$  の値が大きくなるので,  $\delta$  の値が非負の領域で考えれば十分である. 歩幅  $1, \omega$  で向かう向きは非負なので, 向きは  $\gamma \geq 0$  ( $\gamma = \infty$  を含む) とすべきである.  $\xi \in K$  ( $\delta(\xi) \geq 0$ ),  $\gamma \in \mathbb{P}^1(\mathbb{R})$  ( $\gamma > 0$ ) に対して,  $\xi$  の  $\gamma$  方向の次の一步  $\text{ns}_\gamma(\xi)$  (next step) を次で定義する.

$$\text{ns}_\gamma(\xi) = \begin{cases} \xi + 1 & (\text{if } d_K(\xi + 1; \gamma) < d_K(\xi + \omega; \gamma)) \\ \xi + \omega & (\text{if } d_K(\xi + 1; \gamma) > d_K(\xi + \omega; \gamma)) \end{cases}$$

この定義では,  $\xi + 1$  と  $\xi + \omega$  が  $\gamma$  に対して等角  $d_K(\xi + 1; \gamma) = d_K(\xi + \omega; \gamma)$  になる場合 (等角条件と呼ぶ) が記述されていない. 等角条件を満たすとき,  $\xi + 1$  と  $\xi + \omega$  のどちらを選ぶべきか正当な理由が見当たらないのだが,  $\text{ns}_\gamma(\xi) = \{\xi + 1, \xi + \omega\}$  と定義し, 更にその

次の一步を  $\text{ns}_\gamma(\text{ns}_\gamma(\xi)) = \text{ns}_\gamma(\{\xi+1, \xi+\omega\}) = \xi+1+\omega$  と定義しよう. このように定める理由を明確にするため, 等角条件を満たす  $\xi, \gamma$  について少し検討する. 等角条件は方程式

$$\gamma^2 - \frac{2(a-b)(1+a+b)}{1+a+b+2ab} \gamma - 1 = 0 \quad (\xi = a+b\omega \in K, a, b \in \mathbb{Q}) \quad (\text{h})$$

で記述される.  $\gamma$  の 2 次方程式とみると, 正の実根をひとつ持つ.  $\xi$  に対して等角条件を満たす正の向き  $\gamma$  が唯一つあるわけで, 直感と一致する.  $\gamma$  を固定すると, (h) は  $a, b$  に関する平面 2 次曲線の方程式で, この曲線上の有理点  $(a, b)$  が等角条件を満たす  $\xi = a+b\omega$  に対応する.  $\gamma = 1$  のとき, (h) は 2 直線の和  $(a-b)(a+b+1) = 0$  である.  $\gamma \neq 1$  のとき, (h) は 2 点  $(a, b) = (-1, 0), (0, -1)$  を通る双曲線である.  $\gamma \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$  のとき, (h) は有理点をもつ有理双曲線なので無数に多くの有理点をもつ.  $\gamma$  が有理数でなくても, 有理点  $(0, -1)$  を使って双曲線 (h) 上の有理点を計算できる. 実際, 他に有理点があれば次で表される.

$$\left( \frac{(k+1)(k\gamma^2 + 2\gamma - k)}{-k\gamma^2 + 2k^2\gamma - 2\gamma + k}, \frac{k\gamma^2 + 2k\gamma + 2\gamma - k}{-k\gamma^2 + 2k^2\gamma - 2\gamma + k} \right) \quad (k \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})) \quad (\text{hh})$$

座標式 (hh) を眺めて, 有理点を与える  $k \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$  を探すのは面倒である. 双曲線の方程式 (h) から  $\gamma$  の項を括りだすと,  $\frac{2(a-b)(1+a+b)}{1+a+b+2ab} = \frac{\gamma^2 - 1}{\gamma}$  となる, (h) を満たす有理点  $(a, b)$  が存在するためには, 右辺  $\frac{\gamma^2 - 1}{\gamma}$  が有理数でなければならない. 従って, 等角条件を満たす  $\xi \in K$  が存在するならば,  $\gamma$  は有理数 ( $\gamma \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ ) であるか, ノルムが  $-1$  の実 2 次無理数でなければならない.

- 命題 2.3.** (1) 任意の  $\gamma \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$  ( $\gamma \geq 0$ ) に対して, 等角条件を満たす  $\xi \in K$  ( $\delta(\xi) \geq 0$ ) が存在する. 無理数  $\gamma \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  ( $\gamma \geq 0$ ) において等角条件を満たす  $\xi \in K$  ( $\delta(\xi) \geq 0$ ) が存在するためには,  $\gamma$  がノルム  $-1$  の正の実 2 次無理数であることが必要かつ十分である.
- (2)  $\gamma \in \mathbb{P}^1(\mathbb{R})$  ( $\gamma \geq 0$ ),  $\xi \in K$  ( $\delta(\xi) \geq 0$ ) において等角条件が満たされるとする. このとき  $\text{ns}_\gamma(\xi+1) = \text{ns}_\gamma(\xi+\omega) = \xi+1+\omega$  が成り立つ. 特に  $\gamma \neq 1$  ならば,  $\xi+1+\omega$  に対して, 等角条件が満たされることなく  $\text{ns}_\gamma$  を何度でも繰り返し作用させることができる.
- (3)  $\gamma = 1$  とし,  $\xi \in K$  ( $\delta(\xi) \geq 0$ ) で等角条件が満たされるとする. このとき, 任意の  $j \in \mathbb{N}$  に対して  $(\text{ns}_1)^{2j}(\xi) = (\xi + j(1+\omega))$  で等角条件が満たされる.

命題 2.3 (2) より, 等角条件を満たす  $\gamma, \xi$  に対して次の一步は  $\xi+1$  と  $\xi+\omega$  のどちらか一方に決める理由がない. どちらを選んでもその次の一步は  $\xi+1+\omega$  になる. そこで  $\text{ns}_\gamma(\xi) = \{\xi+1, \xi+\omega\}$ ,  $\text{ns}_\gamma(\text{ns}_\gamma(\xi)) = \text{ns}_\gamma(\{\xi+1, \xi+\omega\}) = \xi+1+\omega$  と定義したのである.

向き  $\gamma \in \mathbb{P}^1(\mathbb{R})$  ( $\gamma \geq 0$ ) をとる.  $\xi \in K$  ( $\delta(\xi) \geq 0$ ) に対して,  $\gamma$  方向の次の一步  $\text{ns}_\gamma$  を繰り返して得られる数の列  $\{(\text{ns}_\gamma)^j(\xi)\}_{j \geq 0}$  を walk on  $K$  toward  $\gamma$  in step  $\{1, \omega\}$ , あるいは単に  $\gamma$ -walk と呼ぶ. 命題 2.3 (2) より  $\gamma \neq 1$  のとき,  $\gamma$ -walk において等角条件が満たされるのは高々一度なので,  $\{\bullet+1, \bullet+\omega\}$  の形のものせいぜい一度しか現れない. 一方 1-walk ( $\gamma = 1$ ) では, 命題 2.3 (3) より, ひとたび等角条件が満たされれば 1 つおきにいつまでも等角条件が満たされる.

### 2.3. Next Prime

$K$  を類数 1 の 2 次体,  $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\omega]$  をその整数環,  $\arg_K$  を 2.2 節で与えた偏角とする.  $\gamma \in \mathbb{P}^1(\mathbb{R})$  ( $\gamma \geq 0$ ) とする.  $\xi \in \mathcal{O}_K$  ( $\delta(\xi) \geq 0$ ) を出発点とする  $\gamma$ -walk (walk on  $K$  toward

$\gamma$  in step  $\{1, \omega\}$  をとる. このとき  $\gamma$ -walk は整数の列で  $\mathcal{O}_K$  に含まれる.  $\gamma$ -walk において,  $\xi$  の後で最初に現れる素元を next prime of  $\xi$  toward  $\gamma$  in step  $\{1, \omega\}$  と呼び,  $\text{np}_\gamma(\xi)$  と書く.  $\gamma$ -walk および next prime の感覚をつかむために, 計算例を与える.

$K = \mathbb{Q}(\sqrt{-1})$ ,  $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ ,  $\omega = \sqrt{-1}$  とする.  $\xi = a + b\sqrt{-1} \in K^\times$  ( $a, b \in \mathbb{Q}$ ) に対して  $\arg_K(\xi) = a/b \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$  である.  $0 (\in \mathcal{O}_K)$  を出発点とする  $\sqrt{2}$ -walk の最初の 35 項は

$$\begin{array}{cccccc} 0 & 1 & \underline{1+\sqrt{-1}} & \underline{2+\sqrt{-1}} & \underline{2+2\sqrt{-1}} & \underline{3+2\sqrt{-1}} \\ 4+2\sqrt{-1} & 4+3\sqrt{-1} & 5+3\sqrt{-1} & \underline{5+4\sqrt{-1}} & 6+4\sqrt{-1} & \underline{6+5\sqrt{-1}} \\ 7+5\sqrt{-1} & \underline{8+5\sqrt{-1}} & 8+6\sqrt{-1} & 9+6\sqrt{-1} & 9+7\sqrt{-1} & \underline{10+7\sqrt{-1}} \\ 11+7\sqrt{-1} & 11+8\sqrt{-1} & 12+8\sqrt{-1} & 12+9\sqrt{-1} & 13+9\sqrt{-1} & \underline{13+10\sqrt{-1}} \\ 14+10\sqrt{-1} & 15+10\sqrt{-1} & 15+11\sqrt{-1} & 16+11\sqrt{-1} & 16+12\sqrt{-1} & \underline{17+12\sqrt{-1}} \\ 18+12\sqrt{-1} & 18+13\sqrt{-1} & 19+13\sqrt{-1} & \underline{19+14\sqrt{-1}} & 20+14\sqrt{-1} & \dots \end{array}$$

で, 素元に下線を引いた. 向きを少し変えて  $\sqrt{3}$ -walk は

$$\begin{array}{cccccc} 0 & 1 & \underline{1+\sqrt{-1}} & \underline{2+\sqrt{-1}} & 3+\sqrt{-1} & \underline{3+2\sqrt{-1}} \\ 4+2\sqrt{-1} & 4+3\sqrt{-1} & 5+3\sqrt{-1} & 6+3\sqrt{-1} & 6+4\sqrt{-1} & 7+4\sqrt{-1} \\ 8+4\sqrt{-1} & \underline{8+5\sqrt{-1}} & 9+5\sqrt{-1} & 10+5\sqrt{-1} & 10+6\sqrt{-1} & \underline{11+6\sqrt{-1}} \\ 11+7\sqrt{-1} & \underline{12+7\sqrt{-1}} & 13+7\sqrt{-1} & \underline{13+8\sqrt{-1}} & 14+8\sqrt{-1} & 15+8\sqrt{-1} \\ 15+9\sqrt{-1} & \underline{16+9\sqrt{-1}} & 16+10\sqrt{-1} & \underline{17+10\sqrt{-1}} & 18+10\sqrt{-1} & 18+11\sqrt{-1} \\ 19+11\sqrt{-1} & \underline{20+11\sqrt{-1}} & 20+12\sqrt{-1} & 21+12\sqrt{-1} & 22+12\sqrt{-1} & \dots \end{array}$$

となる.

2 次体  $K$  や  $\omega$  を変えると  $\gamma$ -walk はどのように変わるであろうか. 歩幅を定める整数基  $\{1, \omega\}$  の  $\omega$  と, 偏角  $\arg_K$  を定める  $\omega$  を同じにとつたので,  $\gamma$ -walk は本質的に 2 次体  $K$  にも  $\omega$  の取り方に依らない. どの  $K = \mathbb{Q}(\omega)$ ,  $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\omega]$  に対しても  $\sqrt{2}$ -walk は  $0, 1, 1+\omega, 2+\omega, 3+3\omega, 3+2\omega, 4+2\omega, 4+3\omega, 5+3\omega, 5+4\omega, \dots$  で,  $\sqrt{3}$ -walk は  $0, 1, 1+\omega, 2+\omega, 3+\omega, 3+2\omega, 4+2\omega, 4+3\omega, 5+3\omega, 6+3\omega, \dots$  である. 実は, 次の一步や  $\gamma$ -walk の定義において  $\omega$  を  $K$  の整数に取らなくてもよい.  $\omega \in K \setminus \mathbb{Q}$  で偏角などが与え, 歩幅  $\{1, \omega\}$  の  $\gamma$ -walk を定義できる.  $\omega$  が整数であるかどうかに関わらず,  $\gamma$ -walk の計算手続きも,  $\omega$  を使った表記も全く同じになる.

整数でない  $\omega$  に対しては,  $\gamma$ -walk は整数環上を歩むわけではないし, 歩む数に対応する整環が整数環になるわけでもない. 次の素元  $\text{np}_\gamma$  を次に現れる素元と定めても意味をなさない. 選んでいく素元に当たるものを,  $\omega$  に合わせなければならない.  $\omega \in K \setminus \mathbb{Q}$  とし,  $\Lambda_\omega = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\omega$  とおく.  $\Lambda_\omega$  は  $K$  内の格子をなす.  $\mathcal{O}_\omega = \{\xi \in K \mid \xi\Lambda_\omega \subset \Lambda_\omega\}$  を格子  $\Lambda_\omega$  の整環と呼ぶ.  $\xi \in \Lambda_\omega$  について  $(\Lambda_\omega : \xi\mathcal{O}_\omega) = \{\zeta \in K \mid \zeta\Lambda_\omega \subset \xi\mathcal{O}_\omega\}$  が  $\mathcal{O}_\omega$  の proper 素イデアルのとき,  $\xi$  を  $\omega$ -prime と呼ぶことにする.  $\mathcal{O}_\omega = \mathbb{Z}[\omega]$  のとき,  $\Lambda_\omega = \mathcal{O}_\omega = \mathcal{O}_K$  で,  $\omega$ -prime は  $\mathcal{O}_K$  の ( $K$  の) 素元に他ならない.  $\gamma$ -walk 上で  $\omega$ -prime を辿ることで  $\text{np}_\gamma$  (next prime) を定義することができる.

代数的極座標で定まる偏角  $\arg_K(\xi)$  は固定された原点から見た絶対的な向きで, 一步ごとに到達した所から見た相対的な向きではない. 歩幅を固定しているので, 相対的な向きで考えたのでは常に同じ歩幅で歩み続けることになってしまう. ただ  $\gamma = 0, \infty$  は特別で,

0-walk,  $\infty$ -walk はそれぞれ常に同一方向に歩む.  $\gamma \neq 0, \infty$  のとき,  $\gamma$ -walk は, 原点から延びる  $\gamma$  方向の ray ( $\gamma$ -ray と呼ぶ) にまわりつく様に歩む. 出発点から,  $\gamma$ -ray に向かって一目散に進み, そして  $\gamma$ -ray に絡みつく.  $\gamma$  が有理数のときは,  $\gamma$ -ray 上に格子点 ( $\mathcal{O}_K$  の元) が等間隔に並ぶので,  $\gamma$ -walk はある種の周期をもち一般項を容易に書き表せる. 出発点の違いは  $\gamma$ -ray に絡みつくまでの最初の数項の歩みが異なるだけなので,  $\gamma$ -walk の定義で出発点を明記しなかった.

**命題 2.4.** (1)  $\xi = a + b\omega$  ( $a, b \in \mathbb{Q}$ ) とする.  $\xi$  を出発点とする 0-walk は  $\{a + (b+j)\omega\}_{j \geq 0}$  で,  $\infty$ -walk は  $\{(a+j) + b\omega\}_{j \geq 0}$  である.  
 (2) 0 を出発点とする 1-walk は, 第  $2j$  項 ( $j \geq 0$ ) が  $(1+\omega)^j$  で, 第  $2j+1$  項 ( $j \geq 0$ ) が  $\{(1+\omega)^j + 1, (1+\omega)^j + \omega\}$  で表される.  
 (3)  $0 < \gamma < 1$  とする.  $\xi_1, \xi_2 \in K$  が  $\xi_1 - \xi_2 \in \mathcal{O}_K$  を満たすとき,  $(ns_\gamma)^m(\xi_1) = (ns_\gamma)^n(\xi_2)$  となる  $m, n \in \mathbb{N}$  が存在する.

原点から延びる ray でなくても, 何らかの曲線を考え, それにまわりつく数の列を取れば複雑なものが得られるであろう. 有理数でない  $\gamma$  に対する  $\gamma$ -ray だけでも, 十分に多様な列が現れる. 2 次体や整数基を固定しても, 向きを変えればいろいろな数の列, 素元の列が現れる. 次の素元 ( $np_\gamma$ ) は上の数の列で下線を引いた素元を順にたどっていったものである. 最も基本的な疑問がある. いつでも次の素元が見つかるであろうか. 任意の  $\gamma$ -walk 上に素元が無数に多く存在するであろうか.

**問い 2.5.** 類数 1 の 2 次体  $K$  と整数基  $\{1, \omega\}$  を任意に取る. どの向き  $\gamma \in \mathbb{P}^1(\mathbb{R})$  ( $\gamma \geq 0$ ), どの出発点  $\xi \in \mathcal{O}_K$  ( $\delta(\xi) \geq 0$ ) に対しても  $\gamma$ -walk 上に無数に多くの素元が存在するか?

この素朴な問いは多くの未解決問題を内包している. 例えば,  $n^2 + 1$  型の素数が無数に存在するか? など, 2 次多項式で与えられる素数の無限性に関する問題をすべて含んでいる. 先に見たように,  $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-1})$ ,  $\omega = \sqrt{-1}$  において,  $\sqrt{-1}$  を出発点とする  $\infty$ -walk は  $\{n + \sqrt{-1}\}_{n \geq 1}$  で, 各項のノルムは  $n^2 + 1$  である.  $\infty$ -walk 上の素元を並べると,  $1 + \sqrt{-1}$ ,  $2 + \sqrt{-1}$ ,  $4 + \sqrt{-1}$ ,  $6 + \sqrt{-1}$ ,  $10 + \sqrt{-1}$ ,  $14 + \sqrt{-1}$ ,  $16 + \sqrt{-1}$ ,  $20 + \sqrt{-1}$ ,  $24 + \sqrt{-1}$ ,  $26 + \sqrt{-1}$ ,  $\dots$  で, それらのノルムは  $n^2 + 1$  型素数である.  $\infty$ -walk 上に無数に多くの素元があるかと言う問いは,  $n^2 + 1$  型素数の無限性問題そのものである. 向きを 2 にとり, 0 を出発点とする 2-walk (0 を第 0 項とする) は, 第  $3n$  項が  $(2 + \sqrt{-1})n$  で, その前後, 第  $3n - 1$  項が  $(2 + \sqrt{-1})n - 1$ , 第  $3n + 1$  項が  $(2 + \sqrt{-1})n + 1$  で表される.  $5n^2 - 4n + 1$  型素数と  $5n^2 + 4n + 1$  型素数が現れる.

向きを有理数 ( $\gamma \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ ) に取ると  $\gamma$ -walk にある種の周期が現れ, 平易な情報で  $\gamma$ -walk に並ぶ数を記述できる. 有理数の向きに関する上の問いは, 2 次多項式型の素数の無限性問題に帰着される. §1 で, 合同条件など他の平易な情報で記述できない  $\gamma$ -walk が理想であるとしていたのは, この様なよく知られた問題だけでなく新たな視点からの問題提起が面白いと考えるからである.

**予想 2.6.** 類数 1 の 2 次体  $K$  と整数基  $\{1, \omega\}$  を任意に取る.  $\gamma$  を正の無理数とする. どの出発点  $\xi \in \mathcal{O}_K$  ( $\delta(\xi) \geq 0$ ) に対しても  $\gamma$ -walk 上に無数に多くの素元が存在する.

更に向き  $\gamma$  の次数に制限をすると、近似定理などから少しは手が届きそうに見えるのだが...

**予想 2.7.** 類数 1 の 2 次体  $K$  と整数基  $\{1, \omega\}$  を任意に取る.  $\gamma$  を正の実 2 次無理数とする. どの出発点  $\xi \in \mathcal{O}_K$  ( $\delta(\xi) \geq 0$ ) に対しても  $\gamma$ -walk 上に無数に多くの素元が存在する.

### §3. 計算実験

#### 3.1. 素元の個数

$\gamma(\in \mathbb{P}^1(\mathbb{R}), 0 \leq \gamma \leq \infty)$  方向の次の一步関数を繰り返し作用させて得られる  $\gamma$ -walk と、その上に順々に現れる素元の列について、個数の分布と合同条件付き素元分布を計算し、有理素数の場合と比較する.  $K$  を 2 次体,  $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\omega]$  を整数環とする. 実数  $x > 0$  と、整数環上を歩む  $\gamma$ -walk ( $\subset \mathcal{O}_K$ ) に対して、素元の個数関数を

$$\pi(x; \gamma\text{-walk}) = \#\{p \in \gamma\text{-walk} \mid \delta(p) < x, p \text{ は } \mathcal{O}_K \text{ の素元}\}$$

で定義する. 但し  $\xi = a + b\omega \in K$  ( $a, b \in \mathbb{Q}$ ) に対して  $\delta(\xi) = a + b$  とする. 向き  $\gamma \in \mathbb{P}^1(\mathbb{R})$  を  $\gamma = \sqrt{m}$  ( $m$  は平方数でない自然数) にとると、命題 2.3 (1) より等角条件を気にする必要はない.

**3.1.1. 表 1**  $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-1})$ ,  $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ ,  $\omega = \sqrt{-1}$  とする. 向き  $\gamma$  をいろいろな実 2 次無理数にとり素元の個数関数  $\pi(x; \gamma\text{-walk})$  の値を表 1 にまとめた. 実験データを求めた表はすべて references の後に置いた. 表 1 から表 5 まで、5 ページ分ある. 比較のため、通常の素数の個数関数  $\pi(x) (= \#\{p < x \mid p \text{ は素数}\})$  の値,  $\gamma = \infty$  (出発点は  $\sqrt{-1}$  にとり,  $n^2 + 1$  型素数に対応),  $\gamma = 1$ ,  $\gamma = 2$  と、向きが大きくなる様子の観察の一例とし  $\gamma = \sqrt{541}$  (100 番目の素数の平方根),  $\gamma = \sqrt{1223}$  (200 番目の素数の平方根),  $\gamma = \sqrt{10^6 + 3}$  についても計算結果を並べた.

非常に小さい範囲でしか計算していないので大雑把な観察に過ぎないが、 $\pi(x; \gamma\text{-walk})$  の値は  $\pi(x)$  の 2/3 程度に見える. 向きが大きくなるに従い小さくなっているようにも見える. 有理数の向き 1, 2,  $\infty$  では若干の増減があり、ある種の周期をもつことの影響かもしれない. 十分に多くの素元を確保するという要請は満足されそうに思える.

**3.1.2. 表 2** 2 次体と整数基を変えて計算してみる. 表 1 にある  $\gamma$  に対して  $\gamma$ -walk が計算されているので、ノルムの計算を新しい 2 次体と  $\omega$  に合わせればよい. 実 2 次体  $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ ,  $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ ,  $\omega = \sqrt{2}$  で素元の個数関数  $\pi(x; \gamma\text{-walk})$  の値を表 2 にまとめる. ただ、 $\gamma = 1$  の 1-walk は再考する必要がある. 出発点を 0 に取った場合、等角条件から第  $2j+1$  項で 2 数の組  $\{(1+\omega)j+1, (1+\omega)j+\omega\}$  が現れる. 素元の個数の数え方を決めなければならない.  $\omega = \sqrt{-1}$  のときは  $(1+\sqrt{-1})j+1$  と  $(1+\sqrt{-1})j+\sqrt{-1}$  は互いに共役と同伴なので、一方が素元なら他方も素元となり、素元の個数を数えるにあたり、どちらを選んでもよい.  $\omega = \sqrt{2}$  の場合、例えば第 3 項の  $(1+\sqrt{2})+1$  と  $(1+\sqrt{2})+\sqrt{2}$  は共に素元だが、第 9 項の  $(1+\sqrt{2})4+1$  は素元で  $(1+\sqrt{2})4+\sqrt{2}$  は素元でない. ノルムの

偶奇が異なることと、ノルムが添え字  $j$  の 2 次多項式であることから、第 3 項、第 7 項を除いて、両方が素元になることはない。そこで、ここでは一方であれ両方であれ出てきた素元をすべて数えることにした。第 3 項、第 7 項はそれぞれ二つずつに数えることにしたが、今回だけの措置で、一つずつに数えて表の数値をすべて 2 減らす考え方もある。いずれにせよ  $\omega = \sqrt{2}$  における例外的な数個の変動だけのことだから、増大度等を調べるにあたり、余り神経質になる必要はないであろう。ここでは深入りしないが、 $\omega = \sqrt{3}$  の場合は、第  $2 \times 10^5 + 1$  項までで 1079 項に、第  $2 \times 10^6 + 1$  項の中の 7580 項に、組となる 2 数が共に素元となるものが現れる。素元の個数の数え方も問題だが、素元の列としての前後をどう指定するか。合同条件付き素元分布では素元の順序の決め方も重要なので、並べ方に統一的な指針の与えられていない 1-walk は、現時点では扱わないことにする。

ただちに目をひかれるのは、向き  $\gamma = \sqrt{2}$  と 2 で、特異的とも言えるほどたくさん素元が現れている。単数群  $\langle -1, 1 + \sqrt{2} \rangle$  の影響なのだが、 $\sqrt{2}$  と 2 では単数群の働き方が異なっていて少し面白い。 $\gamma = 2$  では、基本単数  $1 + \sqrt{2}$  を介した関係式がある。2-walk の第  $3n + 1$  項  $(2 + \sqrt{2})n + 1$  と第  $3n + 5$  項  $(2 + \sqrt{2})(n + 2) - 1$  は共役をとって  $(1 + \sqrt{2})^2$  をかけることで移りあう： $((2 + \sqrt{2})n + 1)'(1 + \sqrt{2})^2 = (2 + \sqrt{2})(n + 2) - 1$ 、 $((2 + \sqrt{2})(n + 2) - 1)'(1 + \sqrt{2})^2 = (2 + \sqrt{2})n + 1$ 。 $\delta$  の値が  $10^6$  以下の 103137 個の素元は、ノルム 2 の素元  $2 + \sqrt{2}$  を除く 10316 個の素元がこの関係式により 2 つずつ組になって現れている。

$\gamma = \sqrt{2}$  の  $\sqrt{2}$ -walk でも基本単数の働きによるのだが、2-walk のときの様な単純な関係式ではない。一般に  $\gamma$ -walk 上の点  $\xi$  のノルムは  $\delta(\xi)^2$  程度の大きさである。 $\sqrt{2}$ -walk 上の点  $\xi = a + b\sqrt{2} \in \mathcal{O}_K$  は  $a/b$  が  $\sqrt{2}$  に近づくように選ばれているので、 $|\xi'| = |a - b\sqrt{2}| \ll \delta(\xi)$  となる。 $|\xi| = O(|\delta(\xi)|)$  なので、ノルムの絶対値  $|\xi\xi'| = |a^2 - 2b^2| = O(|\delta(\xi)|) = O(|a + b|)$  となる。ノルムの絶対値が高さ ( $\delta$  の絶対値) と同程度の大きさなので、同じノルムをもつ数が沢山現れる。 $\delta$  の値が  $10^6$  以下の 133694 個の素元についてノルムごとに個数を調べると、ノルムの絶対値が 2 のものが 15 個  $(2 + \sqrt{2}, 4 + 3\sqrt{2}, 10 + 7\sqrt{2}, \dots, 390050 + 275807\sqrt{2})$ 、ノルムの絶対値が 7 のものが 28 個  $(5 + 3\sqrt{2}, 5 + 4\sqrt{2}, 11 + 8\sqrt{2}, \dots, 504293 + 356589\sqrt{2})$ 、ノルムの絶対値が 17 のものが 25 個  $(9 + 7\sqrt{2}, 15 + 11\sqrt{2}, 23 + 16\sqrt{2}, 37 + 26\sqrt{2}, \dots, 370449 + 261947\sqrt{2})$ 、ノルムの絶対値が 23 のものが 25 個  $(11 + 7\sqrt{2}, 19 + 13\sqrt{2}, 25 + 18\sqrt{2}, \dots, 409651 + 289667\sqrt{2})$  などとなっている。ここで、 $(2 + \sqrt{2})(1 + \sqrt{2})^{14} = 390050 + 275807\sqrt{2}$ 、 $(5 + 3\sqrt{2})(1 + \sqrt{2})^{13} = 437371 + 309268\sqrt{2}$ 、 $(5 + 4\sqrt{2})(1 + \sqrt{2})^{13} = 504293 + 356589\sqrt{2}$ 、 $(9 + 7\sqrt{2})(1 + \sqrt{2})^{12} = 370449 + 261947\sqrt{2}$ 、 $(15 + 11\sqrt{2})(1 + \sqrt{2})^{11} = 248087 + 175424\sqrt{2}$  なので、単数倍で移りあう同伴な素元で、 $\delta$  の値が非負で  $10^6$  のものがすべて現れている。この現象は、相対極小 (relative minima) と高さの評価から説明できるのだが、ここでは省略する。ともかく、 $\omega = \sqrt{2}$  において、 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  の素元  $p$  が  $\sqrt{2}$ -walk に現れたなら、実数として  $p$  より大きい  $p$  と同伴な素元はすべて  $\sqrt{2}$ -walk 上に現れる。 $\sqrt{2}$ -walk 上に無数に多くの (同伴な) 素元が存在する。これをもって、問い 2.5、予想 2.6、予想 2.7 に対する肯定的一例とするのは気が引けるが、何も無いよりはマシか...

### 3.2. $\gamma$ -walk における Dirichlet の素数定理の類似

問い 2.5、予想 2.6、予想 2.7 などの、 $\gamma$ -walk に現れる素元の個数の無限性について、何



一つ満足に答えていないが、これら計算実験から  $\gamma$ -walk 上にそれなりに十分な個数の素元が確保されそうである。 $\gamma$ -walk 上で合同条件付き素元分布を考えたいのだが、その前に、 $\gamma$ -walk において Dirichlet の素数定理の類似が成り立つかどうか問題となる。 $\mathfrak{a}$  を整イデアル、 $\mathfrak{c} \in (\mathcal{O}_K/\mathfrak{a})^*$  を法  $\mathfrak{a}$  に関する既約剰余類とする。正の実数  $x$  と、整数環上を歩む  $\gamma$ -walk ( $\subset \mathcal{O}_K$ ) に対し、

$$\pi_{\mathfrak{c}}(x; \gamma\text{-walk}) = \#\{p \in \gamma\text{-walk} \cap \mathfrak{c} \mid \delta(p) < x, p \text{ は } \mathcal{O}_K \text{ の素元}\}$$

とおく。 $\gamma$ -walk 上の素元における  $\mathfrak{c}$  に属する素元の密度は、極限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi_{\mathfrak{c}}(x; \gamma\text{-walk})}{\pi(x; \gamma\text{-walk})}$$

で表される。極限の存在と、極限值を調べることが、Dirichlet の素数定理の類似である。

**予想 3.1.**  $\pi_{\mathfrak{c}}(x; \gamma\text{-walk})$  が非有界となる  $\mathfrak{c} \in (\mathcal{O}_K/\mathfrak{a})^*$  の個数を  $r$  とおく。このとき素元密度  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi_{\mathfrak{c}}(x; \gamma\text{-walk})}{\pi(x; \gamma\text{-walk})}$  は  $0$  か  $\frac{1}{r}$  に等しい。特に  $\gamma \notin \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$  ならば、 $r = \varphi(\mathfrak{a})$  が成り立つ。

### 3.3. $\gamma$ -walk 上の合同条件付き素元分布

$\omega = \sqrt{-1}$  ( $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-1})$ ,  $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ ) において絶対ノルムが 5 の素イデアル ( $2 + \sqrt{-1}$ ) を法とした合同条件付き素元分布 (表 3) と、絶対ノルムが 13 の素イデアル ( $3 + 2\sqrt{-1}$ ) を法とした合同条件付き素元分布 (表 4),  $\omega = \sqrt{2}$  ( $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ ,  $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ ) において絶対ノルムが 7 の素イデアル ( $5 + 3\sqrt{2}$ ) を法とした合同条件付き素元分布 (表 5) を調べた。分布の変遷を視覚的に見せるにはだいたい  $100 \times 10^6$  個 (連続した  $10^6$  個の素元列について分布を調べたものを 100 区画程度) ぐらいの素元が生成できるとよいのだが、今回は  $10^5$  個程度しか生成できなかった。正確には、高さ ( $\delta$  の絶対値) が  $2 \times 10^6$  以下の素元を生成した。それでも絶対ノルムが  $10^{12}$  を超える大きさの素元に至るまで計算しているので、個数を一桁増やすとか、一桁上の区画を見るとか、データ量を増やすのは計算機および計算時間の問題でなかなか難しい。そこで、向き  $\gamma$  をいろいろ変えて、それぞれ  $10^5$  個程度の長さの素元列に対して合同条件付き素元分布 (既約剰余類ごとの度数分布) を計算し、傾向を比較することにした。もっと多くの  $\gamma$  に対して計算データはあるが、たくさん並べても冗長になるだけなので、すべての実験データを掲載したわけではない。

縦横に並べられた表は、左上角に  $\gamma$  の値を記した左側の表と、その右の % の表記のある表の 2 つで一組をなす。各組の左の表 (左上角に  $\gamma$  の値のある表) は、縦のラベル  $a$ 、横のラベル  $b$  ( $a, b$  は既約剰余類の代表) のところに既約剰余類  $a$  に属する素元の次の素元が  $b$  に属するものの個数をおいた度数分布表である。右上角に高さ  $2 \times 10^6$  以下の素元の個数を、右端の列に各既約剰余類に属する素元の個数を記した。右の表 (% の表記のある表) は、その度数分布を百分率 (小数位は四捨五入) で表したもので、切り上げ切り捨てなどの関係で総和が 100% にならないこともある。表 4 は数値が細かく見えにくいかもしれませんが、分布の傾向を捉えるにあたり、細かい数値にとらわれず、まずは模様を眺めるので十分でしょう。

表の右端の列をみると、 $\gamma$ -walk 上でも Dirichlet の素数定理の類似 (予想 3.1) が成り立ちそうに見える。合同条件付き素元分布については、この程度の個数の素元の分布からで

も、大きな偏りのあることが見て取れる。それなりに共通の傾向や、向きの違いによる特徴も現れている。大雑把に  $a = b$  のライン上が少なく、その右上に多く分布する傾向があるが、すべてがそうではない。modulo  $3 + 2\sqrt{-1}$  では  $a = b$  のラインよりもっと少ないところもある。

## References

- [1] R. Crandall-C. Pomerance, *Prime Numbers — A Computational Perspective, Second Edition*, Springer-Verlag Berlin-Heidelberg-New York, 2005.
- [2] R. K. Guy, *Unsolved Problems in Number Theory, 3rd edition*, Springer-Verlag Berlin-Heidelberg-New York, 2004.
- [3] G. Hardy, *Collected Works of G. H. Hardy*, Clarendon Press, Oxford, 1966.
- [4] G. H. Hardy-E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers, 5th ed.*, Clarendon Press, Oxford, 1979.
- [5] M. Kida, *Kummer theory for norm algebraic tori*, J. Algebra 293 (2005), 427–447
- [6] T. Komatsu, *Arithmetic of Rikuna's generic cyclic polynomial and generalization of Kummer theory*, Manuscripta Math. 114 (2004), 265–279
- [7] 本橋 洋一, 解析的整数論 I —素数分布論—, 朝倉書店, 2009.
- [8] W. Narkiewicz, *The Development of Prime Number Theory*, Springer-Verlag Berlin-Heidelberg-New York, 2000.
- [9] 小川 裕之, *Quadratic reduction of multiplicative group and its applications*, 数理解析研究所講究録 1324 (2003), 217–224
- [10] H. Ogawa, *How should we bet on the prime number dice?*, 数理解析研究所講究録 1898 (2014), 16–27
- [11] G. Tenenbaum, *Introduction to Analytic and Probabilistic Number Theory*, Cambridge University Press, 1995.

表 1 Table of  $\pi(x; \gamma\text{-walk})$  for  $x \leq 10^6$   $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-1})$ ,  $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ ,  $\omega = \sqrt{-1}$ 

| $x$             | 100 | 1000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 600000 | 800000 | 1000000 |
|-----------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| $\pi(x)$        | 25  | 168  | 1229  | 2262  | 3245  | 4203  | 5133  | 6057  | 7837  | 9592   | 17984  | 25997  | 33860  | 41538  | 49098  | 63951  | 78498   |
| $\sqrt{2}$      | 21  | 123  | 859   | 1516  | 2172  | 2821  | 3463  | 4056  | 5232  | 6364   | 11832  | 17082  | 22151  | 27112  | 31964  | 41731  | 51275   |
| $\sqrt{3}$      | 19  | 126  | 817   | 1542  | 2182  | 2792  | 3425  | 4057  | 5211  | 6335   | 11853  | 17021  | 22128  | 27136  | 32026  | 41565  | 51067   |
| $\sqrt{5}$      | 21  | 119  | 783   | 1473  | 2174  | 2807  | 3372  | 3971  | 5135  | 6269   | 11726  | 16931  | 22163  | 26983  | 31908  | 41580  | 50952   |
| $\sqrt{6}$      | 18  | 113  | 837   | 1485  | 2146  | 2746  | 3379  | 3963  | 5135  | 6256   | 11756  | 16905  | 22034  | 27082  | 32044  | 41576  | 50959   |
| $\sqrt{7}$      | 20  | 119  | 827   | 1486  | 2150  | 2787  | 3369  | 3972  | 5089  | 6239   | 11737  | 16890  | 21906  | 26972  | 31999  | 41605  | 51068   |
| $\sqrt{8}$      | 21  | 125  | 781   | 1477  | 2156  | 2802  | 3433  | 4062  | 5220  | 6348   | 11746  | 17092  | 22220  | 27167  | 31972  | 41507  | 50979   |
| $\sqrt{10}$     | 16  | 118  | 836   | 1507  | 2126  | 2761  | 3389  | 3975  | 5132  | 6290   | 11735  | 16944  | 22097  | 27048  | 31962  | 41534  | 50928   |
| $\sqrt{11}$     | 16  | 121  | 788   | 1423  | 2071  | 2688  | 3289  | 3907  | 5071  | 6248   | 11704  | 16888  | 21964  | 27043  | 31855  | 41511  | 51020   |
| $\sqrt{13}$     | 21  | 109  | 795   | 1512  | 2207  | 2832  | 3404  | 3995  | 5197  | 6347   | 11752  | 16945  | 21994  | 27040  | 31963  | 41445  | 50932   |
| $\sqrt{17}$     | 18  | 102  | 764   | 1426  | 2083  | 2743  | 3327  | 3934  | 5082  | 6184   | 11602  | 16772  | 21719  | 26650  | 31522  | 41149  | 50686   |
| $\sqrt{19}$     | 20  | 117  | 796   | 1474  | 2107  | 2715  | 3325  | 3927  | 5154  | 6291   | 11774  | 16936  | 21952  | 26837  | 31805  | 41495  | 50883   |
| $\sqrt{23}$     | 24  | 119  | 757   | 1460  | 2090  | 2690  | 3305  | 3889  | 5065  | 6223   | 11627  | 16812  | 21912  | 26890  | 31739  | 41207  | 50543   |
| $\sqrt{29}$     | 16  | 128  | 800   | 1487  | 2176  | 2794  | 3375  | 3953  | 5142  | 6254   | 11653  | 16761  | 21761  | 26761  | 31677  | 41099  | 50518   |
| $\sqrt{31}$     | 18  | 134  | 824   | 1529  | 2160  | 2779  | 3392  | 3973  | 5155  | 6341   | 11730  | 16902  | 21968  | 26918  | 31793  | 41228  | 50568   |
| $\sqrt{37}$     | 17  | 104  | 817   | 1510  | 2146  | 2762  | 3346  | 3922  | 5090  | 6229   | 11711  | 16977  | 21961  | 26821  | 31661  | 41230  | 50652   |
| $\sqrt{541}$    | 20  | 123  | 781   | 1463  | 2086  | 2686  | 3268  | 3853  | 5016  | 6130   | 11433  | 16534  | 21624  | 26577  | 31396  | 40991  | 50291   |
| $\sqrt{1223}$   | 15  | 108  | 801   | 1450  | 2088  | 2659  | 3262  | 3844  | 4976  | 6097   | 11474  | 16674  | 21659  | 26522  | 31229  | 40548  | 49957   |
| $\sqrt{10^6+3}$ | 13  | 92   | 776   | 1454  | 2064  | 2703  | 3290  | 3863  | 5032  | 6169   | 11554  | 16701  | 21574  | 26514  | 31254  | 40675  | 49917   |
| $1 + \sqrt{2}$  | 20  | 126  | 820   | 1521  | 2138  | 2782  | 3348  | 3932  | 5080  | 6257   | 11673  | 16819  | 21862  | 26788  | 31667  | 41192  | 50555   |
| $\pi$           | 17  | 113  | 865   | 1519  | 2155  | 2764  | 3389  | 4001  | 5128  | 6247   | 11801  | 17010  | 22013  | 26868  | 31713  | 41511  | 50939   |
| 1               | 22  | 131  | 911   | 1646  | 2356  | 3042  | 3689  | 4344  | 5586  | 6786   | 12707  | 18406  | 23900  | 29293  | 34604  | 45056  | 55404   |
| 2               | 18  | 112  | 820   | 1459  | 2043  | 2679  | 3250  | 3805  | 4908  | 5975   | 11217  | 16192  | 21073  | 25917  | 30580  | 39688  | 48782   |
| $\infty$        | 19  | 112  | 841   | 1559  | 2268  | 2952  | 3612  | 4252  | 5513  | 6656   | 12391  | 17924  | 23276  | 28563  | 33820  | 44163  | 54110   |



表 3  $\omega = \sqrt{-1}$ , modulo  $2+\sqrt{-1}$ 

|             |      |       |       |       |        |   |    |    |    |    |    |
|-------------|------|-------|-------|-------|--------|---|----|----|----|----|----|
| $\sqrt{2}$  | 1    | 2     | 3     | 4     | 96991  | % | 1  | 2  | 3  | 4  |    |
| 1           | 4812 | 6099  | 6642  | 6503  | 24056  | 1 | 20 | 25 | 28 | 27 | 25 |
| 2           | 6835 | 4889  | 5929  | 6682  | 24335  | 2 | 28 | 20 | 24 | 27 | 25 |
| 3           | 6326 | 7100  | 4811  | 6106  | 24343  | 3 | 26 | 29 | 20 | 25 | 25 |
| 4           | 6084 | 6247  | 6961  | 4962  | 24254  | 4 | 25 | 26 | 29 | 20 | 25 |
| $\sqrt{3}$  | 1    | 2     | 3     | 4     | 97117  | % | 1  | 2  | 3  | 4  |    |
| 1           | 5152 | 5574  | 6025  | 7405  | 24156  | 1 | 21 | 23 | 25 | 31 | 25 |
| 2           | 7627 | 4955  | 5433  | 6221  | 24236  | 2 | 31 | 20 | 22 | 26 | 25 |
| 3           | 6177 | 7480  | 5128  | 5558  | 24343  | 3 | 25 | 31 | 21 | 23 | 25 |
| 4           | 5200 | 6227  | 7757  | 5195  | 24379  | 4 | 21 | 26 | 32 | 21 | 25 |
| $\sqrt{5}$  | 1    | 2     | 3     | 4     | 96559  | % | 1  | 2  | 3  | 4  |    |
| 1           | 5739 | 7878  | 6164  | 4355  | 24136  | 1 | 24 | 33 | 26 | 18 | 25 |
| 2           | 5511 | 5286  | 7108  | 6246  | 24151  | 2 | 23 | 22 | 29 | 26 | 25 |
| 3           | 5370 | 5488  | 5037  | 8004  | 23899  | 3 | 22 | 23 | 21 | 33 | 25 |
| 4           | 7516 | 5499  | 5590  | 5765  | 24370  | 4 | 31 | 23 | 23 | 24 | 25 |
| $\sqrt{7}$  | 1    | 2     | 3     | 4     | 123928 | % | 1  | 2  | 3  | 4  |    |
| 1           | 4761 | 7215  | 6546  | 5509  | 24031  | 1 | 20 | 30 | 27 | 23 | 25 |
| 2           | 5953 | 4742  | 6885  | 6700  | 24280  | 2 | 25 | 20 | 28 | 28 | 25 |
| 3           | 6020 | 6076  | 4821  | 7233  | 24150  | 3 | 25 | 25 | 20 | 30 | 25 |
| 4           | 7297 | 6246  | 5898  | 4836  | 24277  | 4 | 30 | 26 | 24 | 20 | 25 |
| $\sqrt{11}$ | 1    | 2     | 3     | 4     | 96592  | % | 1  | 2  | 3  | 4  |    |
| 1           | 4649 | 6959  | 6543  | 5711  | 23862  | 1 | 19 | 29 | 27 | 24 | 25 |
| 2           | 5917 | 4695  | 6650  | 6759  | 24021  | 2 | 25 | 20 | 28 | 28 | 25 |
| 3           | 6161 | 6082  | 4808  | 7101  | 24152  | 3 | 26 | 25 | 20 | 29 | 25 |
| 4           | 7135 | 6284  | 6152  | 4984  | 24555  | 4 | 29 | 26 | 25 | 20 | 25 |
| $\sqrt{13}$ | 1    | 2     | 3     | 4     | 96506  | % | 1  | 2  | 3  | 4  |    |
| 1           | 5445 | 7019  | 6177  | 5450  | 24091  | 1 | 23 | 29 | 26 | 23 | 25 |
| 2           | 6010 | 5352  | 6514  | 6369  | 24245  | 2 | 25 | 22 | 27 | 26 | 25 |
| 3           | 5676 | 6097  | 5245  | 6940  | 23958  | 3 | 24 | 25 | 22 | 29 | 25 |
| 4           | 6960 | 5776  | 6022  | 5452  | 24210  | 4 | 29 | 24 | 25 | 23 | 25 |
| $\infty$    | 1    | 2     | 3     | 4     | 102205 | % | 1  | 2  | 3  | 4  |    |
| 1           | 0    | 0     | 0     | 0     | 0      | 1 | —  | —  | —  | —  | —  |
| 2           | 0    | 9435  | 11528 | 12925 | 33888  | 2 | —  | 28 | 34 | 38 | 33 |
| 3           | 0    | 13128 | 9382  | 11700 | 34210  | 3 | —  | 38 | 27 | 34 | 33 |
| 4           | 0    | 11324 | 13300 | 9480  | 34104  | 4 | —  | 33 | 39 | 28 | 33 |



表 5  $\omega = \sqrt{2}$ , modulo  $5 + 4\sqrt{2}$ ,  $\delta(\xi) \leq 2 \times 10^6$ 

| $\sqrt{2}$ | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6    | 252694 | % | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |    |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 1          | 2855  | 5050  | 9134  | 8419  | 8322  | 8307 | 42087  | 1 | 7  | 12 | 22 | 20 | 20 | 20 | 17 |
| 2          | 10647 | 2979  | 4299  | 8305  | 7491  | 8411 | 42132  | 2 | 25 | 7  | 10 | 20 | 18 | 20 | 17 |
| 3          | 6340  | 11605 | 2789  | 4442  | 8372  | 8582 | 42130  | 3 | 15 | 28 | 7  | 11 | 20 | 20 | 17 |
| 4          | 7592  | 7140  | 11260 | 2743  | 4345  | 9016 | 42096  | 4 | 18 | 17 | 27 | 7  | 10 | 21 | 17 |
| 5          | 7202  | 8143  | 7099  | 11780 | 2915  | 4982 | 42121  | 5 | 17 | 19 | 17 | 28 | 7  | 12 | 17 |
| 6          | 7457  | 7216  | 7548  | 6408  | 10677 | 2793 | 42099  | 6 | 18 | 17 | 18 | 15 | 25 | 7  | 17 |

  

| $\sqrt{3}$ | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 129625 | % | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |    |
|------------|------|------|------|------|------|------|--------|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 1          | 2509 | 3151 | 4022 | 3600 | 4357 | 3978 | 21617  | 1 | 12 | 15 | 19 | 17 | 20 | 18 | 17 |
| 2          | 4486 | 2311 | 3037 | 3880 | 3279 | 4364 | 21357  | 2 | 21 | 11 | 14 | 18 | 15 | 20 | 16 |
| 3          | 3593 | 4815 | 2454 | 3276 | 3998 | 3716 | 21852  | 3 | 16 | 22 | 11 | 15 | 18 | 17 | 17 |
| 4          | 4003 | 3577 | 4625 | 2366 | 3028 | 3891 | 21490  | 4 | 19 | 17 | 22 | 11 | 14 | 18 | 17 |
| 5          | 3285 | 4183 | 3605 | 4787 | 2418 | 3344 | 21622  | 5 | 15 | 19 | 17 | 22 | 11 | 15 | 17 |
| 6          | 3741 | 3319 | 4110 | 3581 | 4542 | 2391 | 21684  | 6 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 11 | 17 |

  

| $\sqrt{5}$ | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 125536 | % | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |    |
|------------|------|------|------|------|------|------|--------|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 1          | 2494 | 3328 | 3398 | 3258 | 4310 | 4290 | 21078  | 1 | 12 | 16 | 16 | 15 | 20 | 20 | 17 |
| 2          | 4523 | 2405 | 3189 | 3607 | 2958 | 4184 | 20866  | 2 | 22 | 12 | 15 | 17 | 14 | 20 | 17 |
| 3          | 3835 | 4624 | 2369 | 3355 | 3636 | 3223 | 21042  | 3 | 18 | 22 | 11 | 16 | 17 | 15 | 17 |
| 4          | 3990 | 3518 | 4423 | 2328 | 2968 | 3503 | 20730  | 4 | 19 | 17 | 21 | 11 | 14 | 17 | 17 |
| 5          | 2886 | 4107 | 3622 | 4525 | 2447 | 3318 | 20905  | 5 | 14 | 20 | 17 | 22 | 12 | 16 | 17 |
| 6          | 3351 | 2884 | 4041 | 3657 | 4586 | 2393 | 20912  | 6 | 16 | 14 | 19 | 17 | 22 | 11 | 17 |

  

| $\sqrt{7}$ | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 123928 | % | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |    |
|------------|------|------|------|------|------|------|--------|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 1          | 3134 | 3443 | 2986 | 2564 | 4096 | 4404 | 20627  | 1 | 15 | 17 | 14 | 12 | 20 | 21 | 17 |
| 2          | 5157 | 2943 | 2989 | 3006 | 2419 | 4286 | 20800  | 2 | 25 | 14 | 14 | 14 | 12 | 21 | 17 |
| 3          | 3936 | 5247 | 2633 | 3062 | 3047 | 2518 | 20443  | 3 | 19 | 26 | 13 | 15 | 15 | 12 | 16 |
| 4          | 3564 | 3660 | 4721 | 2740 | 3082 | 2960 | 20727  | 4 | 17 | 18 | 23 | 13 | 15 | 14 | 17 |
| 5          | 2036 | 3540 | 3580 | 5255 | 2825 | 3405 | 20641  | 5 | 10 | 17 | 17 | 25 | 14 | 16 | 17 |
| 6          | 2800 | 1967 | 3534 | 4100 | 5173 | 3113 | 20687  | 6 | 14 | 10 | 17 | 20 | 25 | 15 | 17 |

  

| $\infty$ | 1 | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 137965 | % | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |    |
|----------|---|------|------|------|------|------|--------|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 1        | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 1 | — | —  | —  | —  | —  | —  | —  |
| 2        | 0 | 3355 | 5412 | 7976 | 4336 | 6435 | 27514  | 2 | — | 12 | 20 | 29 | 16 | 23 | 20 |
| 3        | 0 | 6379 | 3378 | 5331 | 8095 | 4538 | 27721  | 3 | — | 23 | 12 | 19 | 29 | 16 | 20 |
| 4        | 0 | 4398 | 6585 | 3420 | 5296 | 7819 | 27518  | 4 | — | 16 | 24 | 12 | 19 | 28 | 20 |
| 5        | 0 | 7857 | 4388 | 6427 | 3460 | 5375 | 27507  | 5 | — | 29 | 16 | 23 | 13 | 20 | 20 |
| 6        | 0 | 5524 | 7958 | 4364 | 6320 | 3536 | 27702  | 6 | — | 20 | 29 | 16 | 23 | 13 | 20 |