

整多項式の計算の一形式

慶大工 山内二郎

電気試 戸田英雄

§1. まえおき

Brookhaven National Lab. における 一松 信氏からの御手紙 (NOT. 14. 1966) “.. 最近はじめて知つたのですが、 n 次多項式を計算するのに必ずしも n 回の乗法と n 回の加法を必要としない方法がある。.... 一例として $n=6$ のときをあげますと、...” にヒントを得て、一般に M 次の多項式のとき 2 次式を用いて計算回数を減らすこと問題にし、 $([\frac{M+1}{2}] + 1)$ 回の乗算と $(M+1)$ 回の加算で計算が出来るなどを 山内二郎 (慶大工) が示した。これを §2 で述べる。戸田英雄 (電気計算センター) が具体的に検討したが、これと §3 に述べる。

§2. 整多項式の計算

M 次の整多項式の計算には、一般に M 回の乗算を必要とす

る。2次式を用いて、この乗算回数を減らすことの問題とする。

M が偶数で $2N$ のとき 乗算 $N+1$ 回、加算 $2N+1$ 回

M が奇数で $2N+1$ のとき 乗算 $N+2$ 回、加算 $2N+2$ 回

一般に $([\frac{M+1}{2}] + 1)$ 回の乗算と $(M+1)$ 回の加算

とい得る。 M 次の項の係数が 1 ならば乗算回数は $[\frac{M+1}{2}]$ となる。

$$M \text{ が } 2N+1 \text{ のとき } f(x) = \sum_{i=0}^{2N+1} a_i x^{2N+1-i}$$

$$= a_0 x \sum_{i=0}^{2N} \frac{a_i}{a_0} x^{2N-i} + a_{2N+1}$$

" x "、 M が $2N$ のときの x のとつかえよ"の " x "、以下 $M=2N$ のときと計算する。

$$f(x) = a_0 \sum_{i=0}^{2N} \frac{a_i}{a_0} x^{2N-i}$$

$$P_1 = x(x+A)$$

$$P_2 = (P_1 + x + B_1)(P_1 + C_1)$$

$$P_3 = (P_2 + B_2)(P_1 + C_2)$$

...

$$P_k = (P_{k-1} + B_{k-1})(P_1 + C_{k-1})$$

...

$$P_N = (P_{N-1} + B_{N-1})(P_1 + C_{N-1})$$

$$f(x) = \alpha_0 (P_N + B_N)$$

として計算するに要計算回数 $N+1$, 加算回数 $2N+1$ である

$P_1 \neq P$ と記す。

$$x^2 = P - xA$$

$$x^2 = xP - PA + xA^2$$

$$x^{2n} = \sum_{i=0}^{n-1} P^{n-i} \binom{n-i+i}{2i} A^{2i} - \sum_{i=0}^{n-1} x P^{n-1-i} \binom{n+i}{2i+1} A^{2i+1}$$

$$x^{2n+1} = \sum_{i=0}^{n-1} x P^{n-i} \binom{n-i+i}{2i} A^{2i} - \sum_{i=0}^{n-1} (P^{n-i} - x P^{n-1-i} A) \binom{n+i}{2i+1} A^{2i+1}$$

$$= \sum_{i=0}^n x P^{n-i} \binom{n+i}{2i} A^{2i} - \sum_{i=0}^{n-1} P^{n-i} \binom{n+i}{2i+1} A^{2i+1}$$

$$x^{2n+2} = \sum_{i=0}^n P^{n+1-i} \binom{n+i}{2i} A^{2i} - \sum_{i=0}^n x P^{n-i} \binom{n+1+i}{2i+1} A^{2i+1}$$

で数学的帰納法で x^{2n}, x^{2n+1} は証明される。

$[C^j; h, k]$ は $C_h, C_{h+1}, C_{h+2}, \dots, C_{k-1}, C_k$ の j 個の積のうちから組合せの総和

$j = 0 \Rightarrow c_1 \neq 1, j > k-h+1 \Rightarrow c_1 \neq 0$

$$P_2 = (P + x + B_1)(P + C_1) = P^2 + xP + P(B_1 + C_1) + xC_1 + B_1C_1$$

$$\begin{aligned} P_3 = (P_2 + B_2)(P + C_2) &= P^3 + xP^2 + P^2(B_1 + C_1 + C_2) + xP(C_1 + C_2) \\ &\quad + P(B_1(C_1 + C_2) + C_1C_2) + xC_1C_2 + B_1C_1C_2 + B_2C_2 \end{aligned}$$

$$P_k = (P_{k-1} + B_{k-1})(P + C_{k-1})$$

$$P_2 = P^2 + xP + P(B_1 + [C'; 1, 1]) + x[C'; 1, 1] + B_1[C'; 1, 1]$$

$$\begin{aligned} P_3 = P^3 + xP^2 + P^2(B_1 + [C'; 1, 2]) + xP[C'; 1, 2] + P\{B_1, [C'; 1, 2] \\ + B_2 + [C^2; 1, 2]\} + x[C^2; 1, 2] + B_1[C^2; 1, 2] + B_2[C'; 2, 2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_4 = P^4 + xP^3 + P^3(B_1 + [C'; 1, 3]) + xP^2[C'; 1, 3] \\ + P^2\{B_1[C'; 1, 3] + B_2 + [C^2; 1, 3]\} + xP[C^2; 1, 3] \end{aligned}$$

$$+ P\{B_1[C^2; 1, 3] + B_2[C'; 2, 3] + B_3 + [C^3; 1, 3]\}$$

$$+ x[C^3; 1, 3] + \{B_1[C^3; 1, 3] + B_2[C^2; 2, 3] + B_3[C'; 3, 3]\}$$

$$P_k = \sum_{i=0}^{k-1} P^{k-i} \left\{ \sum_{j=1}^i B_j \cdot [C^{i-j}; j, k-1] + [C'; 1, k-1] \right\}$$

$$+ \sum_{i=0}^{k-1} xP^{k-1-i} [C^i; 1, k-1] + \sum_{j=1}^{k-1} B_j \cdot [C^{k-j}; j, k-1]$$

$$P_{k+1} = (P_k + B_k)(P + C_k)$$

$$= \sum_{i=0}^{k-1} P^{k+1-i} \left\{ \sum_{j=1}^i B_j \cdot [C^{i-j}; j, k-1] + [C'; 1, k-1] \right\}$$

$$+ \sum_{i=1}^k P^{k+1-i} C_k \left\{ \sum_{j=1}^{i-1} B_j \cdot [C^{i-1-j}; j, k-1] + [C^{i-1}; 1, k-1] \right\}$$

$$\begin{aligned}
& + \sum_{i=0}^{k-1} x P^{k-i} [C^i; i, k-1] + \sum_{i=0}^k x P^{k-i} C_k [C^{k-1}; i, k-1] \\
& + P \sum_{j=1}^{k-1} B_j [C^{k-j}; j, k-1] + PB_k \\
& + \sum_{j=1}^{k-1} B_j C_k [C^{k-j}; j, k-1] + B_k C_k
\end{aligned}$$

$$[C^{k-j}; j, k-1] + C_k [C^{k-1}; j, k-1] = [C^{k-1}; j, k]$$

$$[C^i; i, k-1] + C_k [C^{k-1}; i, k-1] = [C^i; i, k]$$

$$\begin{aligned}
P_{k+1} &= \sum_{i=0}^k P^{k+i-i} \left\{ \sum_{j=1}^i B_j [C^{k-j}; j, k] + [C^i; i, k] \right\} \\
& + \sum_{i=0}^k x P^{k-i} [C^i; i, k] + \sum_{j=1}^k B_j [C^{k+1-j}; j, k]
\end{aligned}$$

∴ Q.E.D.

$$\begin{aligned}
P_N &= \sum_{i=0}^{N-1} P^{N-i} \left\{ \sum_{j=1}^i B_j [C^{N-j}; j, N-1] + [C^i; i, N-1] \right\} \\
& + \sum_{i=0}^{N-1} x P^{N-1-i} [C^i; i, N-1] + \sum_{j=1}^{N-1} B_j [C^{N-j}; j, N-1]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{2N} \frac{a_i}{a_0} x^{2N-i} &= \sum_{k=0}^{N-1} \frac{a_{2k}}{a_0} x^{2N-2k} + \sum_{k=0}^{N-1} \frac{a_{2k+1}}{a_0} x^{2N-1-2k} + \frac{a_{2N}}{a_0} \\
&= \sum_{k=0}^{N-1} \frac{a_{2k}}{a_0} \left\{ \sum_{i=0}^{N-1-k} P^{N-k-i} \binom{N-1-k+i}{2i} A^{2i} - \sum_{i=0}^{N-1-k} x P^{N-1-k-i} \binom{N-k+i}{2i+1} A^{2i+1} \right\} \\
& + \sum_{k=0}^{N-1} \frac{a_{2k+1}}{a_0} \left\{ \sum_{i=0}^{N-1-k} x P^{N-1-k-i} \binom{N-1-k+i}{2i} A^{2i} - \sum_{i=0}^{N-2-k} P^{N-1-k-i} \binom{N-1-k+i}{2i+1} A^{2i+1} \right\} \\
& + \frac{a_{2N}}{a_0}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{2N} \frac{a_i}{a_0} x^{2N-i} &= \sum_{i=0}^{N-1} P^{N-i} \sum_{j=0}^{2N-i} (-)^j \frac{a_{2i-j}}{a_0} \binom{N-1-i+j}{j} A^j + \sum_{i=0}^{N-1} x P^{N-1-i} \\
& \cdot \sum_{j=0}^{2N-i} (-)^j \frac{a_{2i+1-j}}{a_0} \binom{N-1-i+j}{j} A^j + \frac{a_{2N}}{a_0}
\end{aligned}$$

$$= \sum_{i=0}^{N-1} P^{N-i} K_{2i} + \sum_{i=0}^{N-1} x P^{N-1-i} K_{2i+1} + K_{2N} = P_N + B_N$$

$$K_{2i} = \sum_{j=0}^i (-)^j \frac{a_{2i-j}}{a_0} \binom{N-1-i+j}{j} A^j = \sum_{j=0}^i B_j [C^{i-j}; j, N-1] + [C^i; i, N-1] \quad (0 \leq i \leq N-1)$$

$$K_{2i+1} = \sum_{j=0}^{i+1} (-)^j \frac{a_{2i+1-j}}{a_0} \binom{N-1-i+j}{j} A^j = [C^i; i, N-1] \quad (0 \leq i \leq N-1)$$

$$K_{2N} = \frac{a_{2N}}{a_0} = \sum_{j=0}^N B_j [C^{N-j}; j, N-1]$$

$$K_D = 1$$

$$K_1 = \frac{a_1}{a_0} - (N)_1 A = 1 \rightarrow A = \frac{1}{N} \left(\frac{a_1}{a_0} - 1 \right), \quad \frac{a_1}{a_0} = 1 + (N)_1 A$$

$$K_2 = \sum_{j=0}^2 (-)^j \frac{a_{2j}}{a_0} \binom{N-2+j}{j} A^j = \frac{a_2}{a_0} - (N-1)_2 A (1 + (N)_1 A) + (N)_2 A$$

$$= \frac{a_2}{a_0} - (N-1)_2 A - (N)_2 A^2 = \frac{a_2}{a_0} + (N-1)_2 A - (N)_2 A (1 + A)$$

$$K_3 = \sum_{j=0}^3 (-)^j \frac{a_{2j}}{a_0} \binom{N-2+j}{j} A^j$$

$$= \frac{a_3}{a_0} - (N-1)_3 A \{ K_2 + (N-1)_2 A + (N)_2 A^2 \} + (N)_3 A^2 \{ 1 + (N)_1 A \} - (N+1)_3 A^3$$

$$= \frac{a_3}{a_0} - K_2 A (N-1)_1 + A^2 \{ (-N+1)(N-1)_1 + (-N+1)_2 \} + A^3 \{ (-N+1)(N)_2 + (-N+1)_3 \}$$

$$+ (-N+1)_3 \}$$

$$= \frac{a_3}{a_0} - K_2 A (N-1)_1 - A^2 (N-1)_2 - A^3 (N)_3$$

$$= \frac{a_3}{a_0} - K_2 A (N-1)_1 + A^2 (N-1)_3 - (N)_3 A^2 (1 + A)$$

$$K_{2i} = \frac{a_{2i}}{a_0} - \sum_{j=1}^i K_{2i-2j} A^{2j} \binom{N-1-i+j}{2j} - \sum_{j=1}^i K_{2i-2j+1} A^{2j-1} \binom{N-1-i+j}{2j-1}$$

$$K_{2i+1} = \frac{a_{2i+1}}{a_0} - \sum_{j=1}^{i+1} K_{2i+1-2j} A^{2j} \binom{N-1-i+j}{2j} - \sum_{j=1}^{i+1} K_{2i+2-2j} A^{2j-1} \binom{N-1-i+j}{2j-1}$$

$$K_{2i+2} = \sum_{k=0}^{i+1} \frac{a_{2i+2-2k}}{a_0} \binom{N-2-i+2k}{2k} A^{2k} - \sum_{k=1}^{i+1} \frac{a_{2i+2-2k+1}}{a_0} \binom{N-2-i+2k-1}{2k-1} A^{2k-1}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{A_{2c+2}}{2} + \sum_{k=1}^{c+1} \binom{N-2-c+2k}{2k} A^{2k} \left\{ \sum_{j=0}^{c+1-k} K_{2c+2-2k-2j} A^{2j} \binom{N-c-1+k+j}{2j} \right. \\
&\quad \left. + \sum_{j=1}^{c+1-k} K_{2c+2-2k+1-2j} A^{2j-1} \binom{N-1-c-1+k+j}{2j-1} \right\} \\
&- \sum_{k=1}^{c+1} \binom{N-2-c+2k-1}{2k-1} A^{2k-1} \left\{ \sum_{j=0}^{c+1-k} K_{2c+2-2k+1-2j} A^{2j} \binom{N-c-1+k+j}{2j} \right. \\
&\quad \left. + \sum_{j=1}^{c+1-k} K_{2c+2-2k+2-2j} A^{2j-1} \binom{N-1-c-1+k+j}{2j-1} \right\}
\end{aligned}$$

この式は $K_{2c+2-2k} A^{2k}$ の係数

$$\begin{aligned}
&= \sum_{j=0}^{k-1} \binom{N-2-c+2k-2j}{2k-2j} \binom{N-1-c+k}{2j} - \sum_{j=1}^k \binom{N-2-c+2k-2j+1}{2k-2j+1} \binom{N-1-c+k}{2j-1} \\
&= \sum_{j=0}^{2k-1} \binom{-N+1+c}{2k-1-j} \binom{N-1-c+k}{j} = - \binom{N-1-c+k}{2k}
\end{aligned}$$

$K_{2c+2-2k+1} A^{2k-1}$ の係数

$$\begin{aligned}
&= \sum_{j=1}^{k-1} \binom{N-2-c+2k-2j}{2k-2j} \binom{N-2-c+k}{2j-1} - \sum_{j=0}^{k-1} \binom{N-2-c+2k-2j-1}{2k-2j-1} \binom{N-2-c+k}{2j} \\
&= \sum_{j=0}^{2k-2} \binom{-N+1+c}{2k-1-j} \binom{N-2-c+k}{j} = - \binom{N-2-c+k}{2k-1}
\end{aligned}$$

A^{2k+2} の係数

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=1}^{c+1} \binom{N-2-c+2k}{2k} \binom{N}{2c+2-2k} - \sum_{k=1}^{c+1} \binom{N-2-c+2k-1}{2k-1} \binom{N}{2c+2-2k+1} \\
&= \sum_{k=1}^{2c+2} \binom{-N+1+c}{k} \binom{N}{2c+2-k} = - \binom{N}{2c+2}
\end{aligned}$$

K_{2c+3} は ∞ でない全の項を合計算によつて K_{2c+1} である

以上より証明する。Q.E.D.

K_{2c}, K_{2c+1} は $c > 1$

$$\begin{aligned}
K_{2c} &= \frac{A_{2c}}{2} - \sum_{j=1}^{c-1} K_{2c-2j} A^{2j} \binom{N-c+j}{2j} - \sum_{j=c}^{c-1} K_{2c-2j+1} A^{2j-1} \binom{N-1-c+j}{2j-1} \\
&\quad + A^{2c-1} \left(\frac{N-1}{2c} \right) - A^{2c-1} \left(1 + A + \left(\frac{N}{2c} \right) \right)
\end{aligned}$$

$$K_{2c+1} = \frac{a_{2c+1}}{a_0} - \sum_{j=1}^{c-1} K_{2c+1-2j} A^{2j} \binom{N-1-c+j}{2j} - \sum_{j=1}^c K_{2c+2-2j} A^{2j-1} \binom{N-1-c+j}{2j-1} \\ + A^{2c} \binom{N-1}{2c+1} - A^{2c} (1+A) \binom{N}{2c+1}$$

$$\text{ただし } K_{2N-1} = \frac{a_{2N-1}}{a_0} - A K_{2N-2}$$

$$K_{2N-2} = \frac{a_{2N-2}}{a_0} - A \{ K_{2N-3} + A K_{2N-4} \}$$

$$K_{2N-3} = \frac{a_{2N-3}}{a_0} - A \{ 2K_{2N-4} + A(K_{2N-5} + AK_{2N-6}) \} \quad (N > 3)$$

$$\sum_{i=0}^c K_{2i+1} = [C^i; i, N-1] \quad (0 \leq i \leq N-1) \quad \text{となるべき}$$

$$(C_1, C_2, \dots, C_{N-1}) \text{ は } \sum_{i=0}^{N-1} - B^{N-i} K_3 + B^{N-3} K_5 - \dots + (-1)^{N-1} K_{2N-1} = 0$$

の観察から次式が成り立つ。 $[C^{i-1}; j, N-1]$ で左端を除く。

$$B_i = K_2 = B_1 + [C^i; i, N-1] \quad i = 1, 2, \dots, B_1 = K_2 - K_3$$

$$K_4 = B_2 + B_1 [C^1; 1, N-1] + [C^2; 1, N-1] \quad i = 3, 4, \dots$$

$$B_2 = K_4 - B_1 K_3 - K_5$$

$$B_1, B_2, \dots, B_{N-1} \text{ が順次求まること}$$

$$B_i = \frac{a_{2i}}{a_0} - \sum_{j=1}^{i-1} B_j [C^{i-1}; j, N-1] - K_{2i+1} \quad i = 3, 4, \dots, B_N \text{ が求まること}$$

$$\text{最後に } B_N = \frac{a_{2N}}{a_0} - \sum_{j=1}^{N-1} B_j [C^{N-1}; j, N-1]$$

$$\boxed{M=6 \quad (N=3)}$$

$$A = \frac{1}{3} \left(\frac{a_1}{a_0} - 1 \right)$$

$$K_2 = \frac{a_2}{a_0} + A - 3 \overline{A(1+A)}$$

$$K_3 = \frac{a_3}{a_0} - A \{ 2K_2 + \overline{A(1+A)} \}$$

$$K_4 = \frac{a_4}{a_0} - A \{ K_3 + AK_2 \}$$

$$K_5 = \frac{a_5}{a_0} - AK_4$$

$$\underline{z}^2 - \underline{B} K_3 + K_5 = 0 \rightarrow (C_1, C_2)$$

$$B_1 = K_2 - K_3$$

$$B_2 = K_4 - B_1 K_3 - K_4$$

$$B_3 = \frac{a_6}{a_0} - B_1 K_5 - B_2 C_2$$

$$P_1 = x(x+A)$$

$$P_2 = (P_1 + x + B_1)(P_1 + C_1)$$

$$P_3 = (P_2 + B_2)(P_1 + C_2)$$

$$f(x) = a_0(P_3 + B_3)$$

M=7

$$f(x) = a_0 x (P_3 + B_3) + a_7$$

$$M = 8 \quad (N = 4) \quad A = \frac{1}{4} \left(\frac{a_1}{a_0} - 1 \right)$$

$$K_2 = \frac{a_2}{a_0} + 3A - 6\overline{A(1+A)}$$

$$K_3 = \frac{a_3}{a_0} - A \left\{ 3K_2 - A + 4\overline{A(1+A)} \right\}$$

$$K_4 = \frac{a_4}{a_0} - A \left\{ 2K_3 - A + 4\overline{A(1+A)} \right\}$$

$$K_5 = \frac{a_5}{a_0} - A \left\{ 2K_4 + A(K_3 + AK_2) \right\}$$

$$K_6 = \frac{a_6}{a_0} - A \left\{ K_5 + AK_4 \right\}$$

$$K_7 = \frac{a_7}{a_0} - AK_6$$

$$\underline{z}^3 - \underline{B}^2 K_3 + \underline{B} K_5 - K_7 = 0 \rightarrow (C_1, C_2, C_3)$$

$$B_1 = K_2 - K_3$$

$$B_2 = K_4 - B_1 K_3 - K_5$$

$$B_3 = K_6 - B_1 K_5 - B_2 (C_2 + C_3) - K_7$$

$$\beta_4 = \frac{a_8}{a_0} - B_1 K_7 - B_2 C_2 C_3 - B_3 C_3$$

$$P_1 = x(z+A)$$

$$P_2 = (P_1 + x + B_1)(P_1 + C_1)$$

$$P_3 = (P_2 + B_2)(P_1 + C_2)$$

$$P_4 = (P_3 + B_3)(P_1 + C_3)$$

$$f(x) = a_0 (P_4 + B_4)$$

$M=9$ $M=10$ $M=11$ の公式は山外は出でてないが省略する

§3. 数値例

$M=6$

$$\tan^{-1} x = x \sum_{i=1}^6 D_{2i+1} y^i, \quad y = x^2 \text{ とよく。}$$

$|x| \leq 0.5$ の minmax error = 0.53×10^{-10} , $z = z''$

$$D_1 = .9999999984, \quad D_3 = -.33333330874, \quad$$

$$D_5 = .1999890382, \quad D_7 = -.1426400715, \quad$$

$$D_9 = -.1088701065, \quad D_{11} = -.7810964670 E-01, \quad$$

$$D_{13} = .3658906466 E-01, \quad$$

の場合：

$$A = -.10449271 E+01, \quad A_0 = D_{13}, \quad$$

$$B_1 = -.18988476 E+01, \quad$$

$$B_2 = -.91647570 E+01, \quad$$

$$B_3 = -.60003811 E+02, \quad$$

$$C_1 = -23040.06 \times 10^{-1}, \quad C_2 = -24131.97 \times 10^{-1}$$

$$y = x^2$$

$$P_1 = y + A$$

$$P_2 = (P_1 + y + B_1) - (P_1 + C_1)$$

$$P_3 = (P_2 + B_2) - (P_1 + C_2)$$

$$\tan^{-1} x = A_0 + (P_3 + B_3) \cdot x \quad \text{min max error} = .7 \times 10^{-8}$$

M=6

$$\frac{1}{\sqrt{2}} z^x = \sum_{i=0}^6 D_i x^i \quad |x| \leq 0.5 \quad \text{min max error} = .13 \times 10^{-8}$$

$$z = z^x$$

$$D_0 = -70710.67816, \quad D_1 = -49012.90895$$

$$D_2 = -16986.57652, \quad D_3 = -39246.75116 \times 10^{-1}$$

$$D_4 = -68012.98766 \times 10^{-2}, \quad D_5 = -94751.82234 \times 10^{-3}$$

$$D_6 = -10851.12780 \times 10^{-3}$$

適合：

$$A = .25773.265 \times 10^{-1}, \quad A_0 = D_6$$

$$B_1 = -.10653.185 \times 10^{-3}$$

$$B_2 = -.14215.125 \times 10^{-5}$$

$$B_3 = -.32148.840 \times 10^{-4}$$

$$C_1 = .12783.041 \times 10^{-3}, \quad C_2 = .16297.222 \times 10^{-2}$$

$$\Delta \text{ of } M=6 \text{ 为 } 2^{\circ} \text{ 以便 } i=3. \quad \text{min max error} = .7 \times 10^{-6}$$

比方说