

有理函数による近似問題における

構成的方法について

茨城大 理 荷見守助

§1. 序

有理函数による近似の問題についての A.G. Vitushkin の結果に關聯した二つの事柄を述べる。第一に Vitushkin の定理の中で基本的と看做されるものの証明の概略と、その方法の应用としての Gamelin-Garnett の定理を説明する。その証明法が所謂構成的と呼ばれるものである。第二にこの方法を解明する一つの試みを述べるが、これは完結したものではない。有理函数による近似の問題では多くの興味ある結果が知られてゐるが、それらについては既に貴志氏[4]、山下氏[7]の詳しい報告があるのでこゝでは触れない。

§2. Vitushkin の定理

複素平面 C 上の compact 集合 X に対し、 $C(X)$ の部分空間 $A(X), R(X)$ を次の如く定義する： $A(X)$ は X の内部 X° で正則な

函数の全体； $R(x)$ は X 上には極を持たない有理函数で一様近似出来る函数の全体。又 C 上の有界な開集合 \bar{U} に対し $A(\bar{U})$ のことを $A(U)$ とも書く。本稿で述べる近似問題は、 $A(x) = R(x)$ なる x を特徴付けることである。

S を C の部分集合、 m を正数とする。この時、(i) f は S の或 compact 部分集合 K_f の外で一価正則、(ii) $f(\infty) = 0$ 、(iii) $\|f\|_{CK_f} \leq m$, を満足する f の全体を $A(S, m)$; (i') $f \in C(S^2)$ (但し S^2 は Riemann 球面), (ii') $\|f\| \leq m$, (iii') $f \in A(S, m)$ を満足する f の全体を $C(S, m)$ で表す。 $f \in A(S, m)$ のとき、

$$\gamma(S, f) = (2\pi i)^{-1} \int_{\partial S} f(z) dz \quad (= \lim_{z \rightarrow \infty} z f(z))$$

とおく。 ∂S は、 K_f の全ての点のまわりの回転数が 1 であるやうな任意の contour を表すとする。そして

$$\gamma(S) = \sup \{ |\gamma(S, f)| : f \in A(S, 1) \}, \alpha(S) = \sup \{ |\gamma(S, f)| : f \in C(S, 1) \}$$

を夫々 S の解析的容量、AC 容量と呼ぶ。たゞ、Vitushkin の定理と呼ばれるものの中で、基本的なのは次のものである：

定理 1 C 上の compact 集合 X に対し次は同値である：

(a) $A(X) = R(X);$

(b) 任意の有界開集合 G に対して、 $\alpha(CX \cap G) = \alpha(CX^\circ \cap G);$

(c) 任意の開円板 D に対し、 $\alpha(CX \cap D) = \alpha(CX^\circ \cap D);$

(d) 任意の $z \in CX$ に対し、 $\alpha(CX \cap \Delta(z; \delta)) < +\infty$

なるものが存在する。但し $\Delta(z; \delta)$ は中心 z 、半径 δ の開円板。

(e) 任意の $z \in \mathbb{C}$ と $\delta > 0$ に対し、 $\alpha(CX^0 \wedge \Delta(z, \delta)) \leq m\alpha(CX \cap \Delta(z, \pi\delta))$ を満足するやうな $n \geq 1$ と $m \geq 0$ が存在する。

§§3～7 で (a) \Rightarrow (c), (e) \Rightarrow (a) の証明は \Rightarrow と述べる。他は理論的な意味が少ないと思われる所以省略する。

§3. 非正則点の分割、作用素 T_φ 。

$\{\varphi_k\}$ を C^∞ 級の 1 の分割とすれば、 $f \in C_0^1(\mathbb{C})$ に対し

$$\begin{aligned} f(\xi) &= (2\pi i)^{-1} \int \frac{f_{\bar{z}}}{z-\xi} dz \wedge d\bar{z} = (2\pi i)^{-1} \int \frac{f_{\bar{z}}}{z-\xi} \sum_k \varphi_k dz \wedge d\bar{z} \\ &= \sum_k [\varphi_k(\xi) f(\xi) - (2\pi i)^{-1} \int \frac{f(z)}{z-\xi} (\varphi_k)_{\bar{z}} dz \wedge d\bar{z}] \\ &= - \sum_k (2\pi i)^{-1} \int \frac{f(z) - f(\xi)}{z-\xi} (\varphi_k)_{\bar{z}} dz \wedge d\bar{z}. \end{aligned}$$

$\xi = z^*$ 、一般に $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{C})$ に対し、作用素 T_φ を

$$\begin{aligned} (1) \quad (T_\varphi f)(\xi) &= - (2\pi i)^{-1} \int \frac{f(z) - f(\xi)}{z-\xi} \varphi_{\bar{z}} dz \wedge d\bar{z} \\ &= \varphi(\xi) f(\xi) - (2\pi i)^{-1} \int \frac{f(z)}{z-\xi} \varphi_{\bar{z}} dz \wedge d\bar{z} \end{aligned}$$

と定義する。(1) は f が局所可積分であれば意味を持つ。更に f が有界な台を持つ時は、1 の分割 $\{\varphi_k\}$ に対して

$$(2) \quad f = \sum_k T_{\varphi_k} f.$$

補題 1 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{C})$ ($C_0^1(\mathbb{C})$ もよい) の台を K 、 f を有界可測とするには、次の性質がある。

(i) $T_\varphi f$ は可測であつて、

$$\|T_\varphi f\|_\infty \leq 2 \operatorname{diam}(K) \|\frac{\partial \varphi}{\partial z}\|_\infty \sup_{z, \xi \in K} |f(z) - f(\xi)| \leq 4 \operatorname{diam}(K) \|\frac{\partial \varphi}{\partial z}\|_\infty \|f\|_K.$$

(ii) $T_\varphi f$ は C_K で正則であり、且 $(T_\varphi f)(\infty) = 0$.

(iii) $T_\varphi f$ は f の連続点で連続、 f の正則点で正則である。

(iv) $f - T_\varphi f$ は $\varphi^{-1}(1)$ の内点で正則である。

これによれば、 $T_\varphi f$ の非正則点は、 f の非正則点の集合とその台の共通部分に含まれるから、(2) は f の非正則点を分割し $T_\varphi f$ にない 3 が、これが Vitushkin の構成的方法の第一歩である。但し後の評価の都合から、1 の分割を次のやうに作る。

補題 2. 任意の $\delta > 0$ に対し次のやうな 1 の分割が存在する：

(i) $\varphi_{k,\delta} \in C_0^\infty(\mathbb{C})$, $0 \leq \varphi_{k,\delta} \leq 1$, $\sum_k \varphi_{k,\delta} = 1$;

(ii) $\varphi_{k,\delta}$ の台は $\Delta(z_{k,\delta}, \delta)$ に含まれる；

(iii) $\|\partial \varphi_{k,\delta} / \partial z\|_\infty \leq 1/\delta$. (但し入は絶対定数)

(iv) 任意の $z \in \mathbb{C}$ に対し、 z を含む内核 $\Delta(z_{k,\delta}; \delta)$ の個数は高々 M である。但し M も絶対定数である。

証明は簡単である。（[1], [6]，又は [8] を参照されるとよい）

§4. (a) と (b) の証明：局所化の原理。

この部分の証明の核心は Bishop の局所化定理である。即ち

補題 3. $f \in C(X)$ とする。任意の $z \in X$ に対し、 z の閉近傍 K_z で $f|_{X \cap K_z} \in R(X \cap K_z)$ なるものがあれば、 $f \in R(X)$.

証明は [4] 又は [8] .

(a) \Rightarrow (b) の証明: 任意の $\varepsilon > 0$ に対し $f \in C(CX^{\circ} \cap G, 1)$ を $\alpha(CX^{\circ} \cap G)$ $- \varepsilon \leq |\gamma(CX^{\circ} \cap G, f)|$ であるやうに取る. f は $CX^{\circ} \cap G$ の或 compact 部分集合 K_f の外で正則であるから, f は CG の近傍で正則である. 又 $f|_X \in A(X) = R(X)$ は明かであるから, 補題 3 により $f \in R(X \cup CG)$. 従で $\forall \varepsilon' > 0$ に対し, $X \cup CG$ の外に極を持つ有理函数 g で $\|f - g\|_{X \cup CG} < \varepsilon'$ なるものが存在する. 之は g を $X \cup CG$ の或近傍の外で変化させ, $g \in C(S^1)$ 且 $\|g\| < 1 + \varepsilon'$ のやうに出来る. この新しい g に対しては, $|\gamma(CX \cap G, g)| \leq (1 + \varepsilon') \alpha(CX \cap G)$. $\varepsilon' \rightarrow 0$ とすると. $\gamma(CX \cap G, g) \rightarrow \gamma(CX \cap G, f)$ であるから、單に $\varepsilon \rightarrow 0$ とし $\alpha(CX^{\circ} \cap G) \leq \alpha(CX \cap G)$ を得る. 逆の不等式は明かであるから, (b) が示された.

§ 5. (e) \Rightarrow (a) の証明: Vitushkin の構成法.

Runge の定理によれば、証明すべきことは、 $\forall f \in A(X)$ と $\forall \varepsilon > 0$ に対し、 X の近傍で正則な g で $\|f - g\|_X < \varepsilon$ を満足するものが存在を示すことである. このための Vitushkin の論法は次の三段階に分れる. 先に f を $C_0(\mathbb{C})$ の函数に延長しておく.

I. f の非正則点の分割.

$\delta > 0$ を任意に取り、補題 2 の 1 の分割 $\varphi_{k,\delta}$ を用ひて

$$(3) \quad f = \sum_k f_{k,\delta}, \quad f_{k,\delta} = T_{\varphi_{k,\delta}} f,$$

と書く、補題1によれば、 $f_{k,\delta}$ は S^2 上で連続、 $f_{k,\delta}(\infty) = 0$,

$X^\circ \cup C[\text{supp } \varphi_{k,\delta}]$ ($\cong X^\circ \cup \Delta(z_{k,\delta}; \delta)$) で正則である。

II. $f_{k,\delta}$ の近似函数の構成.

補題1によれば、 $\|f_{k,\delta}\|_\infty \leq 4\lambda\omega_f(2\delta)$ (但し $\omega_f(2\delta)$ は f の連続度を表す) であるから、 $f_{k,\delta} \in C(CX^\circ \cap \Delta(z_{k,\delta}; \delta), 4\lambda\omega_f(2\delta))$ であるが、条件(e)を用ひれば、

$$(4) \quad f_{k,\delta}(\xi) - g_{k,\delta}(\xi) = O(|\xi|^{-3}) \quad (|\xi| \rightarrow \infty)$$

すなはち $g_{k,\delta} \in C(CX \cap \Delta(z_{k,\delta}; (2n+1)\delta), \ell\omega_f(2\delta))$ (但し ℓ は $m+n$ の半 (によつて決まる整数) が存在するとして假定).

III. 近似度の評価.

$$(5) \quad \|f_{k,\delta} - g_{k,\delta}\| \leq (4\lambda + \ell) \omega_f(2\delta)$$

は明らかである。簡単のために、右辺の量を $\omega(\delta)$ と書くと
にすれば、(4), (5)と最大値の原理から、 $|z - z_{k,\delta}| \geq (2n+1)\delta$ のとき、 $|(\xi - z_{k,\delta})^3(f_{k,\delta}(z) - g_{k,\delta}(z))| \leq (2n+1)^3 \delta^3 \omega(\delta)$ が成立つから、(5)はより次の式が至る處で成立つ:

$$(6) \quad |f_{k,\delta}(z) - g_{k,\delta}(z)| \leq (2n+1)^3 \delta^3 \omega(\delta) |\xi - z_{k,\delta}|^{-3}$$

補題4. 任意に $z \in C$ を固定する時、 $A_n = \{\xi : |\xi - z| = n\delta\}$ とすれば $\Delta(z_{k,\delta}; \delta)$ の個数 $N(n)$ は qnM を越えず。

さて、 $z \in C$ を任意に固定する。この時、 $f_{k,\delta}, g_{k,\delta}$ の番号 k を次の要領で double index (m, j) に表す: $\Delta(z_{k,\delta}; \delta)$ が A_n には含まれるが、 A_{n-1} とは交はらない時、 k を (m, j) と書く。各 n

に對する j の級数 $j(n)$ は $N(n)$ を越えなない。故に (i) と (ii).

$$\begin{aligned} \sum_k |f_{k\delta}(z) - g_{k\delta}(z)| &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{j(n)} |f_{n,j,\delta}(z) - g_{n,j,\delta}(z)| \\ &\leq N(1) \omega(\delta) + \sum_2^{\infty} \frac{(2n+1)^3 \delta^3 j(n) \omega(\delta)}{(n\delta)^3} \leq 9M \omega(\delta) \left(1 + (2n+1)^3 \sum_2^{\infty} \frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

従て、 $g_\delta = \sum_k g_{k\delta}$ における g_δ は ∞ の近傍で正則であり。
 $\delta \rightarrow 0$ の時 $\omega(\delta) \rightarrow 0$ であるから、 $\|f - g_\delta\| \rightarrow 0$ ($\delta \rightarrow 0$) となる。

36. 第二段の構成法、第二 Laurent 係数の評価。

S を \mathbb{C} 上の有界集合で $\alpha(S) > 0$ とするもととし、 $h \in A(S, m)$ とする。 ∞ の近傍で $h(\xi) = a_1(\xi - z_0)^{-1} + a_2(\xi - z_0)^{-2} + \dots$ (但し $z_0 \in \mathbb{C}$) とするば、

$$a_1 = (2\pi i)^{-1} \int_{\partial S} h(\xi) d\xi = \gamma(S, h), \quad a_2 = (2\pi i)^{-1} \int_{\partial S} h(\xi)(\xi - z_0) d\xi$$

である。且つ $\gamma = \gamma$ 次の記号を導入する。

$$\beta(S, z_0, h) = \alpha(S)^{-1} a_2 = (2\pi i \alpha(S))^{-1} \int_{\partial S} h(\xi)(\xi - z_0) d\xi;$$

$$\beta(S, z_0) = \sup \{ |\beta(S, z_0, h)| : h \in C(S, 1) \}$$

$$\beta(S) = \inf \{ \beta(S, z_0) : z_0 \in \mathbb{C} \}.$$

補題 5. (i) $\beta(S, z_1, h) - \beta(S, z_2, h) = (z_2 - z_1) \alpha(S)^{-1} \gamma(S, h)$ ($\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$).

(ii) $\beta(S, \alpha(S)) = \beta(S)$ なるが故に $\alpha(S)$ が存在する。

(iii) $\alpha(S) \leq \beta(S) \leq \text{diam}(S)$.

(iv) $\sup \{ |z - \alpha(S)| : z \in S \} \leq 2 \text{diam}(S)$.

(v) $|\alpha| \leq \alpha(S)$, $|\beta| \leq \beta(S)$ ただし α, β は ∞ の近傍で正則, $\gamma(S, h) = \alpha$, $\beta(S, \alpha(S), h)$

$= \beta$ とする $h \in CCS, 6)$ が存在する。

証明は [6] 又は [8] を参照されたら、次の補題 12 についても同様である。

補題 6. S を \mathbb{C} 上の $\alpha(S) < \infty$ とする集合、集合族 $S_i \subset S$ は次の性質を持つものとする： 半径 $\alpha(S)$ の任意の円板を交はる S_i の個数が一定数 c を越えない。 = 9 時

$$\sum_i \alpha(S_i) \leq 2 C_1 s \alpha(S).$$

ここで C_1 は絶対定数である。又 $h_i \in CCS_i, 1)$ とすれば

$$\sup \left\{ \sum_i |h_i(z)| : z \in \mathbb{C} \right\} \leq C_1 s.$$

以上の準備の下に $f_{k,\delta}$ の第二 Laurent 係数を評価する。先に

補題 7. h を有界可測、 $\psi \in C_0'(\mathbb{C})$ の台を K とする時は、

$$\gamma(K, T_\psi h) = (2\pi i)^{-1} \int h(\xi) \psi_\xi d\xi \wedge d\bar{\xi},$$

$$\gamma(K, (z-z_0) T_\psi h) = (2\pi i)^{-1} \int (z-z_0) h(\xi) \psi_\xi d\xi \wedge d\bar{\xi} = \gamma(K, T_{(z-z_0)\psi} h).$$

従て、 $(2\pi i)^{-1} \int (z-z_0) h(\xi) \psi_\xi d\xi \wedge d\bar{\xi}$ を評価すればよいか、その場合は次の結果が基本的である。

補題 8. S を \mathbb{C} 上の集合、 $n \geq 1, \delta > 0$ とする。 f が有界可測で、台の直径が δ_0 を越えなければ任意の $g \in C_0^\infty(\mathbb{C})$ に対して

$$(7) \quad \left| (2\pi i)^{-1} \int f(\xi) g_\xi d\xi \wedge d\bar{\xi} \right| \leq g \cdot \delta_0 \cdot \|g_\xi\|_\infty \Omega(f, \delta_g) \cdot \alpha(CS \cap \Delta(t, n\delta_g))$$

(但し、 g は定数、 δ_g は g の台の直径、 $\Omega(f, \delta)$ は f と δ によつて定まる定数であつて f を固定すると δ につれて単調増加、 t は g の台に含まれる或点) が成立つときは、 $0 < 2\delta \leq \delta_0$,

$X_{k,\delta} = [S \cap \Delta(z_{k,\delta}; (2n+1)\delta)]$ に対して

$$(8) \quad |(2\pi i)^{-1} \int (\xi - \Omega(X_{k,\delta})) f(\xi) (\varphi_{k,\delta})_{\bar{\xi}} d\xi \wedge d\bar{\xi}| \leq C(n) \cdot q \cdot \Omega(f, 2\delta) \alpha(X_{k,\delta}) \beta(X_{k,\delta}).$$

但し $C(n)$ は n の 2 に 關係する定数である。

証明 1 は補題 5, 6 が用ひられるか、詳細は省略する。[6] の IV, §4, Lemma 1 の 証明を修正すればよい。

§7. 第二段の証明の完結。

先づ補題 1 の (i) にようて

$$(9) \quad \|f_{k,\delta}\|_{\infty} \leq 4n \omega_f(2\delta).$$

次に $g \in C_0^\infty(C)$ とするば、同じ補題 1 より $\|T_g f\|_{\infty} \leq 2\delta_g \|g_{\bar{z}}\|_{\infty} \omega_f(\delta_g)$

を得るから、 g の各々を K と書くとき、補題 7 を参照して

$$\begin{aligned} |(2\pi i)^{-1} \int f(\xi) g_{\bar{\xi}} d\xi \wedge d\bar{\xi}| &= |\gamma(CX^0 \cap K, T_g f)| \leq 2\delta_g \|g_{\bar{z}}\|_{\infty} \omega_f(\delta_g) \alpha(CX^0 \cap K) \\ &\leq 2\delta_g \|g_{\bar{z}}\|_{\infty} \omega_f(\delta_g) \alpha(CX \cap \Delta(t, \delta_g)) \end{aligned} \quad (t \in K)$$

$$\leq 2m \delta_g \|g_{\bar{z}}\|_{\infty} \omega_f(\delta_g) \alpha(CX \cap \Delta(t, n\delta_g))$$

を得る。この最後の变形の處で条件 (e) を用ひ T_2 、即ち $q = 2m$,

$\Omega(f, \delta) = \omega_f(\delta)$ とし 補題 8 の条件が満足されるから、 $X_{k,\delta} = CX \cap \Delta(z_{k,\delta}; (2n+1)\delta)$ としよう。

$$(10) \quad |\beta(X_{k,\delta}, \Omega(X_{k,\delta}), f_{k,\delta})| \leq 2m C(n) \omega_f(2\delta) \beta(X_{k,\delta})$$

が成立つ。一方 (9) と $4n \leq C(n)$ とより β は \leq となる。

$$(11) \quad |\gamma(X_{k,\delta}, f_{k,\delta})| \leq 4n \omega_f(2\delta) \alpha(X_{k,\delta}) \leq 2m C(n) \omega_f(2\delta) \alpha(X_{k,\delta}).$$

故に (10), (11), 補題 5 の (v) (\Leftarrow す)。

$$\gamma(x_{k,\delta}, g_{k,\delta}) = \gamma(x_{k,\delta}, f_{k,\delta}), \quad \beta(x_{k,\delta}, \alpha(x_{k,\delta}), g_{k,\delta}) = \beta(x_{k,\delta}, \alpha(x_{k,\delta}), f_{k,\delta})$$

すなはち $g_{k,\delta} \in C(x_{k,\delta}, 12mC(r)\omega_f(2\delta))$ の存在が知り得る。即ち, $b = 12mC(r) + (\approx)$ 第Ⅱ段の証明が完了した。

§8. Vitushkin の方法の応用. Gamelin-Garnett の定理.

Ω を S^2 の開集合で $\infty \notin \partial\Omega$ なるものをとする。この時 $A(\Omega)$ が $H^\infty(\Omega)$ の中に bounded pointwise convergence (b.p.c.) の位相で稠密であることは、 $\forall f \in H^\infty(\Omega)$ に対し、定数 $C > 0$ と $f_n \in A(\Omega)$ で $\|f_n\| \leq C \|f\|$, $f_n(z) \rightarrow f(z)$ ($\forall z \in \Omega$) なるものが存在する $\varepsilon = \varepsilon$ を云ふ。 $A(\Omega)$ が $H^\infty(\Omega)$ で b.p.c. 稠密の時は、上の C はすべて α が $f \in H^\infty(\Omega)$ に対し同一 $\varepsilon = \varepsilon$ で成立する。Gamelin と Garnett [1] は次の定理を Vitushkin の方法を応用して証明した。

定理2. $\infty \notin \partial\Omega$ なる開集合に対し次は同値である。

(a') $A(\Omega)$ は $H^\infty(\Omega)$ で b.p.c. 稠密である。

(b') $\forall r > 1, \exists m > 0 \ni \gamma(C\Omega \cap \Delta(z; \delta)) \leq m \alpha(C\Omega \cap \Delta(z; r\delta))$ ($\forall \delta > 0, \forall z \in \Omega$).

(c') $\exists r > 1, \exists m > 0 \ni \gamma(\partial\Omega \cap \Delta(z; \delta)) \leq m \alpha(C\Omega \cap \Delta(z; r\delta))$ ($\delta_0 \geq \delta > 0, \forall z \in \partial\Omega$).

定理3. K を \mathbb{C} の compact 集合とする。

(a'') $R(K)$ は $H^\infty(K^o)$ で b.p.c. 稠密で、 ∂K の面積が 0 ならば。

$\forall r > 1, \exists m > 0 \ni \gamma(CK^o \cap \Delta(z; \delta)) \leq m \gamma(CK \cap \Delta(z; r\delta))$ ($\forall \delta > 0, \forall z \in C$).

(b'') 次が成立すれば、 $R(K)$ は $H^\infty(K^o)$ で b.p.c. 稠密である。

$\exists r > 1, \exists m > 0 \ni \gamma(\partial K^o \cap \Delta(z; \delta)) \leq m \gamma(CK \cap \Delta(z; r\delta))$ ($\delta_0 \geq \delta > 0, \forall z \in \partial K^o$).

これら の 証明法は §§4~7 に述べたものに類似ではあるが、いろいろの工夫が必要になる。その詳細は [1] にある。尚、(a') の 条件 中 「 ∂K の 面積が 0」 は 不必要ではなかと言つてゐるが、未解決である。又、 $A(\Gamma)$ が $H^\infty(\Gamma)$ で b.p.c. 積密の時 は、定数 c を 1 にすることが出来るといふ Davie の結果もある。その他興味ある結果については、[2] を見られたい。一様近似と b.p.c. 近似の異同については Fisher の例がある。

9. T_φ の一般化.

R^n を n (≥ 2) 次元 Euclid 空間とし、その座標を (x_1, \dots, x_n) 、
 $D_\nu = -i \partial / \partial x_\nu$ ($\nu = 1, \dots, n$) とする。 $P(D)$ を 定数係数の 楕円型一階
 線型偏微分作用素系とする。即ち

$$(12) \quad P(D) = \sum_{\nu=1}^n A^{(\nu)} D_\nu + B,$$

$A^{(\nu)}$, B は $N \times N$ 定数行列であつて、任意の $\xi (\neq 0) \in R^n$ に対し

$$(13) \quad \det \left(\sum_{\nu=1}^n A^{(\nu)} \xi_\nu \right) \neq 0$$

を満足するものとする。この時、次の性質を持つ $P(D)$ の基本
 解 $E(x)$ が存在する ([3], [5] 参照)。

1) $E(x)$ は R^n で定義され $N \times N$ 複素行列に値をとる函数で、原点を除くことは C^∞ である。

2) δ を Dirac 測度、 I を $N \times N$ 単位行列とすととき、

$$P(D) E = E * P(D)(\delta I) = \delta I.$$

3) $F(x) = \left(\sum_{i,j=1}^N |E_{ij}(x)|^2 \right)^{1/2}$ とおけば、原点の近傍で

$$F(x) \leq C_0 |x|^{1-n}$$

が成立つ。但し C_0 は定数で、 $|x| = (x_1^2 + \dots + x_n^2)^{1/2}$ である。

さて、任意の $f \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n; N) = \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n) \times \dots \times \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ (N 個の直積)

に対し、 $f = (P(D)E)*f = E*(P(D)f)$ であるから、 $\{\varphi_k\}$ を

$C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ の函数よりなる 1 の分割とすれば、簡単な計算で

$$f = \sum_k E*(\varphi_k P(D)f) = \sum_k [\varphi_k f - E*(\sum_\nu (D_\nu \varphi_k) A^{(\nu)} f)]$$

を得る。そこで、 $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ を固定して、作用素 T_φ を

$$(14) \quad T_\varphi f = \varphi f - E* \left[\sum_\nu (D_\nu \varphi) A^{(\nu)} f \right] \quad f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n; N)$$

で定義する。特に $f \in L^{1, \text{loc}}(\mathbb{R}^n; N)$ ならば、

$$(15) \quad (T_\varphi f)(\xi) = \varphi(\xi) f(\xi) - [E* \sum_\nu (D_\nu \varphi) A^{(\nu)} f](\xi)$$

$$= \sum_\nu \int_{\mathbb{R}^n} E(\xi - x) (D_\nu \varphi(x)) A^{(\nu)} (f(\xi) - f(x)) dx + \int_{\mathbb{R}^n} E(\xi - x) \varphi(x) B f(\xi) dx$$

命題 1. $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ とし、その台を K とすれば、 $f \in L^{1, \text{loc}}(\mathbb{R}^n; N)$ に対し、 $T_\varphi f$ は次の性質を持つ。

$$(i) \quad T_\varphi f \in L^{1, \text{loc}}(\mathbb{R}^n; N),$$

$$(ii) \quad K \text{ の外部で } P(D)(T_\varphi f) = 0.$$

$$(iii) \quad \xi \text{ の近傍に於て } P(D)f = 0 \text{ ならば、} P(D)(T_\varphi f)(\xi) = 0.$$

$$(iv) \quad f \text{ が } \xi \text{ で連続で、} K \text{ 上で有界ならば、} T_\varphi f \text{ は } \xi \text{ で連続。}$$

$$(v) \quad f - T_\varphi f \text{ は } \varphi^{-1}(1) \text{ の内点に於て、} P(D)u = 0 \text{ を満足する。}$$

これは、 $T_\varphi f$ の大きさの評価の点を除けば、補題 1 の拡張

である。更に、 $f \in L^{p, loc}(R^n; N)$ ($1 \leq p \leq \infty$) ならば、 $T_{\varphi} f \in L^{p, loc}(R^n; N)$ であることをすぐ分かる。

次に、 $x_0 \in R^n$ を固定する。 $\tilde{\varphi}$ を $[0, \infty)$ 上で定義された実数値 C^∞ 函数で、 $\tilde{\varphi}(t) = 1$ ($t \leq 1$)， $= 0$ ($t \geq 2$)，且つ全ての t で $0 \leq \tilde{\varphi}(t) \leq 1$ なるものとし、 $\delta > 0$ 対し

$$\varphi_\delta(x) = \tilde{\varphi}(4\delta^{-1}|x-x_0|)$$

とおく。この時、 φ_δ の台 K_δ は $\{x \in R^n : |x-x_0| \leq \delta/2\}$ に含まれる。

$$|\operatorname{grad} \varphi_\delta(x)| = \left(\sum_v (\partial \varphi_\delta / \partial x_v)^2 \right)^{1/2} = 4\delta^{-1} \tilde{\varphi}'(4\delta^{-1}|x-x_0|).$$

そこで、 $\delta \rightarrow 0$ の時の $T_{\varphi_\delta} f$ の収斂性を調べる。

定義。 $f \in L^{p, loc}(R^n, N)$ ($1 \leq p < \infty$) とする。もし $\alpha \in C$ と有限な定数 $C_2 > 0$ で、充分小さい全ての $\delta > 0$ に対して

$$\left(\int_{|x-x_0| \leq \delta} |f(x) - \alpha|^p dx \right)^{1/p} \leq C_2 \delta.$$

が成立つやうなものが存在すれば、 f は x_0 に於て L^p 連続であると言ふ。

この時次が成立つ。

命題2。 $n/(n-1) \leq p \leq \infty$ ， $f \in L^{p, loc}(R^n; N)$ とする。

(i) x_0 を含まない任意の compact 集合 H 上に於て、 $T_{\varphi_\delta} f$ は $\delta \rightarrow 0$ の時一様に 0 に収斂する。

(ii) $p < \infty$ の時、 f が x_0 で L^p 連続ならば、 $\delta \rightarrow 0$ のとき、
 $T_{\varphi_\delta} f$ は $L^{p, loc}(R^n; N)$ に於て 0 に収斂する。

(iii) $p = \infty$ の時、 f が x_0 で連続ならば、 $\delta \rightarrow 0$ のとき、 $T_{\varphi_\delta} f$

は全ての compact 集合上で一様に 0 に収斂する。

$T_\varphi f$ のルムを評価する。 $g \in L^{p, loc}(R^n; N)$, K が R^n の compact 集合の時, $g|_K$ の L^p ルムを $\|g\|_{p, K}$ と書く。

命題 3. $1 \leq p \leq \infty$, $f \in L^{p, loc}(R^n; N)$, $\varphi \in C_0^\infty(R^n) \subset \mathcal{L}$, φ の台を K と書く。

(i) $p < \infty$ の時, $\exists \alpha$ を $1 \leq \alpha, \alpha \leq \infty$ で $p^{-1} + \alpha^{-1} = \alpha^{-1}$ な α

とのときすれば、任意の compact 集合 $H \subset R^n$ に対し、

$$\|T_\varphi f\|_{\alpha, H} \leq \|\varphi\|_H \|f\|_{\alpha, H} + C_3 \|\operatorname{grad} \varphi\|_n \|f\|_{p, K}.$$

ここで、 C_3 は H と K の 2 に依存する定数である。特に、

$n/(n-1) \leq p$ ならば、

$$\|T_{\varphi_\delta} f\|_{n/p/(n+p), H} \leq C_4 (\|f\|_{p, H} + \|f\|_{p, K_\delta}).$$

ここで、 C_4 は H と x_0 の 2 に依存する定数である。

(ii) $p = \infty$ の時は、任意の compact 集合 $H \subset R^n$ に対し、

$$\|T_\varphi f\|_H \leq \|\varphi\|_H \|f\|_H + C_5 m(K)^{1/n} \|\operatorname{grad} \varphi\|_\infty \|f\|_K.$$

ここで、 C_5 は H と K の 2 に依存する定数で、 $m(K)$ は K の体積である。特に、

$$\|T_{\varphi_\delta} f\|_H \leq C_6 (\|f\|_H + \|f\|_{K_\delta}).$$

ここで、 C_6 は H と x_0 の 2 に依存する定数である。

系 1. $n/(n-1) \leq p < \infty$, $f \in L^{p, loc}(R^n; N)$, $x_0 \in R^n$ とする。この時、次の条件を満足する函数列 $f_m \in L^{n/p/(n+p)}(R^n; N)$ が存在する。

$$(i) \|f_m\|_{n/p/(n+p), H} \leq C_H (\|f\|_{p, H} + \|f\|_{p, V})$$

ここで、 ∇ は x_0 の (固定された) compact 近傍, C_H は H の 2 に依存する定数である.

(ii) $P(D)f=0$ が成立つ任意の開集合上に於て、 $P(D)f_m=0$.

(iii) x_0 の近傍 (m に依存する) に於て、 $P(D)f_m=0$.

(iv) $x \neq x_0$ ならば、 $f_m(x) \rightarrow f(x)$ であり、収束点は x_0 を含まない任意の compact 集合上で一様である.

(v) 任意の compact 集合 H 上で、 $\|f - f_m\|_{np/(n+p), H} \rightarrow 0$.

(vi) もし f が x_0 で L^p 連続ならば、上の f_m を $L^{p, loc}(R^n; N)$ と取り取ることが出来、更に $\|f_m\|_{p, H} \leq C_7 (\|f\|_{p, H} + \|f\|_{p, \nabla} + 1)$ を成立せしめることが出来る. ここで、 C_7 は H と f の x_0 に於ける連続性 (定義の C_2) にのみ依存する定数である. しかも、(v) は L^p ルムで満足される.

証明. $f_m = f - T_{Q_{(1/m)}} f$ ($m=1, 2, \dots$) とおけばよし.

系 2. $f \in L^{\infty, loc}(R^n; N)$, $x_0 \in R^n$ とするとき、次を満足する函数列 $f_m \in L^{\infty, loc}(R^n; N)$ が存在する.

(i) $\|f_m\|_H \leq C_H \|f\|_{H \cup \nabla}$.

ここで、 ∇ は x_0 の 固定された compact 近傍, C_H は H の 2 に依存する定数である.

(ii) f が連続な点では f_m も連続である. 又、 $P(D)f=0$ が成立つ任意の開集合上では $P(D)f_m=0$.

(iii) x_0 の (m に依存する) 近傍で、 $P(D)f_m=0$.

- (iv) x_0 を含まない任意の compact 集合上で, 一様に $f_m \rightarrow f$.
- (v) f が x_0 を連続ならば, 任意の compact 集合上で, 一様に $f_m \rightarrow f$.

これは, [1] の Cor. 1.2. の拡張である. T_φ の性質について
は二の位にして, 終にその応用を述べる.

310. T_φ の応用: 局所性定理.

$P(D)$ を前節の通りとし, 次の定義をおく: 開集合 Ω に対し

$$\mathcal{A}_P(\Omega) = \{u \in C(\Omega; N) : P(D)u = 0 \text{ on } \Omega\}.$$

又, R^n の compact 集合 X に対し,

$$\tilde{\mathcal{A}}_P(X) = \bigcup \{\mathcal{A}_P(\Omega) : \Omega \text{ は } X \text{ を含む開集合}\}$$

とおく. 更に

$$\mathcal{A}_P(X) = \{u \in C(X; N) : u \text{ は } \tilde{\mathcal{A}}_P(X) \text{ の函数で } X \text{ 上 一様近似出来る}\}$$

とおく. この時, Bishop の局所性定理(補題 3)の拡張に當て
次の定理が成立する.

定理 4. $f \in C(X; N)$ とする. 任意の $x \in X$ に対し, x の閉近傍 K_x で $f|_{X \cap K_x} \in \mathcal{A}_P(X \cap K_x)$ なるものがあれば, $f \in \mathcal{A}_P(X)$.

又, bounded pointwise convergence については, 次の結果も証明出来る.

定理 5. Ω を R^n の有界開集合とし, f を Ω 上有界で $P(D)f$

$= 0$ 及び次の條件を満足するものとする. $\{U_j\}_{j=1}^{\infty}$ は \bar{U} の有限開被覆, M は正数で、各 j に対し函数列 $f_k \in A_p(\overline{U \cap U_j})$ で

$$f_k(x) \rightarrow f(x) \quad (\forall x \in U \cap U_j), \quad \|f_k\|_{U \cap U_j} \leq M \|f\|_{U \cap U_j}$$

なるものが存在する. 之の時、函数列 $g_k \in A_p(\bar{U})$ で

$$g_k(x) \rightarrow g(x) \quad (\forall x \in U), \quad \|g_k\|_U \leq \lambda M \|f\|_U$$

なるものが存在する. 之より λ は $\{U_j\}$ のみに依存する定数である。

これは、[1] の Lemma 2.1. の拡張に當る。証明も類似である。之に類似の定理 (L^p の場合など) を更に述べることも出来るが、之よりは省略させていただく。

文 献

- [1] T. W. Gamelin and J. Garnett, Constructive techniques in rational approximation, T. A. M. S. (to appear).
- [2] —————, Bounded pointwise approximation and dirichlet algebras, (to appear).
- [3] L. Hörmander, Linear partial differential operators, Springer, 1963.
- [4] 貴志一男, Function algebras の理論から見た rational approximation, Function algebra 12 "の共同研究集会(第2回)報告集, 数解研講究録 61, 1968.

- [5] 清畑茂, 偏微分方程論, 岩波書店, 1965.
- [6] A.G. Vitushkin, Analytic capacity of sets and problems in approximation theory, Uspekhi Mat. Nauk 22 (1967), 141-199.
- [7] S. Yamashita, Recent development of rational approximation theory, 1969年3月数解研講演.
- [8] L. Zalcman, Analytic capacity and rational approximation, Lecture Notes in Math. #50, Springer, 1968.