

Diffeomorphism & Topological entropy

中央大 理工 松江 広文

§1 も. Axiom A を満たす diffeomorphism の例をあげ
次に §2 も. topological entropy の定義といいくつかの定理を述べる。最後に §3 も. §1 も“あげ” $T=13$ の topological entropy の計算をする。


§1. Axiom A を満たす diffeomorphism の例

Morse-Smale diffeo.

例1. S^2 上の例。

S^2 を Riemann sphere とみなす。 $f(z) = 2z - 1 = \pm i$ 。

S^2 上の diffeo. を定義する。




0: source, $W^u(0) = S^2 - \{\infty\}$

$W^s(0) = \{0\}$

∞: sink, $W^u(\infty) = \{\infty\}$

$W^s(\infty) = S^2 - \{0\}$

例2. T^2 上の例.



height function h は \mathbb{R} に射す。vector field
 $X = \text{grad } h$ を考え。 X は \mathbb{R}^3 flow の time-one map
 を与える。

以上の一例は gradient-like diffeomorphism. これは、
 non-gradient-like な例を上げる。

例3.

f : grad-like $\iff (p \leq q \Rightarrow \dim W^s(p) \geq \dim W^s(q))$


$T = T^2$.

p, q periodic pt.

$$p \leq q \stackrel{\text{def}}{\iff} W^u(q) \cap W^s(p) \neq \emptyset$$

という二つの定理。

下図は S^2 上の diffeo. φ ある。ここで $p \geq q$ にとかかわらず。 $\dim W^s(p) = \dim W^s(q)$ となるので、しかも non-gradient-like.




なお。 $W^u(p)$ と $W^s(q) \ni x$ が x を heteroclinic pt. という。

以上の例 (Morse-Smale) の top. ent. = 0 であることを §2 で述べる。

Horseshoe diffeo. (S^2 上の diffeo.)

次の図で horseshoe diffeo. の作り方を表わす。詳しくは 飯田氏を参照されたい。この diffeo. においては、 homoclinic pt. がある。




Def. $p \in f \in \text{Diff}(M)$ の hyperbolic periodic pt. とする。
 $x \in W^s(p) \cap W^u(p)$ を homoclinic pt. と云う。
 $x \in W^s(p)$ 亦 $W^u(p)$ のとき、 x は transverse homoclinic pt. という。

Remark. x : homoclinic \iff ある $m \in \mathbb{Z}$ に対し、

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f^{mn}(x) = \lim_{n \rightarrow -\infty} f^{mn}(x) \\ = p \quad (p \neq x)$$

上図より、点 p における
stable mfd. と、un-
stable mfd. は右図の様
になる。従って、homo-
clinic pt. x があらわれ
る。horseshoe diffeo.
① top. ent. = $\log 2 \approx$



3. 二とを §3 で示す。

Anosov diffeo. の例。

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbb{Z}). A \text{ の固有値を } \lambda_1, \lambda_2 \text{ とする}.$$

$|\lambda_i| \neq 1$ ($i = 1, 2$) とする。 $(0 < |\lambda_2| < 1 < |\lambda_1|)$

$$f: \underset{\downarrow}{T^2} \longrightarrow \underset{\downarrow}{T^2}$$

$(x, y) \mapsto (ax+by, cx+dy)$ (f は T^2 上の diffeo. を定義)

すなはち f は Anosov diffeo. で $f \circ \text{top. ent.} = \log |\lambda_1|$

(§3 で示す)。

§2. Topological entropy の定義と定理。

$\left\{ \begin{array}{l} X: \text{compact top. space} \\ \forall \text{open cover } \alpha \text{ of } X, N(\alpha): \min \text{sub-cover of setsの個数} \\ \forall \text{covers } \alpha, \beta, \alpha \vee \beta = \{A \cap B \mid A \in \alpha, B \in \beta\} \\ \varphi: X \rightarrow X \text{ cont. map} \end{array} \right.$

$$\text{Def. } h(\varphi, \alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log N(\alpha \vee \varphi^{-1}\alpha \vee \dots \vee \varphi^{-n+1}\alpha)$$

を。Cover α に関する φ の entropy という。

Remark. $h(\varphi, \alpha)$ は極限値を持ち。

$$0 \leq h(\varphi, \alpha) \leq \log N(\alpha) < \infty$$

であることが示される。

$$\text{Def. } \text{ent}(\varphi) \stackrel{\text{def}}{=} \sup_{\alpha} h(\varphi, \alpha) \text{ を } \varphi \text{ の topological entropy}$$

という。

Remark. $\left[\begin{array}{l} \varphi: X \rightarrow X \text{ cont. map} \\ \psi: X \rightarrow X' \text{ homeo.} \\ \psi\varphi\psi^{-1}: X' \rightarrow X' \end{array} \right]$

$$\Rightarrow \text{ent}(\psi\varphi\psi^{-1}) = \text{ent}(\varphi), \text{ i.e. top. conjugate}$$

で topological entropy は不变。

以上は [4] 1-5 3.

Theorem. (Bowen [3])

$\left[\begin{array}{l} M: \text{compact metric sp.} \\ f: M \rightarrow M \text{ cont. map} \\ \Omega: \text{nonwandering set of } f \end{array} \right]$

$$\Rightarrow \text{ent}(f) = \text{ent}(f|_{\Omega}).$$

Cor. $\Omega(f)$: finite $\Rightarrow \text{ent}(f) = 0$.

これは Morse-Smale diffeo. で topological entropy
= 0 である。

Notation. (X, d) compact metric sp., $f: X \rightarrow X$ homeo.
 $\delta > 0$ と $x \in X$ とする。

$$W^s(x, \delta) = \{y \in X; d(f^n(x), f^n(y)) \leq \delta, \forall n \geq 0\},$$

$$W^u(x, \delta) = \{y \in X; d(f^n(x), f^n(y)) \leq \delta, \forall n \leq 0\}.$$

Def. f が canonical coordinates を持つとは。

$\forall \delta > 0$ に対して $\exists \varepsilon(\delta) > 0$ s.t. $d(x, y) \leq \varepsilon(\delta) \Rightarrow W^s(x, \delta) \cap$

$W^u(y, \delta) \neq \emptyset$.

f が hyperbolic can. coord. を持つとは、更に次の条件を満たすことをいふ： $\exists \delta^* > 0, 0 < \lambda < 1, \exists c \geq 1$;

$$x \in X, y \in W^s(x, \delta^*) \Rightarrow d(f^n(x), f^n(y)) \leq c\lambda^n d(x, y), \forall n \geq 0,$$

$$x \in X, y \in W^u(x, \delta^*) \Rightarrow d(f^n(x), f^n(y)) \leq c\lambda^n d(x, y), \forall n \leq 0.$$

Remark. can. coord. は metric のとり方によらず、 hyperbolic can. coord. は metric のとり方に依存する。

Theorem. (Bowen [3])

$[M: \text{compact Riemannian mfd.}]$
 $[f \in \text{Diff } M \text{ が Axiom A を満たす}]$
 $[Q_i: \text{basic set}]$

$\Rightarrow f|_{Q_i}$ はある metric に関して hyp. can. coord. を持つ。

Theorem. (Bowen [3])

$[X: \text{compact metric sp.}]$
 $[f: X \rightarrow X \text{ homeo. で hyp. can. coord. を持つ.}]$

$$\Rightarrow \text{ent}(f) = \overline{\lim} \frac{1}{n} \log N_n(f),$$

$T=T=L, N_n(f): f^n \text{ の fixed pts. の個数.}$

§3. Shift automorphism × topological entropy の計算.

$$S_n = \{0, 1, \dots, n-1\} \ni a, b \mapsto$$

$$d(a, b) = \begin{cases} 0 & a = b \\ 1 & a \neq b \end{cases} \quad \text{とおく。}$$

$X_{S_n} = \{(\dots, a_{-1}, a_0, a_1, a_2, \dots) ; a_i \in S_n\}$,

$x \in X_{S_n}$ は対し、第*i*座標を $(x)_i$ と書く。 $(x)_i \in S_n$.

$x, y \in X_{S_n}$ は対し、 $d(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2^{|i|}} d((x)_i, (y)_i)$ によ

る metric を入れる。 X_{S_n} は compact metric sp. となる。

$\alpha : X_{S_n} \rightarrow X_{S_n}$ は。 $a = (\dots, a_{-1}, a_0, a_1, a_2, \dots)$

$\in X_{S_n}$ は対し、 $(\alpha(a))_i = a_{i+1}$ により定義する。 α は onto homeo. (shift automorphism という)。

13). ($n=2$)

$$a = (\dots, \underbrace{1, 0, 0, 1}_{i-2, i-1, i}, 0, 1, 0, \dots)$$

$$\downarrow \alpha \quad \swarrow \swarrow \swarrow \swarrow$$

$$\alpha(a) = (\dots, \underbrace{1, 0, 0, 1}_{i-3, i-2, i-1, i}, 0, 1, 0, \dots)$$

$\alpha : X_{S_n} \rightarrow X_{S_n}$ は対し。 α^m の fixed pt. は。

$$(\dots, \underbrace{a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{im}}_{i-2, i-1, i}, \underbrace{a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{im}}_{i-3, i-2, i-1, i}, \underbrace{a_{i1}, \dots, a_{im}}_{i-4, i-3, i-2, i-1, i}, \dots)$$

である。すなはち α^m の fixed pts. の個数は n^m 。従って α^m の

$$\text{ent}(\alpha) = \overline{\lim_m} \frac{1}{m} \log N_m(\alpha)$$

$$= \overline{\lim_m} \frac{1}{m} \log n^m = \log n.$$

horseshoe diffeo. $f : S^2 \rightarrow S^2$ の nonwandering set E

$\Lambda \subset E$ 。 Λ は Cantor set である。 $f|_\Lambda$ は shift aut. $\alpha : X_{S_2} \rightarrow$

X_{S^2} (= top. conjugate, 従, て. $\text{ent}(f) = \log 2$.

toral diffeo. (Anosov) の場合。


$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbb{Z})$ の固有値を λ_1, λ_2 ($0 < |\lambda_2|$

$< 1 < |\lambda_1|$) とし、 \mathbb{T}^2 の様に $f_A : \mathbb{T}^2 \rightarrow \mathbb{T}^2$ を考える。 f_A^m

の fixed pts. の個数 $N_m(f_A)$ は Lefschetz trace formula と

$$1). N_m(f_A) = (1 - \lambda_1^m)(1 - \lambda_2^m).$$

$$\begin{aligned} \text{ent}(f_A) &= \overline{\lim} \frac{1}{m} \log N_m(f_A) \\ &= \overline{\lim} \frac{1}{m} \log |\lambda_1|^m \left(\frac{1}{|\lambda_1|^m} - \frac{\lambda_1^m}{|\lambda_1|^m} \right) (1 - \lambda_2^m) \\ &= \log |\lambda_1|. \end{aligned}$$



λ_1, λ_2 に対応する固有ベクトルを X と Y とし、二つの平行四辺形 R_1 と R_2 に分割する。上の計算は、二つの Markov partition を用いて shift auto. と対応させても、又、定義からも直接導ける。

文献

- [1] Smale, S. ; Differentiable Dynamical Systems.
Bull. Amer. Math. Soc. 73(1967), p. 747-817.
- [2] Nitecki, Z. ; Differentiable Dynamics. (MIT)
- [3] Bowen, R. ; Topological Entropy and Axiom A.
Proc. Sympos. Pure Math. 14(1970), p. 23-41.
- [4] Adler, R. L., A. G. Konheim and M. H. McAndrew ;
Topological Entropy. Trans. Amer. Math. Soc.
114(1965). p. 309 - 319.
- [5] Smale, S. ; Diffeomorphism with many periodic
points. Differential and Combinatorial Topology.
(Princeton) p. 63 - 80.