

$B^{(B)}$ -valued extensions
for B -valued structures

早大理工 田嶋 信一

Boolean ultrapowers については [1], [2], [3] など
で研究されており、その拡張は (4), (5) などに見られる。私
は、Boolean algebra の Boolean ultrapowers を考
えることにより、Boolean valued structure M に対し
 $M^{(B)}$ を構成した。すなはち、complete Boolean algebra
 B' と B -valued structure M に対し

$$M^{(B)} = \{ f : M \rightarrow B' \mid \forall n, m \in M (n \neq m \rightarrow f(n) \wedge f(m) = 0) \wedge \bigvee_{m \in M} f(m) = 1 \}$$

次に、文の値を Boolean ultrapowers $B^{(B)}$ で考え
る。この $B^{(B)}$ は次の operation により Boolean algebra と
なる。 $u, v \in B^{(B)}$ に対し

$$(1) (u \vee v)(a) = \bigvee_{a_1 \vee a_2 = a} u(a_1) \wedge v(a_2)$$

$$(2) (\neg u)(a) = u(\neg a)$$

また、 \exists に対する operation は \exists^* 。 $\bigvee_{i \in \lambda} u_i$ を定義

$$(3) (\bigvee_{i \in \lambda} u_i)(a) = \bigvee_{\bigvee_{i \in \lambda} u_i = a} \bigwedge_{i \in \lambda} u_i(a_i)$$

した。ところが、無条件では $\bigvee_{i \in I} u_i \in B^{(B)}$ となるない。そこで、 B' が common refinement を持つ といふ条件をつけた。以下これを条件(i)と呼ぶ。条件(i)は便宜的な条件であり、もっと弱い条件があることを予想していたが、予稿を送った後に、高田君が、条件(i)は $\bigvee_{i \in I} u_i \in B^{(B)}$ をなすための必要十分条件であり、しかも B' が power set algebra と同型となってしまうことを証明してくれた。つまり、私の方法では、 B' としては power set (しかるべき) ことがわかった。このことにより、すべては意味を失った。したがって、以下述べることは、單なる計算でしかない。

Prop.1 complete Boolean algebra B と power set algebra B' に対し、 $B^{(B)}$ は (i), (ii), (iii) の operation のまとめて complete Boolean algebra をなす。

証明は、次の lemma より明らか。

lemma

u, v $\in B^{(B)}$ に対して。

$$u \leq v \quad \text{iff} \quad \forall a \in B \quad u(a) \leq \bigvee_{a \leq b} v(b)$$

次に、atomic formula $R(x_1 \dots x_n)$ に対する

$$\|R(f_1 \dots f_n)\|(b) = \bigvee_{\|R(m_1 \dots m_n)\|=b} \bigwedge_{j=1}^k f_j(m_j) \quad \text{と定義し。}$$

構成に関する帰納法により、任意の formula θ に対し、

$$\|\theta(f_1, \dots, f_n)\|(b) = \bigvee_{\|\theta(m_1, \dots, m_n)\|=b} \bigwedge_{j=1}^n f_j(m_j) \text{ を得る。}$$

この系としでは、

Cn 1

M が maximum principle を満足すれば、 $M^{(0)}$ も満足する。

Cn 2

M が separated ならば $M^{(0)}$ も separated である。

また、2-valued structure N に 対し、

$$(N^{(0)})^{(0)} \cong N^{(0)} \text{ を得る。}$$

REFERENCES

- [1] R. Mansfield, The theory of Boolean ultrapowers, Ann. Math. Logic 2 (1971) 297-323
- [2] K. Potthoff, Boolean ultrapowers, Arch. Math. Logic 16 (1974) 37-48
- [3] B. Koppelberg and S. Koppelberg, A Boolean ultrapower which is not an ultrapower, J. S. L. 41 (1976) 245-249
- [4] D. P. Ellerman, Sheaves of structures and generalized ultraproducts Ann. Math. Logic 7 (1974) 163-195
- [5] A. Urquhart, Boolean model theory I and II (preprint, Toronto)