

Modular 表現論の現状と問題

大阪市大 理 津島行男

有限群の表現論、特に modular 表現に関しては昔から興味ある問題があるが、重要なと思われるものの大部分は未解決である。限られた時間内ではそれらの意味づけ、現状報告にあらずることはできなかつたが、幸いに 12 feet の報告 (Santa Cruz 1979) に詳しいので御参考して顶く事にいたし、以下では最近めざましく活躍をいたる M. Bravé, L. Puig による modular 表現の再構成にスポットを当てて現状報告の代わりにさせて顶きます。これは Bravé のイリノイ大学における講義 (1980, 4月~6月) を基にしたものです。しかし、Springer の Lecture notes series により刊行される予定、そのため案内役となる私は幸いです。

I. Bravé-Puig の方法

§ 1. Brauer homomorphism for G -algebras

この章では、やや G -algebra に対する Brauer homo. を

定義し、Brauer の主定理と Green 対応の理論が同じアーティクルで示すことを示す。記号は以下の通りである。

(\mathcal{O}, m) : complete valuation ring of rank one, 標数 \mathfrak{o}

$F = \mathcal{O}/m$ は 標数 $p > 0$

$R = \mathcal{O}$ 又は F

A : 有限生成 R -algebra, $P_i(A) = A$ の原始中等元の集合

以下の Lemma は既知であるが便宜上まとめておく。

[I. 1] (Lifting idempotent Theorem) I を A の両側アーティクル

Jacobson radical $I = \lambda I$ とする。 e_1, e_2, \dots, e_r を $\bar{A} = A/I$ の直交

中等元とすれば A の直交中等元 e'_1, e'_2, \dots, e'_r がある。

$e'_i = e_i \quad 1 \leq i \leq r$ とせよ。

= 他の直接の系とく

[I. 2] I を A の両側アーティクル。 $A \rightarrow A/I$ は $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ の $I = \lambda I$ の

$P_i(A)$ の同型類 $\xleftrightarrow{1:1} P_i(\bar{A})$ の同型類 の induce である。

3. ($e, f \in P_i(A)$ e と f が 同型 $\Leftrightarrow Ae \simeq Af \Leftrightarrow eA \simeq fA$)

[I. 3] (Rosenberg's Lemma) $e \in P_i(A)$, $I_1, \dots, I_k \in A$ の左アーティクル。 e と $e \in \sum_{j=1}^k I_j'$ $\Rightarrow e \in I_j e \quad 1 \leq j \leq k$

[I. 4] $e \in P_i(A)$, $f \in P_i(A)$ s.t. $f \in AeA$

$\Leftrightarrow Ae \simeq Af \quad (\Leftrightarrow e = ab, f = ba \quad a, b \in A)$

[I. 5] A : 任意の環 M : left A -mod. $E = \text{End}_A(M)$

e, f を E の中等元とするとき。

$eM \cong fM$ as A -modules $\Leftrightarrow Ee \cong Ef$ as E -modules

証明は [1.1] を除き易い。

Def. A が (右) RG -module のとき A が G -algebra となる。

(G の作用は右肩につけ書き = \cdot とする) G は有限群。

$$A^G = \{a \in A \mid a^g = a \quad \forall g \in G\}$$

$G \supset P$ が subgroup のとき $\text{Tr}_P^G : A^P \rightarrow A^G$

$$\text{Tr}_P^G : A^P \rightarrow A^G \quad \text{で} \quad \text{Tr}_P^G(a) = \sum_{g \in G/H} a^g \quad \text{を define}$$

$$A_P^G = \text{Tr}_P^G(A^P) \quad \text{とかく。} \quad \text{JR の Lemmas は容易}$$

$$[1.6]) G \supset H \supset P \Rightarrow \text{Tr}_P^G = \text{Tr}_H^G \cdot \text{Tr}_P^H$$

2) (Mackey 分解) $G \supset P, H$

$$\text{Tr}_P^G(a) = \sum_{S \in P \backslash G/H} \text{Tr}_{H_n S^{-1} P S}^H(a^S)$$

$$3) G \supset P, H \quad \text{のとき} \quad \text{Tr}_P^G(a) \text{Tr}_H^G(b) = \sum_{S \in P \backslash G/H} \text{Tr}_{H_n S^{-1} P S}^H(a^S b)$$

Def. $P \in G$ の p -subgroup (p は $F = \mathbb{F}/m$ の標数 !)

$$I^P(A) = \sum_{Q \leq P} A_Q^P + m A^P \quad \text{は } A^P \text{ の } 1 \text{-アーリー}$$

且 $N_G(p)$ -invariant. natural map (当然 $N_G(p)$ -alg. homo.)

$$A^P \longrightarrow A(p) = A^P / I^P(A)$$

は Brauer homo. と記す $B_{\text{Tr}_P^G}$ とかく。

[1.6] 2) より VR の基本的関係式を得た。

$$[1.7] \quad B_{2p} T_{2p}^G = T_{2p}^{N_G(p)} B_{2p} \quad (\text{on } A^P)$$

Example 1. $G \xrightarrow{\text{act.}} X$: finite group. $A = F[X]$

$$\text{のとき } A^P = F[C_X(p)] \oplus \sum_{Q < P} A_Q^P$$

よし B_{2p} : $(F[X])^P \longrightarrow F[C_X(p)]$ は $C_X(p)$ はよる "cut" は他の

を}を"。 $X = G$ の場合は従つて古典的 Brauer homo.

となるが"定義域はたがいお". その分 map は epimorphism は τ_1, τ_2 である。VR の主張の前半は古典的, 即ち G -algebra における defect group の理論である。証明は Rosenberg's Lemma と [1.6] 3) より直ちにでき。

$$[1.8] \quad (\text{Min-Max Theorem}) \quad e \in \pi_1(A^G) \iff L$$

$\exists D$: p -subgroup of G unique up to G -conjugacy s.t.

$$(i) \quad e \in A_D^G \quad (ii) \quad e \in A_H^G \implies D \leqslant H$$

$D \nleq e$ の defect group とする $D = D(e)$ をかく。= の時

$$(iii) \quad B_{2D}(e) \neq 0 \quad \text{且} \quad B_{2p}(e) \neq 0 \implies p \leq D$$

Proof. (iii) の 2 が問題である。 $B_{2D}(e) = 0$ とする。

従つて $e \in \sum_{Q < D} A_Q^D$ 一方仮定より $e = T_{2D}^G(a), \forall a \in A^D$

$$\therefore e = T_{2D}^G(ea) \in T_{2D}^G\left(\sum_{Q < D} A_Q^D\right) = \sum_{Q < D} T_{2D}^G(A_Q)$$

$\therefore e \in T_{2D}^G A^Q$ for some $Q < D$ by Rosenberg's Lemma.

矛盾。 $\because B_{2D}(e) \neq 0$ かつ $B_{2p}(e) \neq 0$ とす。

$$e \in A_D^G \subset \sum A_{p \cap D}^P. \quad \text{よし 最後の 1 つは } I^P/A$$

$\vdash \lambda \vdash \tau \vdash \circ \quad \vdash P \cap A^G D = P \quad \exists s \in G \quad \text{i.e. } P \leq_G D$

Def. $I(A, G, P)$ = isomorphism classes of $Pi(A^G)$ with defect group P (= これは well defined, $B_P \subseteq e, f \in Pi(A^G)$)

且 $A^G e \cong A^G f$ \Leftrightarrow $D(e) = D(f)$ 例えは [1, 4]

[1, 9] (1) B_{2p} induces $I(A, G, p) \xrightarrow{1:1} I(A(p), N_G(p), p)$

(2) $N_G(p) \subset H \subset G$ とする。 " $A^G \subset A^H$ " induces

$I(A, G, p) \xrightarrow{1:1} I(A, H, p)$

Proof. やや雑な書き方であるが、アイデアは以下の通り。

$$A^G \supset A_p^G \xrightarrow{B_{2p}} A(p)_p^{N_G(p)} \subset A(p)^{N_G(p)}$$

は epimorphic by [1, 7].

$$\text{For } I(A, G, p) = \{e \in Pi(A_p^G) \mid B_{2p}(e) \neq 0\}$$

$$I(A(p), N_G(p), p) = \{f \in Pi(A(p))^{N_G(p)} \mid (since \ p > 2)$$

$$\Rightarrow A(p)^{N_G(p)} = 0 \quad \text{:= 由と [1, 2] より (1) は自明。}$$

次に $e \in Pi(A^G)$, $D(e) = P$ とする。 e を A^H における直交原始元分解である。 $e = \sum e_i$. これは [1, 8] (iii) と同じ方法

で $D(e_i) \leq_G P$ 且 $D(e_j) = P$ である事が示され

る。(従って $B_{2p}(e_j) \neq 0$) 一方 $B_{2p}(e) = \sum B_{2p}(e_i)$ は

$A(p)^{N_G(p)} = A(p)^{N_H(p)}$ で原始的。 したがって $B_{2p}(e) = B_{2p}(e_j)$

即ち $D(e_j) = P$ と e_j は直交 $\Rightarrow e = e_j \in B_{2p}(e) = B_{2p}(e_j)$

(1) と合わせて "制限写像" $e \rightarrow e_j$ は $I(A, G, p)$ と $I(A, H, p)$ との間の $1:1$ 対応を示す。

[1.9] の系を述べよ。

[1.10] (i) Brauer's First Main Theorem. = 4.1は [1.9] (ii) "2"

$A = FG$ とすればよ"

(ii) (Green 定理) $N_G(p) \subset H \subset G$, M : indecomposable RG-module

$P = \nu_X(M)$: vertex of M とする。= $\alpha \in \mathbb{F}_1 f(M)$:

indecomposable RH-module s.t. $M \otimes_H f(M)$, $\nu_X(f(M)) = P$.

= 4.1は $A = \text{End}_R(M)$ と L 2 [1.9] (2) で出る。 $p_1(A) = f_1\}$

"あるが" $\nu_X(M) = D(1) = P$ "ある"。

(iii) (Green) 記号は上と同じ。 δ : block idempotent of RG

且 $\delta M = M$ とする。= $\alpha \in \mathbb{F}_1 P = \nu_X(M) \leq D(\delta)$

Proof. $A = \text{End}_R(M)$. と L, $\rho: RG \rightarrow A$ を自然な写像。

$$\begin{array}{ccc} (RG)^P & \xrightarrow{\rho} & A^P \\ B_{np}^G = B_{np} & \downarrow & \downarrow B_{np}^A = B_{np} \\ FC_G(p) & \xrightarrow{\rho_p} & A(p) \end{array} \quad \rho \left(\sum_{\alpha < p} (RG)_\alpha^P \right) \subset \sum_{\alpha < p} A_\alpha^P \quad \text{"あるが"}$$

$B_{np} \delta = B_{np} \delta$ 左の図形を可換にする ρ_p が

存在する。

$$B_{np}^A \rho(\delta) = B_{np}^A (1_M) \neq 0. \quad \therefore B_{np}^G \delta \neq 0, \text{i.e. } p \leq D(\delta)$$

(iv) (Nagao) 記号、& 定理は (iii) と同じと L, $H = N_G(p)$ とする。 $\alpha \in (B_{np} \delta) f(M) = f(M)$ (但 L $R = 0$ の時

$B_{np} \delta + 0$ -係数 = lift した α と同一記号で書く)

Proof. (iii) の証明と同じ記号を使ふ。 $\rho(\delta) = 1_M = \sum e_i \in$ 原始半單元分解 in $A^{N_G(p)} = \text{End}_{N_G(p)}(M)$. $\exists e_i = e$ s.t.

$D(e) = P$ in $N_G(p)$. $\alpha \in f(M) = eM$ by definition.

$B_{\alpha_p}^G \delta \in \text{FC}_G(p) \subset (\text{FG})^P$ は注意して $\delta(B_{\alpha_p}^G \delta) e \neq 0$ を示せばよい。 = 4) (iii) の証明で用いた可換图形を引出す。

§2. Corestriction of algebras

記号は §1 と同じである。 $G \triangleright H$, M は RH -module

1) (Clifford, Conlon) M が absolutely irreducible である。

(証) $R = F$ or L $\Rightarrow \text{End}_{RG}(M^G)$ は twisted group ring $R[\mathbb{I}/H, \alpha]$ と同型。 I は M の inertial group α は $H^2(\mathbb{I}/H, R^*)$ の元。

2) (Green) G/H が p -group である。 M が absolutely indecomposable である $\Rightarrow M^G$ が \mathbb{F} である。 i.e. $\text{End}_{RH}(M)/J \cong \mathbb{F}$ かつ $\text{End}_{RG}(M^G)/J \cong \mathbb{F}$ (J は Jacobson radical)

$\text{End}_{RG}(M)$ は G -algebra $\text{End}_R(M)$ の G -invariants の集合である。
Brown-Poly は計算を工夫すれば \cong となる。(上記 1)
同じ原理から導かれたことを示す。同時に 1=2 に相当する拡張を示す。以下 Y の概略を説明する。

Def. A : R -algebra, $\varphi: RG \rightarrow A$: R -alg. homo.
が §2 で述べたとき A が interior G -algebra である。(\Leftrightarrow $g \in A, a \in A \Rightarrow g^{-1}a \varphi(g) \in A$ 且 $g^{-1} \in I = \{1\}$, I は A の G -algebra である。) $(A, \varphi), (A', \varphi')$ が interior G -algebra の時 $\alpha: A \rightarrow A'$ が interior G -algebra homo である $\Leftrightarrow \alpha$ は φ の R -alg. homo である 且 $\varphi' = \alpha \varphi$

$\in \text{End}_R M$ の中で

Example 2. $M : RG\text{-module}$. $E(M) = \text{End}_R M$ の中で

自然な準同型 $\varphi : RG \rightarrow E(M)$ は φ , すなはち $E(M)$ は interior G -algebra

$M' : RG\text{-module}$ とすると $E(M) \cong E(M')$ は interior G -algebra

$\Leftrightarrow M \cong M'$ は RG -modules.

Def. $G \supset H$, (B, φ) : interior H -algebra

double tensor $RG \otimes_H B \otimes_H RG \xrightarrow{\text{put}} \text{Cores}_H^G B$ は RG 上の

積を define する。

$$(g \otimes y \otimes h^{-1})(g' \otimes y' \otimes h'^{-1}) = \begin{cases} 0 & \text{if } h'g' \notin H \\ g \otimes y \varphi(h'g')y' \otimes h'^{-1} & \text{if } h'g' \in H \end{cases}$$

但し $g, g', h, h' \in G$, $y, y' \in B$.

これは φ , すなはち $\text{Cores}_H^G B$ は R -algebra とみなしての

$$\varphi_H^G : RG \longrightarrow \text{Cores}_H^G B \in \varphi_H^G(x) = \sum_{g \in G/H} xg \otimes 1 \otimes g^{-1}$$

である。すなはち φ_H^G は R -alg. homo. すなはち $\text{Cores}_H^G B$ は interior G -algebra である。基本的な性質を述べる。

$$[2.1] \quad (i) \quad 1 = \text{単位元} = \sum_{g \in G/H} g \otimes 1 \otimes g^{-1}$$

$$(ii) \quad \varphi_H^G(a)(g \otimes y \otimes h^{-1}) = ag \otimes y \otimes h^{-1} \quad \forall a \in RG$$

$$(g \otimes y \otimes h^{-1})\varphi_H^G(a) = g \otimes y \otimes h^{-1}a$$

である。 G -algebra とみなしての用法。

$$(iii) (g \otimes y \otimes h^{-1})^a = a' g \otimes y \otimes h'^{-1} a \quad \forall a \in G$$

coset 分解 $G = \bigcup gH + \text{fix } l \quad e_{g,h} = g \otimes 1 \otimes h^{-1}$ とかく。
 = 4 つは \sim 中の 3 行列単位と 1 つ。即ち

$$e_{g,h} e_{g',h'} = \delta_{g,g'} e_{g,h'} \quad \text{且} \quad 1 = \sum e_{g,g}$$

$$L < 1:$$

(iv) $\text{cores}_H^G B \cong M(n, B)$ full matrix ring over B
 of degree $n = [G : H]$

12・13] 1 = 1, 2 cores の背景を知る = もう少し。

Example 3. Example 2 の記号の下

$\text{cores}_H^G E(M) \cong \text{End}_R M^G$ as interior G -algebras

以下 $G \triangleright H$ と $L = (B, \rho)$ と interior ~~H~~ H -algebra.

$$\forall g \in G \Rightarrow L \quad B^{(g)} = \{f \in B : \rho(h)f\rho(h^{-1})^g = f, \forall h \in H\}$$

$B^{(g)}$ が B の unit を含むとき B が g -invariant とする。

$$[2.2] (i) B^{(1)} = B^H, \quad B^{(g)} B^{(g')} \subset B^{(gg')} \quad \forall g, g' \in G$$

$$(ii) B^{(gh)} = B^{(g)} \rho(h) \quad \forall g \in G, h \in H$$

$$(iii) B^{(g)} \ni u: \text{unit of } B \Rightarrow u^{-1} \in B^{(g^{-1})} \text{ 且 } B^{(g)} B^{(g')} = B^{(gg')}, \forall g' \in G$$

= 由より特に $G_B = \{g \in G : B$ が g -inv. $\}$ は G の subgroup

= $h \in B$ の inertial group. 上の「すくても証明は容易」。

Example 4. $M : RH\text{-mod.} \quad B = \text{End}_R M$

$$B \text{ が } g\text{-inv.} \iff M \cong g \otimes_H M \text{ as } RH\text{-mod.}$$

次に $A = \text{cores}_H^G B$ の G -invariants A^G を言及べし。

$$g \in G \text{ に対して } A_g = \sum_{x \in G} x \otimes B \otimes g^{-1} x^{-1} = \sum_{\substack{x, y \in G \\ yx = g^{-1}}} x \otimes B \otimes y \quad \text{※}$$

は gH の形で決まる $\Leftrightarrow G$ による共役で不变であり

$$A = \bigoplus_{g \in G/H} A_g, \text{ 従, } A^G = \bigoplus_{g \in G/H} (A_g)^G$$

[2.3] (i) $1 \otimes B^{(g)} \otimes g^{-1}$ は (元で) H -inv.

$$(ii) A_g^G = Tr_H^G (1 \otimes B^{(g)} \otimes g^{-1}) \quad (= \text{depends only on } gH)$$

$$(iii) Tr_H^G (1 \otimes u \otimes g^{-1}) Tr_H^G (1 \otimes u' \otimes g'^{-1}) = Tr_H^G (1 \otimes uu' \otimes (gg')^{-1})$$

$$\forall u \in B^{(g)}, u' \in B^{(g')}$$

Proof (i), (ii) は 容易。 (iii) は [1.6] を用いてできるが、直接示すと複雑となる。 $G = \bigcup_{x \in S} Hx = \bigcup_{y \in T} Hy$, 但し S は任意の代表系で $T = \{xg\}_{x \in S}$

$$Tr_H^G (1 \otimes u \otimes g^{-1}) = \sum_{x \in S} x \otimes u \otimes g^{-1} x^{-1}$$

$$Tr_H^G (1 \otimes u' \otimes g'^{-1}) = \sum_{y \in T} y \otimes u' \otimes g'^{-1} y^{-1}$$

$(x \otimes u \otimes g^{-1} x^{-1})(y \otimes u' \otimes g'^{-1} y^{-1})$ ガ (自明な形で) 消え去るには $g^{-1} x^{-1} y \in H$ の場合 $\Leftrightarrow y = xg$ の時 上の積は $x \otimes uu' \otimes g'^{-1} g^{-1} x^{-1}$ となる。 Q. E. D.

上の事より A^G における積が明確となった。 ここで $A_1^G = B^H$ と同一視される。 A_g^G が gH の形で決まることを強調して $A_g^G = A_{\bar{g}}^G$ とかく = とします。 いはば $\exists g \in G = G_B$ を仮定する。

[2.4] $G = G_B$ のとき

$$(i) A_{\bar{g}}^G A_{\bar{g}^{-1}}^G = A_1^G = B^H \quad \forall g \in G.$$

$$(ii) A_{\bar{g}}^G = B^H u_{\bar{g}} = u_{\bar{g}} B^H \quad \exists u_{\bar{g}} \in A_{\bar{g}}^G \text{ (unit)}$$

$$(\text{実際 } a \in A_{\bar{g}}^G \Rightarrow a = (au_{\bar{g}}^{-1})u_{\bar{g}} \in B^H u_{\bar{g}})$$

(iii) $A^G J(B^H) = J(B^H) A^G$ とし $J(A^G)$ は λ の両側で “アーリ” (J(*)は * a radical)

= = 2 体上の crossed product の理論と結びつけたが
2 の仮定をあく。

[2.5] (仮定) $B^H/J(B^H) = F_B$ は可換体 ($\supset F$)

$\bar{g} \in \bar{G}$ に対し $u_{\bar{g}}$ は σ conjugation に対する $\sigma(\bar{g}) = \bar{\sigma}(g)$

$$\sigma : \bar{G} \longrightarrow \text{Aut}(F_B/F) \quad \text{を得る}.$$

以上より

[2.6] $G = G_B$ 及び 仮定 [2.5] の下

$$\Lambda = A^G / J(B^H) A^G = \bigoplus_{\bar{g} \in \bar{G}} u_{\bar{g}} F_B \quad \text{with}$$

$$(i) u_{\bar{g}} u_{\bar{g}'} = u_{\bar{g}\bar{g}'} \alpha(\bar{g}, \bar{g}') \quad \exists \alpha(\bar{g}, \bar{g}') \in F_B^*$$

$$(ii) f u_{\bar{g}} = u_{\bar{g}} f^{\sigma(\bar{g})} \quad \forall f \in F_B$$

実際上の問題としては、 σ は α の “左から” と “右から” との
のが有難いわけであるが、 $F_B = F$ たゞ $\sigma = 1$ となるが
初めに述べた Clifford, Conlon の結果に対応している。

$\alpha \sim 1$ を保証するものとし

[2.7] $G = G_B$, G/H : p-group, F_B : 完全体 とする。

$$\Rightarrow \Lambda_{I\Lambda} \cong \text{End}_{F_i} F_B \quad (= F_i = F_B^G)$$

Proof. 假定から $\alpha < \infty$ かつ $\alpha \neq 1$ とする。 $L = \ker \sigma \cap I$ は I と Λ の

F_B -subspace で $\{u_{\bar{g}} - 1 \mid \bar{g} \in L\}$ で生成されたものとする。 $\bar{G} \triangleright L$ 且 $\Lambda I = I\Lambda$ 且 中零。 $(F_B L)$ は F_B -group ring, $I = J(F_B L)$

$$\Lambda_{I\Lambda} = \bigoplus_{\bar{g} \in \bar{G}/L} u_{\bar{g}} F_B \quad (\text{crossed product}) \quad \bar{G}/L = \text{Gal}(F_B/F_i)$$

であるから $\alpha < \infty$ かつ $\alpha \neq 1$ とする。 $\Lambda_{I\Lambda} \cong \text{End}_{F_i} F_B$. Q.E.D.

$$G > G_B \text{ の場合を } \begin{cases} \text{2.3.} \\ \text{2.5.} \end{cases} \text{ とする。 } A^G = \bigoplus u_{\bar{g}} B^H = \sum_{\bar{g} \in \bar{G}_B} u_{\bar{g}} B^H \oplus M \text{ (その他)}$$

すなはち g を fix する B^H ($g \in G_B$ とする)

$$A_{\bar{g}}^G = \text{Tr}_H^G ((1 \otimes B^{(g)}) \otimes \bar{g}^{-1}) \cong B^{(g)} \cong \text{Tr}_H^{G_B} ((1 \otimes B^{(g)}) \otimes g^{-1}) = A_g^{G_B}$$

よって $A^G = A^{G_B} \oplus M$ と書ける。

[2.8] 假定 [2.5] の下 $A^G = A^{G_B} + J(A^G)$

Proof. 初めに $R = F$ とします。よって $A^G M A^G$ が中零 とする = ことを言えます。 B^H が local である事より $\text{Tr}_H^G ((1 \otimes B^{(g)}) \otimes g^{-1})$ は nilpotent (if $g \notin G_B$) である事が [2.2], [2.3] を用いて示せます。したがって $A^G M A^G$ の F -basis が

nilpotent で $\bar{A}_3 = \bar{A}_2$ の \bar{A}_3 。

したがって

[2.9] $G \triangleright H$, G/H : p-group $B \in$ interior H -algebra

$B^H/J(B^H) = F_B$ は完全体とする。 $A = \text{Cores}_H^G B$ とすれば

$$A^G/J(A^G) \cong \text{End}_{F_H} F_B, \quad F_B \supseteq F_H \supseteq F$$

直積の系とく

[2.10] (Green) $G \triangleright H$, G/H : p-group $M \in$ indecomposable

RH -mod. と $L \in \text{End}_{RH} M/J$ は完全体とする

$\Rightarrow M^G$ は同型を直既約加群の直和

Cores 概念の応用としては例えは Puig による p-可解群の場合の nilpotent block の特徴づけがある (Santa Cruz 1979)

尚 Green の定理で G/H が p-group となるのは一般論とくに過大でない。むしろ必要条件に近いものである。即ち古くから知られる事である。

[2.11] (Tucker 1963) F : 代数的閉体 $G \triangleright H$, $\text{ch } F = p > 0$

M : irreducible FH -mod. $I \in M$ の inertial group

= σ とき M^G が indecomposable $\Rightarrow I/H$ は p-group

証明には二章の初めに上げた Cliftnd, Conlon の結果を使えばよい。

§3. Sylow theory for blocks

Alperin - Broué による モジュラ-表現への Sylow theory

導入、及びその応用としての Broué-Puig はまた一般指標のある構成法が中心となるが、共に論文の形で“発表されないので解説は避け筆者にて若干気を付けておこう”との事と一寸書きせていただきます。

$G \triangleright P$: p -subgroup, $e \in FG(p)$ の block (idempotent) とするとき (P, e) を Brauer pair とする。

Def. 2 の Brauer pair $(Q, f), (P, e)$ が $(Q, f) \subset (P, e)$ とは ① $Q \subset P$ (従って $(FG)^P \subset (FG)^Q$)

② $\forall i \in P \setminus (FG)^P$ s.t. $B_{\text{rep}}(i)e = B_{\text{rep}}(i) \neq 0$ に対して $B_{\text{rep}}(i)f = B_{\text{rep}}(i)$

Broué-Puig によれば、 (P, e) は P の subgroup Q に対する $\exists f$: block of $FG(Q)$ があり $(Q, f) \subset (P, e)$ がもとより definition が \subset は Alperin-Broué で定義されたのと一致する。Alperin-Broué の definition は inductive でありますからやはり同じようにもなります。一度上での definition は \subset です。 $B_{\text{rep}}(i)$ は $FG(Q)$ で原始中等元分解されました。 $B_{\text{rep}}(i) = \sum e_k$. 各 e_k は \subset $FG(Q)$ の block f_k で $e_k f_k = e_k$ です。なぜなら f_k は $FG(Q)$ の block だからです。Broué-Puig は f_k が e_k であることを示す (s.t. $B_{\text{rep}}(i)e = B_{\text{rep}}(i)$) はもうさすがに e だけで一意的に決まる事を主張します。なぜか e ある。もちろん ② を満たす f は存在すれば一意的です。

あるから存在だけが問題であるが ($P=0$) による induction to $n-1$ の "不思議な事実" の中味まではよくわからぬ。本報告集で奥山氏が p' -subgroup H に対する $(FG)^H = \{1\}$ の問題提起されてゐるが、 $(FG)^P$ に $\{1\}$ も何か掘り下げるものがゐると思ふ。

II. 多元環の直既約表現論との関係

Roggenkamp による R の結果の証明方法に興味をもつて簡単に 3, 4 を見た。

" R を $\widehat{\mathbb{Z}_p}$ の不分岐拡大。 $B \in \text{defect } 1$ の p -block, $\oplus RG$, B が e 1 口の直カク proj. module $\neq 0$ ならば B は 3 口の直カク lattice $\neq 0$ 。"

最終的に Graph の表現論に持ちこむ中で "あるが" 詳細は Roggenkamp のモントリオール大における Lecture note (市販三省) にある。

以上