

或る写像の拡張可能性

東工大 理学部 笹尾 謙也 (Keiya Sasao)

$p: X \rightarrow S^n$ を構造群が G の A -バンドルとして、また
その特性写像: $(S^n, *) \rightarrow (G, e_0)$, 更に G の A への
作用 $\varphi: (G, e_0) \rightarrow (A^A, 1_A)$ とする。連続写像
 $f: A \rightarrow Y$ が与えられたときにはそれを連続写像: $X \rightarrow Y$ に
拡張する際の障害はなにかを考えようとするのが本稿の目標
である。まず; X の構成に関する次の補題から始めよう。

補題1. $X = A \cup D^n \times A$, ここで $S^{n-1} \times A$ の点 (v, a) と
 A の点 $\varphi(v)(a)$, 以後 $\varphi(v) \cdot a$ と略記, とは同一視される
ものとする。

この補題は James-Whitehead の結果 ($A = S^m$) の一
般化になっている。

注1. 射影 $p: X \rightarrow S^n$ は、補題1に関して、次のように
に説明される。

$$X \rightarrow X/A = D^n \times A / S^{n-1} \times A \rightarrow S^n \times A / \ast \times A \rightarrow S^n. \quad (1)$$

補題2. 次の図式はファイバー空間の Pull-back である。

$$\begin{array}{ccc} Y^X & \xrightarrow{i^*} & Y^{D^n \times A} = Z^{D^n} \\ \downarrow r_1 & & \downarrow r_2 \\ Z = Y^A & \xrightarrow{\tilde{\gamma}^*} & Y^{S^{n-1} \times A} = Z^{S^{n-1}} \end{array}$$

図中で r_i は写像の定義域を制限することで得られるファイバー空間で、 i^* は挿入写像 $i: D^n \times A \rightarrow X$ から誘導され、 $\tilde{\gamma}^*$ は $\tilde{\gamma}^*(h)(v, a) = h(\tilde{\gamma}(v) \cdot a)$ と定められている。

さて、写像 $f: A \rightarrow Y$ が写像 $\tilde{f}: X \rightarrow Y$ に拡張できるとは、 $r_1(\tilde{f}) = f$ が成り立つことであるが、このよう \tilde{f} が存在する必要十分条件は、補題2によれば、 $\tilde{\gamma}^*(f)$ が r_2 -像に含まれることである。更に次の補題が成り立つ。

補題3. 写像 $f: A \rightarrow Y$ が 写像 $\tilde{f}: X \rightarrow Y$ に拡張できる必要十分条件は、

$$f_*^*(\tilde{f}_*(\tilde{\gamma})) = 0 \quad (\in \pi_{n-1}(Y^A, f))$$

である。

なぜならば、 $\tilde{\gamma}^*(f)(v)(a) = f(\tilde{\gamma}(v) \cdot a)$ だから、

$$\tilde{\gamma}^*(f): (S^{n-1}, *) \rightarrow (Z, f) = (Y^A, f)$$

と考えられる。これが r_2 -像に含まれるとは、 $\pi_1(Z, f)$ の $\pi_{n-1}(Z, f)$ への作用におけるゼロ元の orbit に含まれることを意味している。つまり、 $\pi_{n-1}(Z, f)$ の元として

(2)

ゼロ元である。補題3は次の図式で考えると見易い。

図2.

$$\begin{array}{ccccc}
 \pi_{n-1}(G_0, e_0) & \xrightarrow{\varphi_{*0}} & \widetilde{\pi}_{n-1}(A_0^A, 1_A) & \xrightarrow{f_*^A} & \widetilde{\pi}_{n-1}(Y^A, f) \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 \pi_{n-1}(G_1, e_0) & \xrightarrow{\varphi_*} & \widetilde{\pi}_{n-1}(A^A, 1_A) & \xrightarrow{f_*^A} & \widetilde{\pi}_{n-1}(Y^A, f) \\
 \downarrow \omega_* & \searrow & \downarrow \omega_* & & \downarrow \omega_* \\
 & & \widetilde{\pi}_{n-1}(A, a_0) & \xrightarrow{f_*} & \widetilde{\pi}_{n-1}(Y, y_0)
 \end{array}$$

ここで、 A_0^A, Y^A, G_0 は基点を保つ写像でつくられる空間で、 $y_0 = f(a_0)$ 、 ω は φ や f の evaluation map によるものである。

注2. $\varphi_*(\xi)$ はバンドルの アイバー・ホモトピー特性類であり、 $\omega_* \varphi_*(\xi) = 0$ はバンドルが横断面をもつことと同値である。猶、 φ_* は J -homomorphism であることを注意しておく。

ところで、補題3によれば、われわれの目標の障害は、群 $\widetilde{\pi}_{n-1}(Y^A, f)$ の元として得られたが、この群は τ に関するもので、この点を改良する必要があると思われる。しかししながら、一般的にはこれをやうような良い手段は知られていない。そこで、応分の仮定や条件が必要となるだろう。

仮定. Y は group で、 y_0 をその単位元とし、写像 $f: A \rightarrow Y$ は $f(a_0) = y_0$ を満すものとする。

(3)

写像 $\psi_f : (Y^A, f) \rightarrow (Y^A, *)$ を

$$\psi_f(h)(a) = h(a) f(a)^{-1}$$

と定めよう。 ψ_f は同相写像だから、同型写像：

$$\psi_{f*} : \widetilde{\pi}_{n-1}(Y^A, f) \rightarrow \widetilde{\pi}_{n-1}(Y^A, *)$$

を誘導する。このとき次の可換図を考えよう。

図3.

$$\begin{array}{ccc} & & \widetilde{\pi}_{n-1}(Y_0^A, *) \\ & & \downarrow \quad \uparrow \quad \textcircled{2}_* \\ \textcircled{2}(h)(a) = h(a) h(a_0)^{-1}, \quad \widetilde{\pi}_{n-1}(Y^A, f) & \xrightarrow{\psi_{f*}} & \widetilde{\pi}_{n-1}(Y^A, *) \\ \downarrow \omega_* & \cong & \downarrow \omega_* \quad \uparrow \quad \textcircled{1}_* \\ \textcircled{1}(y)(a) = y & , \quad \widetilde{\pi}_{n-1}(Y, y_0) & \xrightarrow{id} \widetilde{\pi}_{n-1}(Y, y_0) \end{array}$$

写像 ①と②の存在は次の補題を保證している。

補題4. $\widetilde{\pi}_{n-1}(Y^A, *) \cong \widetilde{\pi}_{n-1}(Y, y_0) \oplus [S^{n-1}A, Y]$ 。

したがって、われわれにとっての問題は $\psi_{f*}(f_*^*(\varphi_*(\xi)))$ に上記の直和分解を適用して、その直和因子を求めることになる。図2, 図3の示すところによれば、 $\textcircled{1}$ 直和因子は

$$f_*(\lambda_\xi^A) \quad (\lambda_\xi^A = \omega_* \varphi_*(\xi) = \text{横断面の障害})$$

である。 $\textcircled{2}$ 直和因子を記述するためには少しく準備を要する。以下、一般論を展開する。 (H, h_0) を位相群とする。写像 $h : (A, a_0) \rightarrow (H, h_0)$ に対して写像 $O(h)$ を

$$O(h)(g, a) = h(g \cdot a) h(a)^{-1} h(ga_0)^{-1}$$

と定めれば、 $O(h)$ は写像 $G \times A \rightarrow H$ を与える。この

(4)

写像は座標軸 $G \vee A$ の上で定義だから、写像：

$$G \times A / G \vee A = \underline{G \wedge A} \rightarrow H$$

を定める。さきと同じ記号を使えば、 $O(h)$ ガルに問ひ、
ホモトピー不变だから、結局ひとつ対応：

$$\underline{O} : [A, H]_0 \rightarrow [\underline{G \wedge A}, H]_0$$

が得られる。この対応は、写像 $\alpha : A \rightarrow H$ の“準同型性”的障害を与えていようと考えられる。実際、 A が群ならば、
 $O(h) = O$ は h がホモトピー準同型であることを示している。
この対応の性質を 1, 2 説べておこう。

補題5. $P : H \rightarrow K$ ガ準同型ならば。

$$P_* (O(h)) = O(P_*(h))$$

つまり次の図式は可換である。(O の naturality)

$$\begin{array}{ccc} [A, H]_0 & \xrightarrow{\underline{O}} & [\underline{G \wedge A}, H]_0 \\ \downarrow P_* & \underline{O} & \downarrow P_* \\ [A, K]_0 & \xrightarrow{\underline{O}} & [\underline{G \wedge A}, K]_0 \end{array}$$

補題6. $\alpha : (B, b_0) \rightarrow (A, a_0)$ ゲ、 B ガ G -空間で
 α ガ G -同変写像ならば $\underline{O} \cdot \alpha^* = \alpha^* \cdot \underline{O}$ である。

$$\begin{array}{ccc} [A, H]_0 & \xrightarrow{\underline{O}} & [\underline{G \wedge A}, H]_0 \\ \downarrow \alpha^* & \underline{O} & \downarrow \alpha^* \\ [B, H]_0 & \xrightarrow{\underline{O}} & [\underline{G \wedge B}, H]_0 \end{array}$$

は可換である。

一般に、 H が群ならば“自然に”ホモトピー集合 $[, H]_*$ に群の構造が入るわけであるが、この群構造については、対応 O は準同型になつてゐる。この端については次の補題 7 が成り立つ。まず、Commutator map c

$$c : H \wedge H \longrightarrow H, \quad c(x \wedge y) = xyx^{-1}y^{-1}$$

で定めよ。

補題 7. $f_1, f_2 : (A, a_0) \longrightarrow (H, h_0)$, $\text{O}(a) = f_1(a)f_2(a)$ とすと。このとき、次の等式が成り立つ。

$$\text{O}(h)(g \wedge a) = \text{O}(f_1)(g \wedge a) \cdot c(f_1(ga_0) \wedge f_1(a) \wedge \text{O}(f_2)(g \wedge a)) \cdot$$

$$\text{O}(f_2)(g \wedge a) \cdot c(f_1(ga_0) \wedge c(f_1(a) \wedge f_2(ga_0))) \cdot c(f_1(a) \wedge f_2(ga_0)).$$

なぜならば

$$\begin{aligned} \text{O}(h)(g \wedge a) &= f_1(g \wedge a)f_2(g \wedge a)f_1(a)^{-1}f_1(ga_0)^{-1}f_1(ga_0)^{-1} \\ &= f_1(g \wedge a)f_1(a)^{-1}f_1(ga_0)^{-1}f_1(ga_0)f_1(a)^{-1}f_2(g \wedge a)f_2(a)^{-1}f_2(ga_0)^{-1} \\ &\quad - f_2(g \wedge a)f_1(a)^{-1}f_2(ga_0)^{-1}f_1(ga_0)^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \text{O}(f_1)(g \wedge a) \cdot c(f_1(ga_0) \cdot f_1(a) \wedge \text{O}(f_2)(g \wedge a)) \cdot \text{O}(f_2)(g \wedge a) \cdot \\ &\quad f_1(ga_0) \cdot f_1(a) \cdot f_2(ga_0) f_1(a)^{-1} f_2(ga_0)^{-1} f_1(ga_0)^{-1} \\ &= \text{O}(f_1)(g \wedge a) \cdot c(f_1(ga_0) \cdot f_1(a) \wedge c(f_2)(g \wedge a)) \cdot \text{O}(f_2)(g \wedge a) \cdot \\ &\quad c(f_1(ga_0) \wedge c(f_1(a) \wedge f_2(ga_0))) \cdot c(f_1(a) \wedge f_2(ga_0)) \end{aligned}$$

例 1 $A = G = H = S^3$: 普通の群構造,

$$h_m : S^3 \longrightarrow S^3, \quad h_m(x) = x^m \quad (\text{Power.map})$$

$$\text{このとき}, \quad \text{O}(h_m) = \{-m(m-1)/2\} \subset \pi_6(S^3) \cong \mathbb{Z}_{12}.$$

(6)

なぜならば $f_1(x) = x^{m-1}, f_2(x) = x$ よりして補題 7 を適用する。すると、

$$1. \quad \underline{O}(f_2) = 1 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{自明}$$

$$2. \quad C(f_1 \cdot f_1 \wedge \underline{O}(f_2)) = 1$$

$$3. \quad C(f_1|_{G_0} \wedge f_2|_{G_0}) = -(m-1)\mathbb{Z}$$

$$4. \quad C(f_1|_{G_0} \wedge C(f_1|_{G_0} \wedge f_2|_{G_0})) = 1$$

がわかるから $\underline{O}(h_m) = \underline{O}(h_{m-1}) - (m-1)\mathbb{Z}$, $\forall m$

$$\underline{O}(h_m) = \{-m(m-1)/2\}\mathbb{Z}$$

$\therefore \tau : S^6 \rightarrow S^3$ は Bloch-Massey 定理である。

$$3. \quad S^3 \wedge S^3 \xrightarrow{\quad} S^3 \wedge S^3 \xrightarrow{\quad} S^3$$

$$\parallel \quad f_1 \wedge f_2 \quad \parallel \quad C = \infty \mathbb{Z}$$

$$S^6 \xrightarrow{\deg. m-1} S^6$$

$$4. \quad S^3 \wedge S^3$$

$$\xrightarrow{\quad d \times 1 \quad \downarrow \simeq 0 \quad} S^3 \wedge (S^3 \wedge S^3) \xrightarrow{\quad} S^3 \wedge S^3 \xrightarrow{\quad C = \mathbb{Z} \quad} S^3$$

$$f_1 \wedge C(f_1, f_2)$$

注 3. C. A. McGIBON は一般の G で, $h_m : G \rightarrow G$ が準同型にはじめると十分条件は、適当な自然数 N_G が存在して $m(m-1)/2 \equiv 0 \pmod{N_G}$ が成り立つことを示した。たとえば $N_{S^3} = 12$.

(Quart. J. Math. oxford, 31 (1980)).

(7)

さて、まとめて見よう。図2, 図3などや定義から、求め
た $\psi_{f_*}(f^*(\varphi_*(\xi)))$ の才2直和因子は合成写像:

$$\begin{array}{ccccc} S^{n-1} \times A & \longrightarrow & G \times A & \longrightarrow & Y \\ \Downarrow & & \Downarrow & & \Downarrow \\ (v, a) & \longrightarrow & (\xi(v), a) & \longrightarrow & h(\xi(v) \cdot a) \cdot h(a)^{-1} \cdot h(\xi(v) \cdot a_0)^{-1} \end{array}$$

から得られる写像:

$$\begin{array}{ccc} S^{n-1} \times A & \longrightarrow & G \times A \longrightarrow Y \\ \xi_{n-1} \downarrow_A & & \underline{\Omega h} \downarrow \end{array}$$

であることをわかる。よって次の命題が得られた。

命題1 Yを位相群, $f: (A, a_0) \rightarrow (Y, y_0)$ ならば

$$\psi_{f_*}(f^*(\varphi_*(\xi))) = f_*(\lambda_{\xi}^A) \oplus \underline{\Omega h}_*(\xi_n \cdot 1_A)$$

例2. $G_m = SO(n), U(n), SP(n)$ とする。 ξ_n を

標準的主バンドル: $G_m \rightarrow S^{dn-1}$ とする, $\xi_n \in \prod_{dn-2} G_{n-1}$.

位相群 H に対して, 準同型写像 $G_{n-1} \xrightarrow{f} H$ は $f_*(\xi_n) = 0$ の
ときに限り G_m に拡張できる。

例3. 中写像: $G_{n-1} \xrightarrow{\tau_m} G_{n-1}$ ($g \rightarrow g^m$) は,

$$\underline{\Omega(h_m)}(\xi_n \cdot 1_{G_{n-1}}) = 0, m\xi_n = 0$$

のときに限り, 写像 $G_n \rightarrow G_{n-1}$ に拡張できる。つまり.

$$S^{dn-2} \times G_{n-1} \xrightarrow{\xi_n \cdot 1_{G_{n-1}}} G_{n-1} \times G_{n-1} \xrightarrow{\underline{\Omega(h_m)}} G_{n-1} = 0.$$

さて, 命題1の拡張を考えよう。今度は, Hを位相群と
し, Yは左-H-空間としてその作用を $y \cdot h$ とかく。

$f : (A, a_0) \rightarrow (H, h_0)$ とし, $i_H : H \rightarrow Y$ を

$$i_H(h) = y_0 \cdot h$$

と定める。写像 $f' = i_H \circ f : (A, a_0) \rightarrow (Y, y_0)$ を
写像 $X \rightarrow Y$ に拡張する障害を求めるためには次の図式を考
えよう。

図5.

写像①, ②はすでに図3で定められているので、写像③を
定めよう。写像 $\omega : A \rightarrow Y$ に対して、

$$\text{③}(h)(a) = h(a) f(a)^{-1} : A \rightarrow Y$$

とする。 $\text{③}(f') = \text{定数 } y_0$ であるから、 $\text{③} : (Y^A, f') \rightarrow (Y^A, y_0)$
となる。定義から、図5は可換図式なことは明らか
であろう。そこで、

$$\begin{aligned} \pi_{n-1}(Y^A, *) &\cong \pi_{n-1}(Y, y_0) \oplus \pi_{n-1}(Y^A, y_0) \\ &\cong \pi_{n-1}(Y, y_0) \oplus [S^{n-1}A, Y]. \end{aligned}$$

という直和分解を利用する次の命題が得られる。

命題2. Y を右-H-空間といし、包含写像を $i(h) = y_0 h$ で定めよ。 $\phi : (A, g_0) \rightarrow (H, h_0)$ の写像 $X \rightarrow Y$ に拡張できる必要十分条件は $(i : (H, h_0) \rightarrow (Y, y_0))$

$$\underline{i_*(f_*(\xi_A^A))} = 0, \quad \underline{i_*\{O(f)_*(\xi \wedge 1_A)\}} = 0$$

$$\left(\begin{array}{c} \cap \\ \pi_{n-1}(Y, y_0) \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{c} \cap \\ [S^{n-1} A, Y]_0 \end{array} \right)$$

が成り立つことである。

系3. $X_{\xi} \rightarrow S^n$, 主G-バンドル ($\dim G < n-1$)

$X_n \rightarrow S^n$, 主H-バンドル

$f : (G, g_0) \rightarrow (H, h_0)$

このとき, f が写像 $X_{\xi} \rightarrow X_n$ に拡張できる必要十分条件は, 次の2つが成り立つことである。

1. $f_*(\xi) = m \eta$ となる整数 m が存在する。

2. $O(f)_*(\xi \wedge 1_G) \in \pi_*([S^{n-1} G, S^{n-1}]_0)$

例4. $X_{\xi} \rightarrow S^n$ ($n > 4$) を主 S^3 -バンドルとする。

orientation reversing homotopy equiv: $X_{\xi} \rightarrow X_{\xi}$ が存在する必要十分条件は、

$$2\xi = 0, \quad T \circ E_{\xi}^3 \in \pi_0 \pi_0(S^{n-1})$$

が成り立つことである。 T は Blaschke-Milnor map $S^6 \rightarrow S^3$.

注4. $X_{\xi_i} \rightarrow S^n$ が主 S^3 -バンドル ($i = 1, 2$) のとき $X_{\xi_1} \sim X_{\xi_2} \Leftrightarrow \xi_2 = \pm \xi_1 \Leftrightarrow X_{\xi_1} \cong X_{\xi_2}$ (homeo).

(10)

重要な応用例を次に述べる。

応用例5. $X = X_3 \rightarrow S^n$ を主 G -バンドルとする。

$$\text{このとき, } \underline{\text{Serre-fibration}}. F \rightarrow (X, G)_{\circ}^{(X, G)} \xrightarrow{\psi} G^G. \text{ が}$$

$$\begin{array}{ccc} \psi & & \psi \\ \downarrow & & \downarrow \\ I_X & & I_G \end{array}$$

得られる。写像 $f: (G, g_0) \rightarrow (G, g_0)$ の下記と、

$$\psi_1(f) = f_*(\xi) \cdot \{\xi\} \in \pi_{n-1}(G, g_0) / \{\xi\}$$

$$\psi_2(f) = \underline{o}(f)_*(\xi, I_G) / \in [S^{n-1}G, G]_0 / \xi_*[S^{n-1}G, S^n]$$

と定めれば、自然な系列:

$$\pi_0((X, G)_{\circ}^{(X, G)} |_X) \rightarrow \pi_0(A^G, I_G) \xrightarrow{\psi_1} \pi_{n-1}(G) / \{\xi\}$$

つまり、

$$= [X, G]_{\circ} \xrightarrow{\quad} [G]_{\circ} \xrightarrow{\quad} \pi_0(G) / \{\xi\} \times [S^{n-1}G, G] / \xi_*[S^{n-1}G, S^n]$$

は exact である。

注5. 図1のファイバー空間と上記の Serre-fibration は次のよう連結されている。とくに ファイバーは同じである。

図1で $A = G$, $Y = X$ における

$$\begin{array}{ccccc} (X, G) & \xrightarrow{(X, G)} & X^X & \longrightarrow & X^{D^n \times G} = \Sigma^{D^n} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ G^G & \xleftarrow{\quad} & X^G & \longrightarrow & X^{S^{n-1} \times G} = \Sigma^{S^{n-1}} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ I_G & \xleftarrow{\quad} & i_G & \xrightarrow{\quad} & \uparrow \\ & & & & G^{S^{n-1} \times G} = (G^G)^{S^{n-1}} \end{array}$$

(11)

以下で、 $G = G_1 \times G_2$ の場合の適用例を考えてみよう。

したがって、状況は次のようになる。

$$\xi = \xi_1 \times \xi_2 : S^* \rightarrow G = G_1 \times G_2, \quad \xi_i : (S^*, *) \rightarrow (G_i, *)$$

$$f : G = G_1 \times G_2 \rightarrow G_1 \times G_2 = G, \quad f(e_0) = e_0$$

ところ、 $O(f)_*(\xi_1 1_G) : S^* \rightarrow G$ を記述する = と
である。


$\rho_i : G = G_1 \times G_2 \rightarrow G_i$ を各因子への射影とする。補
題5を用いて、まず

$$\begin{aligned} O(f)_*(\xi_1 1_G) &= \rho_{1*}(O(f)_*(\xi_1 1_G)) \oplus \rho_{2*}(O(f)_*(\xi_1 1_G)) \\ &= O(f_1)_*(\xi_1 1_G) \oplus O(f_2)_*(\xi_1 1_G), \quad f_i = \rho_i f. \end{aligned}$$

更に、 $\xi = \xi_1 + \xi_2$ なり。

$$\begin{aligned} O(f)_*(\xi_1 1_G) &= (O(f_1)_*(\xi_1 1_G) + O(f_1)_*(\xi_2 1_G)) \\ &\quad \oplus (O(f_2)_*(\xi_1 1_G) + O(f_2)_*(\xi_2 1_G)) \end{aligned}$$

ここで、 $[S^* G, G]$ やか、 $[S^* G, G_i]$ ガアベル群で
あることを使ってみる。次の図式が見易い。



もし $G_1 \rightarrow G_2$ ならば $f_1 \rightarrow f_2$ すればよい。

$$\text{注6. } S^*_n G \cong S^*_n G_1 \vee S^*_n G_2 \vee S^*_n G_1 \wedge G_2$$

写像 $f_i : G = G_1 \times G_2 \rightarrow G_i$ は次のようになります。

$f_{f,i} : G_j \rightarrow G_i$, $f_{\beta,i} : G_1 \wedge G_2 \rightarrow G_i$ で、 β は基底を保ち、 $\beta = 1, 2$ です。 β のとき

$$f_i(x, y) = f_{\beta,i}(\underline{x_1 y}) \cdot f_{\beta,i}(\underline{x}) \cdot f_{\beta,i}(\underline{y}) \quad i = 1, 2$$

したがって、 $G_i = H$, $f_{f,i} = h_g$, $f_i = h : H \rightarrow H$

と記号を簡略化する。ここで $h(x, y) = h_3(x_1 y) h_1(x) h_2(y)$.

このとき、図1の2つの写像は次のようになります。

$$\textcircled{1} (\nu_1(x, y)) = h(\xi_1(\nu) \cdot x, y) \cdot h(x, y)^{-1} \cdot h(\xi_1(\nu), y)^{-1}$$

$$\textcircled{2} (\nu_1(x, y)) = h(x, \xi_2(\nu) \cdot y) \cdot h(x, y)^{-1} \cdot h(y, \xi_2(\nu))^{-1}$$

ここで2つの写像を定義する。

$$\textcircled{1}' : G_1 \wedge G \rightarrow H, x'_1(x, y) \rightarrow h(x_1 y) h(x, y)^{-1} h(x'_1 y)^{-1}$$

$$\textcircled{2}' : G_2 \wedge G \rightarrow H, y'_1(x, y) \rightarrow h(x, y y') h(x, y)^{-1} h(x, y')^{-1}$$

これらは $h(x, y)$ の分解に従じて次のようになる。

$$\textcircled{1}'' h_3(x_1 x_1 y) h_1(x_1 x) h_1(x)^{-1} h_3(x_1 y)^{-1} h_1(x')^{-1} : G_1 \wedge G \rightarrow H.$$

$$\textcircled{2}'' h_3(x_1 y y') h_1(x) h_2(y y') h_2(y)^{-1} h_1(x)^{-1} h_3(x_1 y)^{-1} h_2(y')^{-1}.$$


$\textcircled{1}''$ を更に次の形に書き直す。

$$\textcircled{1}'' \underbrace{h_3(x_1 x_1 y)}_{\triangle} h_3(x_1 y)^{-1} \underbrace{h_3(x_1 y)}_{\square} \cdot \underbrace{h_3(x_1 y)}_{\triangle} h_3(x_1 y)^{-1} \cdot \underbrace{h_1(x_1 x)}_{O(h_1)} h_1(x)^{-1} h_1(x)^{-1}$$

$$= \triangle \cdot \square \cdot C(h_3(x_1 y), O(h_1)(x_1 x)) \cdot O(h_1) \cdot C(h_3(x_1 y), h_1(x))$$

これらの定義域を図示すれば次のようになっている。順序

$$\text{さて} \quad G_1 \wedge G = G_1 \wedge (G_1 \times G_2)$$



同様に(1).

$$\textcircled{①}'' \quad h_3(x_1 y' y) h_3(x_1 y) h_3(x_1 y')^{-1} \cdot h_3(x_1 y') \cdot$$

$$C(h_3(x_1 y) h_1(x) \wedge O(h_2)(y/x)) \cdot O(h_2)(y/x) \cdot$$

$$C(h_3(x_1 y) \wedge C(h_1(x) \wedge h_2(y'))) \cdot C(h_1(x) \wedge h_2(y')) \cdot$$

$$C(h_3(x_1 y) \wedge h_2(y'))$$

が得られる。結果の整理のため新らしい記号を導入する。

$$\theta_1, O_2 : [G_1 \wedge G_2, H]_0 \rightarrow [G_1 \wedge G_1 \wedge G_2, H]_0$$

を(1)', (2)''の第1項で定めよ。すなはち $\theta : G_1 \times G_2 \rightarrow G_1 \wedge G_2$

$$\textcircled{①}'' = O_1(h_3)(1 \wedge \theta) \cdot h_3(1 \wedge P_{r_2}) \cdot C(h_3(x_1 y) \wedge O(h_1)(1 \wedge P_{r_1})) \cdot O(h_1)(1 \wedge P_{r_2}) \cdot$$

$$C(h_3(x_1 y) \wedge h_1(x')) : G_1 \wedge G = G_1 \wedge (G_1 \times G_2) \rightarrow H.$$

$$\textcircled{②}'' = O_2(h_3)(1 \wedge \theta) \cdot h_3(T(1 \wedge P_{r_1})) \cdot C(h_3(x_1 y) h_1(x) O(h_2)(y/x)) \cdot$$

$$O(h_2)(1 \wedge P_{r_2}) \cdot C(h_3(x_1 y) \wedge C(h_1(x) \wedge h_2(y'))) \cdot$$

$$C(h_1 \wedge h_2)(T(1 \wedge P_{r_1})) \cdot C(T(h_2 \wedge h_3)(1 \wedge \theta)) : G_2 \wedge G_1 \rightarrow H.$$

と書き換えられよ。すなはち値域が H だから、 $\textcircled{①}''_H, \textcircled{②}''_H$ と

改めて書けば次の命題が得られる。

命題4. $f: G = G_1 \times G_2 \rightarrow G_1 \times G_2 = G$ が

$$f(x, y) = (f_{31}(x \wedge y), f_{11}(x), f_{21}(y)) \rightarrow (f_{32}(x \wedge y), f_{12}(x), f_{22}(y))$$

のとき、

$$\begin{aligned} C(f)_*(\xi_1 \wedge \xi_2) : S_n^* G &= S_n^*(G_1 \times G_2) \rightarrow G_1 \times G_2 = G \text{ は}, \\ &= \left\{ \begin{array}{l} \textcircled{①}''_{G_1}(\xi_1 \wedge \xi_2) + \textcircled{②}''_{G_1}(\xi_2 \wedge \xi_1) \end{array} \right\} \oplus \left\{ \begin{array}{l} \textcircled{①}''_{G_2}(\xi_1 \wedge \xi_2) + \textcircled{②}''_{G_2}(\xi_2 \wedge \xi_1) \end{array} \right\} \\ &\text{で与えられる。} \end{aligned}$$

上記公式をもつて議論すれば次のようになる。

$$\textcircled{④}''_H(\xi_1 \wedge \xi_2) : S_n^* G \cong S_n^* G_1 \vee S_n^* G_2 \vee S_n^* G_1 \wedge G_2 \rightarrow H$$

$$C(h_1)(\xi_1 \wedge \xi_2) : S_n^* G_1 \rightarrow G_1 \wedge G_1 \rightarrow H$$

$$h_3(\xi_1 \wedge \xi_2) : S_n^* G_2 \rightarrow G_1 \wedge G_2 \rightarrow H$$

$$\left\{ \begin{array}{l} C(h_3)(\xi_1 \wedge \xi_2) \\ C(h_3 \wedge h_1)(\xi_1 \wedge \xi_2) \end{array} \right.$$

$$C(h_3 \wedge h_1)(\xi_1 \wedge \xi_2) : S_n^*(G_1 \wedge G_2) \rightarrow G_1 \wedge (G_1 \wedge G_2) \rightarrow H$$

$$\left. \begin{array}{l} C(h_3 \wedge h_1)(\xi_1 \wedge \xi_2) \\ \textcircled{④}''_H(\xi_1 \wedge \xi_2) \end{array} \right\}$$

$$\textcircled{④}''_H(\xi_1 \wedge \xi_2) : S_n^* G \cong S_n^* G_1 \vee S_n^* G_2 \vee S_n^* G_1 \wedge G_2 \rightarrow H$$

$$h_3 T(\xi_1 \wedge \xi_2) : S_n^* G_1 \rightarrow G_1 \wedge G_1 \rightarrow G_1 \wedge G_2 \rightarrow H$$

$$C(h_2)(\xi_1 \wedge \xi_2) : S_n^* G_2 \rightarrow G_2 \wedge G_2 \rightarrow H$$

$$C(h_1 \wedge h_2) T(\xi_1 \wedge \xi_2) : S_n^* G_1 \rightarrow G_2 \wedge G_1 \rightarrow G_1 \wedge G_2 \rightarrow H$$

$$\left\{ \begin{array}{l} C(h_3)(\xi_1 \wedge \xi_2), C T(h_2 \wedge h_3)(\xi_1 \wedge \xi_2), C(h_3 \cdot h_1 \wedge h_2)(\xi_1 \wedge \xi_2) \\ , C(h_3 \wedge C(h_1 \wedge h_2))(\xi_1 \wedge \xi_2) : S_n^*(G_1 \wedge G_2) \rightarrow G_2 \wedge (G_1 \wedge G_2) \\ \rightarrow H \end{array} \right.$$

これらの公式から実際の計算を行うには未だ困難があるようである。

系5. $f_{31} = f_{32} = \text{trivial}$ のとき, つまり

$$f = (f_{11}, f_{21}, f_{12}, f_{22})$$

のときは,

$$O(f)_*(\xi_1 \wedge 1_{G_1})$$

$$= \{ O(f_{11})_*(\xi_{11} \wedge \text{Pr}_1) + c(f_{11} \wedge f_{21}) T(\xi_{21} \wedge \text{Pr}_1) \} \oplus O(f_{21})(\xi_{21} \wedge \text{Pr}_2)$$

$$\oplus O(f_{22})(\xi_{22} \wedge \text{Pr}_2) \oplus \{ O(f_{12})_*(\xi_{12} \wedge \text{Pr}_1) + c(f_{12} \wedge f_{22}) T(\xi_{22} \wedge \text{Pr}_1) \}$$

である。

例6. $G_1 = G_2 = S^3$ の場合を考へてみよう。

$$\alpha_i : S^3_1 \wedge S^3_2 = S^6 \longrightarrow S^3_i, \quad \xi_i : S^* \rightarrow S^3_i \quad (i=1, 2)$$

$$f : S^3_1 \times S^3_2 \longrightarrow S^3_1 \times S^3_2, \quad (a, b, c, d \in \mathbb{Z})$$

$$f(x, y) = (\alpha_1(x_1 y) x^a y^b, \alpha_2(x_1 y) x^c y^d)$$

$$\text{このとき, } \xi : S^* \longrightarrow S^3_1 \times S^3_2, \quad \xi = (\xi_1, \xi_2)$$

$$f_*(\xi) = (a\xi_1 + b\xi_2, c\xi_1 + d\xi_2) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}$$

命題4における各写像は次のようにならう。

$$\textcircled{1}''_{G_1}(\xi_1 \wedge 1_{G_1}) : S^*(S^3_1 \times S^3_2) \cong S^* S^3_1 \vee S^* S^3_2 \vee S^K S^3_1 \wedge S^3_2$$

$$O(h_1)(\xi_1 \wedge 1_{G_1}) = \frac{-ac(a-1)}{2} T \cdot E^3 \xi_1 : S^*_1 \longrightarrow S^3_1$$

$$h_3(\xi_1 \wedge 1_{G_2}) = \alpha_1 \circ E^3 \xi_1 : S^*_2 \longrightarrow S^3_1$$

$$c(h_3 \wedge O(h_1))(\xi_1 \wedge 1) = 0. \quad (1)$$

(16)

$$\begin{aligned}
 C(h_3 \wedge h_1)(\xi_{1,1}) &= -Q \tau \cdot E_{\xi_1}^3 \cdot E_{\xi_1}^6 : S^k \rightarrow S^3 \\
 O(h_3)(\xi_{1,1}) &= m_1 O_1(\tau) \cdot E_{\xi_1}^6 : S^{k+6} \rightarrow S^3 \\
 \text{Def. } \alpha_1 = m_1 \tau \in \Pi_6(S^3), \quad O_1(\tau) : S^9 \rightarrow S^3 & \\
 S^9 = S^3 \wedge S^3 \wedge S^3 \ni (x, y, z) &\in \mathbb{C}^3 \\
 O_1(\tau)(x, y, z) &= \frac{x \cdot y \cdot z \cdot y^{-1} \cdot z^{-1}}{(y)} \in S^3 \\
 \text{注. } \pi_0(S^3) &\cong \mathbb{Z}_3
 \end{aligned}$$

$\oplus''_{G_1}(\xi_{2,1}|_{G_1})$ では、

$$h_3 \tau(\xi_{2,1}|_{G_1}) = -\alpha_1 \cdot E_{\xi_2}^3 : S^k \wedge S^3 \rightarrow S^3$$

$$C(h_1 \wedge h_2) \tau(\xi_{2,1}|_{G_1}) = -ab \tau \cdot E_{\xi_2}^3 : S^k \wedge S^3 \rightarrow S^3$$

$$O(h_2)(\xi_{2,1}|_{G_2}) = \frac{-b(b-1)}{2} \tau \cdot E_{\xi_2}^3 : S^k \wedge S^3 \rightarrow S^3$$

$$\{ O_2(h_3)(\xi_{2,1}) = m_1 O_1(\tau) \cdot E_{\xi_2}^6, \quad (\alpha_1 = m_1 \tau).$$

$$\{ C\tau(h_2 \wedge h_3)(\xi_{2,1}) = -b \tau \cdot E_{\xi_2}^3 \cdot E_{\xi_2}^6 : S^k \wedge S^6 \rightarrow S^3$$

$$(C(h_3 \wedge h_1) \wedge O(h_2))(\xi_{2,1}) = \frac{ab(b-1)}{2} \tau \cdot E_{\xi_2}^3 \cdot E_{\xi_2}^6 \quad (2)$$

$$\underline{C(h_3 \wedge (h_1 \wedge h_2))(\xi_{2,1})} = 0 \quad (3)$$

$$(1) \text{ の 証 明 } \quad C(h_3(x \wedge y) \wedge O(h_1)(x \wedge x)) : G_{1,1}(G_1 \wedge G_2) \rightarrow H$$

$$G_{1,1}(G_1 \wedge G_2) \rightarrow G_2 \wedge G_1 \wedge G_1 \wedge G_1 \rightarrow (G_1 \wedge G_2)_1(G_1 \wedge G_1)$$

$$\begin{aligned}
 x \wedge x \wedge y &\rightarrow y \wedge x \wedge x' \wedge x \rightarrow \xrightarrow{h_3 \wedge O(h_1)} H \wedge H \xrightarrow{c} H \\
 a \wedge b \wedge c \wedge d &\rightarrow (b \wedge a) \wedge (c \wedge d)
 \end{aligned}$$

$$(3) \text{ の 証 明 } \quad C(h_3(x \wedge y) \wedge C(h_1(x) \wedge h_2(y))) : G_{2,1}G_{1,1}G_2 \rightarrow H$$

$$G_{2,1}G_{1,1}G_2 \rightarrow G_2 \wedge G_1 \wedge G_1 \wedge G_2 \xrightarrow{c} H \wedge H \rightarrow H$$

$$\begin{aligned}
 y' \wedge x \wedge y &\rightarrow y' \wedge x \wedge x \wedge y \xrightarrow{h_3(b \wedge d) \wedge C(h_1(c) \wedge h_2(a))} H \\
 a \wedge b \wedge c \wedge d &
 \end{aligned}$$

(17)

(2) の証明 $C(h_3(d \wedge y) \cdot h_1(x) \wedge 0(h_2)(y \wedge y))(\xi_2 \wedge 1)$.

$$\begin{array}{c}
 S^9 = S_2^3 \wedge (S_1^3 \wedge S_2^3) \Rightarrow y_1 x_1 y \\
 \swarrow \quad \downarrow \\
 (\xi_1^3 \wedge S_2^3 \wedge \xi_2^3) \vee (S_1^6 \wedge S^6) = (S_1^3 \times S_2^3 / 1 \times S_2^3) \wedge (S_2^3 \wedge S_2^3) \Rightarrow [x, y] \wedge [y, y] \\
 \searrow \quad \downarrow \\
 \deg h_1(C \cdot E(h_2)) \quad S_1^3 \leftarrow S^3 \wedge S^3 \Rightarrow h_3(x_1 y) \cdot h_1^2(x) \wedge 0(h_2)
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 d \circ \tau &= -1 \cdot \deg h_1(C \cdot E(h_2)) \\
 &= -\alpha \tau \cdot \frac{-\beta(b-1)}{2} E^3
 \end{aligned}$$

従って結果は次の公式を保証(2~3)。

$$\begin{aligned}
 &O(\tau)_k(\xi_1 \wedge 1_{\mathbb{A}}) \in \Pi_{k+6}(S_1^3) \oplus \Pi_{k+3}(S_1^3) \oplus \Pi_{k+3}(S_2^3) \\
 &\quad \oplus \Pi_{k+6}(S_2^3) \oplus \Pi_{k+3}(S_2^3) \oplus \Pi_{k+3}(S_2^3) \\
 &= m_1(O_1(\tau) - \alpha \tau \cdot E^3) \circ E^6_1 + (m_1 O_1(\tau) - \alpha m_1 \tau \cdot E^3 + \frac{\alpha b(b-1)}{2} \tau \cdot E^3) \cdot E^6_2 \\
 &\oplus -\left(\frac{\alpha(a-1)}{2} \tau \cdot E^3_1 + (m_1 + \alpha b) \tau \cdot E^3_2\right) \\
 &\oplus m_1 \tau \circ E^3_1 - \frac{\alpha(b-1)}{2} \tau \cdot E^3_2 \\
 &\oplus m_2(O_1(\tau) - CT \cdot E^3) \circ E^6_1 + (m_2 O_1(\tau) - \beta m_2 \tau \cdot E^3 + \frac{\beta d(d-1)}{2} \tau \cdot E^3) \cdot E^6_2 \\
 &\oplus -\left(\frac{\beta(c-1)}{2} \tau \cdot E^3_1 + (m_2 + \beta d) \tau \cdot E^3_2\right) \\
 &\oplus m_2 \tau \circ E^3_1 + \frac{\beta(d-1)}{2} \tau \cdot E^3_2
 \end{aligned}$$

ここで $\alpha_1 = m_1 \tau, \alpha_2 = m_2 \tau, \tau \in \Pi_6(S^3) \rightarrow \mathbb{A}$
 π_1 : commutator map - Blaker-Malley map.

2. 2.

(18)