

可換コンパクト群上の Hardy 空間ににおける
端函数 (extremal functions) について.

都留文科大 田中 純一

(Jun-Ichi Tanaka)

§1. Γ を実軸 \mathbb{R} の稠密な部分群とする. Γ に離散位相を入れて, Γ の双対群を K とおく. σ を K 上の正規 Haar 検度とし, $f \in L^1(\sigma)$ が 解析的 とは

$$f \sim \sum_{\lambda \geq 0} a_\lambda X_\lambda$$

となる Fourier 展開を持つものとする. ここで X_λ は $X_\lambda(x) = e^{i\lambda x}$, $x \in K$, で定まる指標とする. $L^p(\sigma)$, $1 \leq p \leq \infty$, における 解析函数全体を Hardy 空間, $H^p(\sigma)$, と定義し, $f \in H^p(\sigma) \Leftrightarrow \int |f(x)|^p d\sigma = 0$ となる函数全体を $H_0^p(\sigma)$ と書く. $L^p(\sigma)$ の部分空間 M が (单純) 不变 (simply invariant) とは $\Gamma \ni \lambda (\neq 0)$ に対して
 $X_\lambda \cdot M \subseteq M$ となることをいふ. $L^p(\sigma) \ni f$ に対し, $\{X_\lambda f; \Gamma \ni \lambda \neq 0\}$ で生成される不变部分空間を M_f と記す. 不变部分空間 M が $f \in M$ に対して $M = M_f$ をみたすとき, f を M の 单一生成元 (single generator) と呼ぶ.

以上の設定において, 単位円周上のいくつかの性質が

拡張される。例えば $f \in H^1(\sigma)$ で $\log |f| \in L^1(\sigma)$ とする $\log |f|$ inner-outer 分解が可能である。しかし $\log |f|$ の程度の隔たりがあり、 $\log |f| \notin L^1(\sigma)$ となる解析函数 $f(\neq 0)$ の存在が示される。([1; Theorem 9.3]). 二の種の函数は inner-outer 分解に類する分解ができないだろうか？ また全てのルム 1 の outer 函数は $H^1(\sigma)$ の単位球の端点となる。果してそれが成立するであろうか？ これら等の懸案はかなり以前よりなされ、次の問題へと集約されるべき。([3; Chapter 5, §4]).

单一生成元の問題。 全ての不変部分空間は单一生成元を持つであろうか？ 特に $H^1_0(\sigma)$ の場合はどうか。

ここで $H^1_0(\sigma)$ の local product 分解による表現を用いてこの問題の周辺を探ってみる。

52. 任意の $t \in \mathbb{R}$ に対して、 $e_t(\lambda) = e^{i\lambda t}$ ($\lambda \in \mathbb{P}$) と定め $e_t \in K$ が定まる。 $K \ni x$ に対し $T_t(x) = x + e_t$ とする。K 上にエルゴード的な流れが定義される。簡便のため、 $2\pi \in \mathbb{P}$ と仮定する。 $K_{2\pi} \ni e_1(y) = 1$ となる $y \in K$ の全体とする。 $K_{2\pi}$ は K のコンパクト部分群となり、K は $K_{2\pi} \times [0, 1]$ と $BG, s) = y + e_s$ という写像で同一視できる。 $K_{2\pi}$ 上の正規 Haar 測度を σ_1 とするとき σ は $\sigma_1 \times m_I$ となる。

ここで m_I は実軸上の Lebesgue 測度、 dt 、の $[0, 1]$ への制

限とする。 $K \in K_{2\pi} \times R$ の部分と見えることより、次の二つの写像を導入する。

$$L'(K_{2\pi} \times R, d\sigma_1 \times dt) \ni f \text{ に対し } \varphi$$

$$\varphi(f)(y, s) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} f(y + e_j, s - j)$$

$(y, s) \in K = K_{2\pi} \times [0, 1]$ と定義する。このとき φ は $L'(K_{2\pi} \times R, d\sigma_1 \times dt)$ を $L'(\sigma)$ 上へ写す。また $L'(\sigma) \ni \phi$ に対し

$$\phi^\#(y, t) = \phi(y + e_{[t]}, t - [t])$$

$(y, t) \in K_{2\pi} \times R$ とする。 $\exists z \in \mathbb{Z}$ は t を越えない最大の整数とする。 $\phi^\#$ は $L'(K_{2\pi} \times R, d\sigma_1 \times dt / (Ht))$ に属する。 \mathcal{A}^1 は $f \in L'(K_{2\pi} \times R, d\sigma_1 \times dt)$ で σ_1 -a.e. $y \in K_{2\pi}$ に対して t の函数, $f(y, t)$, が 実軸上 の Hardy 空间, $H^1(dt)$ に属するものの全体とする。単値域定理の簡単な応用から $H^1_0(\sigma) \oplus \mathcal{A}^1$ の商空间として表現することができる。

定理([4 ; Theorem 3.1]). $\mathcal{A}^1 / \ker \varphi \cap \mathcal{A}^1 \cong H^1_0(\sigma)$ は等距離同型となる。より詳しく述べる。この $\mathcal{A}^1 \oplus H^1_0(\sigma)$ 上に準じ,

$$\|f + \ker \varphi \cap \mathcal{A}^1\|_1 = \|\varphi(f)\|_1$$

が成立する。

多くの場合, 適当な $g \in \ker \varphi \cap \mathcal{A}^1$ に対し $\|f + g\|_1 = \|\varphi(f)\|_1$ となる。全ての $f \in \mathcal{A}^1$ に対してこれが成立する \exists ある g , 換言すれば $\mathcal{A}^1 / \ker \varphi \cap \mathcal{A}^1$ のノルムは attain される \exists ある g 。この問題が前述の $H^1_0(\sigma)$ に属する唯一性成

元の問題と同値となる。

$H^1(\sigma) \ni \phi$ に対して $\phi(\phi)$ を次の性質を持つ函数の全体とする。

(i) $L^1(K_{2\pi} \times \mathbb{R}, d\sigma_1 \times dt) \ni u \geq 0$ で $0 \leq \varphi(u) \leq 1$ となる。

(ii) $u(y, t) \phi'(y, t)$ は \mathcal{L}' に属する。

このとき, $\phi(\phi)$ は凸集合となり自然な順序で半順序集合となる。簡単な考察により Zorn の補題の仮定を満足し, 极大元 $\tilde{\alpha}$ の存在が示される。

定理 1, $H_0^1(\sigma) \ni \phi$ に対して, $\phi(\phi)$ および $\tilde{\alpha}$ を上記のもとのとする。 $\varphi(\tilde{\alpha}) \neq 1$ とすれば $(1 - \varphi(\tilde{\alpha}))\phi$ は $H_0^1(\sigma)$ の唯一生成元となる。

この定理を示すために次の補題を用意する。上半平面で有界な解析函数の境界函数全体の $L^1(dt/(1+t^2))$ における内包を $H^1(dt/(1+t^2))$ と記す。

補題 1. $H^1(dt/(1+t^2)) \ni f$ に対して, f が outer でないとする。このとき $0 \leq u(t) \leq 1$ で

$$u \cdot f \in H^1(dt/(1+t^2)) \text{ かつ } u f(i) = 0$$

となる函数 u が存在する。

証明 $f(t) = g(t)h(t)$ で g が inner, h が outer とする。 $H^1(dt/(1+t^2))$ にだける inner-outer 分解となる。 $g(i) = 0$ のとき $u \equiv 1$ として成立する。 $g(i) \neq 0$ のとき, g を定

数値 λ で $0 < \varphi(\lambda) < 1$ と仮定できる。より $0 < \lambda < 1$ を

適当に定めると $1 - d/2 (\varphi(\lambda) + 1/\varphi(\lambda)) = 0$ となり

$$u(t) = \frac{1}{2} \{ 1 - d/2 (\varphi(t) + \overline{\varphi(t)}) \}$$

と定めることとする。

補題2. ([1; Theorem 7.8]). $y \in H_0^1(\sigma)$ とする。このとき次の(i)(ii)は同値となる。

(i) σ_1 -a.e. $y \in K_{2\pi}$ に対して、 $y^\#(y, t)$ は t の函数と $L^1(dt/(1+t^2))$ の outer 函数となる。

(ii) y は $H_0^1(\sigma)$ の单一生成元となる。

定理1の証明. $0 \leq \varphi(\lambda) \leq 1$ および $\varphi(\lambda \phi^\#) = \varphi(\lambda) \phi$ より、 $(1 - \varphi(\lambda)) \phi$ は $H_0^1(\sigma)$ に属する。 $y = (1 - \varphi(\lambda)) \phi$ とおく。仮定より、 $y \neq 0$ また、 σ_1 -a.e. $y \in K_{2\pi}$ に対して、 t の函数、 $y^\#(y, t)$ 、は $L^1(dt/(1+t^2))$ に属る。補題2の(i)が成立することを示す。(i) が成立しないと仮定すると σ_1 -a.e. $y \in K_{2\pi}$ に対して、 $\log |y(y, t)| \in L^1(dt/(1+t^2))$ より $L^1(K_{2\pi} \times \mathbb{R}, d\sigma_1 \times dt/(1+t^2)) \ni h(y, t) \geq |y^\#(y, t)| = |h(y, t)|$ となり、 σ_1 -a.e. $y \in K_{2\pi}$ に対して、 $h(y, t)$ は t の函数と $L^1(dt/(1+t^2))$ 上より 3 outer 函数とできる。 $y^\#(y, t) = B(y, t) h(y, t)$ とする。 σ_1 -a.e. y に対して、 t の函数、 $B(y, t)$ は定数ではない inner 函数となる。補題1より $0 \leq D(y, t) \leq 1$ となる可測函数で、 t の函数、 $D(y, t) y^\#(y, t)$ 、が $L^1(dt/(1+t^2))$ に

屬し, $\nabla \gamma(y, t) = 0$ となるように取れる. 適当な定数 $c > 0$ に対して $\nabla(y, t) = c/(1+t^2) \cdot \nabla(y, t)$ と定めると $0 \leq \nabla \leq 1 - \varphi(\nabla) \leq 1$, かつ $\nabla \gamma^\#$ が \mathcal{A}' に属する. これより

$$\tilde{\eta} \leq \tilde{\eta} + \nabla(1 - \varphi(\tilde{\eta}))^\#$$

また $\tilde{\eta} + \nabla(1 - \varphi(\tilde{\eta}))^\# \in \mathcal{S}(\phi)$ が成立し, $\tilde{\eta}$ の極大性へ不合理となる.

この定理を利用するためには, $\mathcal{S}(\phi)$ の定義を少し拡大して, $\phi \in H_0^\infty(\sigma)$ に対して

$$\mathcal{S}'(\phi) = [u \in L^1(K_{2\pi} \times \mathbb{R}, d\sigma, dt); 0 \leq u, \text{かつ } u\phi^\# \in \mathcal{A}']$$

$$\mathcal{S}'_K(\phi) = [\theta \in L^1(\sigma); 0 \leq \theta, \text{かつ } \theta \cdot \phi \in H_0^1(\sigma)]$$

とおく. これに各々のノルムで補じた山集合となる. 一方 ϕ を $H_0^1(\sigma)$ の單一生成元とする $Szegő$ の定理の応用が, 適当な $H^1(\sigma)$ における outer 関数 γ が存在して, ある inner 関数 φ に対して

$$\arg \phi \gamma = \arg \varphi$$

となる. 以上より, 定理 1 が次の系を得る.

系 1. 次の (i) ~ (iii) は同値である.

(i) $H_0^1(\sigma)$ は單一生成元を持たない.

(ii) 全ての $\phi \in H_0^1(\sigma)$ に対して, $\mathcal{A}' \ni f \geq \varphi(\phi) = \phi$ となり, $\|f\|_1 = \|\phi\|_1$ となるものが存在する.

(iii) 全ての $H_0^1(\sigma)$ における inner 関数 φ に対して,

$$\Psi(\phi'(g)) = \Psi_K'(g)$$

が成立する。

(iii) に肉する方面で次の問題設定は興味深い。 $g = X_\lambda$
 $(T \geq \lambda > 0)$ とすると、スペクトルが $(-\lambda, \lambda)$ に属する正値函数
 $\phi \in L^1(\sigma)$ の $f \in L^1(K_{2\pi} \times \mathbb{R})$ で σ -a.e. $y \in K_{2\pi}$ に対し, t の函数
 $f(y, t)$ のスペクトルが $(-\lambda, \lambda)$ に属する正値函数が存在して、
 $\Psi(f) = \phi$ とできるかどうか。という問題が单一圧成元の存在
の一つの十分条件を調べることとなる。正の定義函数の性質
この肉満たさず、ある程度の結果を期待できるようと思うのだ
が現段階では成立するか否か不明である。

§3. $K \times \mathbb{R}$ 上の Borel 函数 A が

$$|A(x, t)| = 1 \Leftrightarrow A(x, s+t) = A(x, s)A(x+es, t)$$

を満たすとき, A を コサイクル と呼ぶ。多くの不変部分空間
に対し, コサイクルが対応 $1 \leq k \leq 3$. σ -a.e. x に対し, t の
函数 $A(t, t)$ の $H^1(dt/(1+t^2))$ の inner 函数となるとき, A を
解析的コサイクル と呼び, ときに $A(x, t)$ の Blaschke 標のとき,
Blaschke コサイクル という。全ての不変部分空間 M に対
し適当なユニタリ-函数 Ψ を定めると ΨM のコサイクル
が Blaschke コサイクルとできる ([3; Theorem 26]). これよ
り单一圧成元の問題は Blaschke コサイクルの零点の $H^1(\sigma)$ に

属する函数による実現へと転換される。上記手法を用ひて、
ある程度結果を得ることができる。

$B(y, t)$ を Blaschke コサイクルとする。これを $K_{2\pi} \times R$ 上に制
限し、 $\pm i$ 上半平面に射影的に拡張し、 $B(y, t+\lambda s)$ を
 $K_{2\pi} \times R \times R^+$ 上の函数とみなし、次の条件を考える。

(3.1) ある正数 $M > 0$ に対し、 $K_{2\pi} \ni y \mapsto \forall z, 0 \leq t < 1$
に對り $B(y, t+\lambda s)$ の零点は高々 1 個となり、 $[0, 1] \times (0, M)$
に含まれる。

補題3. Blaschke コサイクル B が (3.1) を満たすとする。
このとき inner 函数 ϕ が定まり $B(y, t+\lambda s)$ の零点と $\phi^*(y, t+\lambda s)$
の零点は一致する。即ち $B = T_t \phi \cdot \bar{\phi}$ となる。

証明の概略. (3.1) の性質から $H'(s) \geq 2$ で $\gamma(0) \neq 0$ となり
 $\gamma^*(y, t+\lambda s)$ の零点は $B(y, t+\lambda s)$ の零点を含む函数 γ が
作れる。定理 1 の証明と同様な方法で $0 \leq \tau \leq 1$ となる函数
で $\phi = \tau \gamma$ が題意を満たすように定まる。

補題4. 任意の Blaschke コサイクル B に対し、(3.1) を
満たす Blaschke コサイクルの列 $\{B_m\}$ が定まり

$$B = \prod_{m=1}^{\infty} B_m$$

と書ける。

以上の準備のもとに次の定理が示される。

定理2. $H'_0(s) \geq \phi$ かつ $\log |\phi| \notin L^1(s)$ となる μ_ϕ の

Blaschke コサイクルを持つことを。このとき $0 \leq v_m \leq 1$ と仮定

函数列 $\{v_m\}$ が次の性質をもつことが定まる。

- (i) $v_m \geq v_{m+1}$,
- (ii) $M_{v_{m+1}\phi} > M_{v_m\phi}$,
- (iii) $\bigvee_{m=1}^{\infty} M_{v_m\phi} = H_0'(\sigma)$.

換言すれば $v_m\phi$ は $H_0'(\sigma)$ の唯一生成元に限りなく近づく

" \approx " " < .

文 献

- [1] T. Gamelin, Uniform Algebras, Prentice-Hall, 1969.
- [2] H. Helson, Structure of Blaschke cocycles, Studia Math. 44, 1972, 493-500.
- [3] ———, Analyticity on compact abelian groups, Algebras in analysis, Academic Press, 1975, 1-62.
- [4] J.-I. Tanaka, Hardy spaces and BMO-functions induced by ergodic flows, Michigan Math. J. 32, 1985, 335-348.