

二階椭円型偏微分方程式の境界値問題

広大理 前田文之

はじめに。

二階或はより高階の椭円型偏微分方程式の境界値問題を論ずるのに、いわゆる Sobolev 空間を考えて、Hilbert 空間の理論を用いるのが一つの標準的な方法になつてゐる。しかしこの方法では、考える問題が具体的な問題と結びつくのは領域が有界の場合に限ることが多い。又 Dirichlet 問題以外の境界値問題では境界が滑らかな場合しか考えない。我々は領域が有界ではなく、境界も滑らかでない場合を含める意味で一般の微分可能多様体上で二階の椭円型偏微分方程式の境界値問題を取り扱う。方程式の係数も出来たが一般にして連続性は仮定しない。ユークリッド空間の(有界)領域上では、Stampacchia [8] 等が非連続な係数のものを扱っており、解の定義等はそれによると。

非有界領域に対しては Sobolev 空間では狭すぎるので、

Deny - Lions [2] 12 より Beppo Levi 型空間に相当するものを考えるが、問題の設定の形式は Sobolev 空間にで Lions [4] 等が考えたのと同様で、Hilbert 空間論、特に Lax-Milgram の定理が使える形に作る。我々は始めに境界そのものを与えないで境界値問題を設定するが、これが具体的な意味をもつことを示すために、位相的仮想境界を作りその上で境界条件を与えたものが特別な例になつていることを示す ([5], [6] の拡張)。更に我々の方法で、Sario の normal operator ([7]) を一般化した operator が得られることを一つの応用として示す。

§1. 計量テンソルと、それによつて定まる函数空間。

考える空間 Ω はコンパクトでない連結な C^1 -多様体で、次元 $d \geq 2$ とする。 Ω 上に次の条件をみたす対称な共変テンソル (g_{ij}) を与える：

- (i) 各座標近傍 U において各 g_{ij} は有界可測、
- (ii) 各座標近傍 U において (g_{ij}) は一様に正定値、即ちある $\lambda > 0$ があつて、すべての $x \in U$ 及びすべての実数の組 (ξ_1, \dots, ξ_d) に対し

$$\lambda \sum \xi_i^2 \leq \sum g_{ij}(x) \xi_i \xi_j$$

が成立つ。

任意の座標近傍 U において, G を (g_{ij}) の行列式とす
ると $dV = \sqrt{G} dx_1 \cdots dx_d$ が U 上の測度として定まる。従
て dV は Ω 全体で定義された測度とみなせる。

(g^{ij}) 及び (g_{ij}) の逆行列として, $f \in C^1(\Omega)$ に対して $|\operatorname{grad} f|^2$
 $= \sum g^{ij} \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j}$ は Ω 上の非負函数である。

$$C_D^1(\Omega) = \{ f \in C^1(\Omega); D[f] = \int_{\Omega} |\operatorname{grad} f|^2 dV < \infty \}$$

とおく。 Ω 内に一つの座標近傍 U_0 を固定し, $f \in C_D^1(\Omega)$
に対して

$$(1) \quad \|f\|^2 = D[f] + \int_{U_0} f^2 dV$$

と定義すると, $\|f\|$ は $C_D^1(\Omega)$ 上のノルムになる。このノ
ルムによる $C_D^1(\Omega)$ の完備化を $\mathcal{D}(\Omega)$ と記そう。

局所的によく知られた結果(例えば[2]参照)から, $\mathcal{D}(\Omega)$
の元 f は $L^2_{loc}(dV)$ の函数と同一視することができ, $(\#)$
も $|\operatorname{grad} f|$ が $L^2(dV)$ の函数として定まって, (1) が成立
つ。更に $f, g \in \mathcal{D}(\Omega)$ ならば

$$D[f, g] = \int_{\Omega} \sum g^{ij} \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial g}{\partial x_j} dV$$

が定義出来て, $\mathcal{D}(\Omega)$ は内積 $D[f, g] + \int_{U_0} fg dV$ によ
る Hilbert 空間となる。

次に $C_0^1(\Omega)$ を台がコンパクトな $C^1(\Omega)$ の函数の全体とする \mathcal{D} と $C_0^1(\Omega) \subset C_D^1(\Omega)$ である。この $\mathcal{D}(\Omega)$ 内の閉包を $\mathcal{D}_0(\Omega)$ と記す。 $\mathcal{D}_0(\Omega)$ は $\mathcal{D}(\Omega)$ の部分空間として Hilbert 空間となる。もし $1 \notin \mathcal{D}_0(\Omega)$ ならば $\mathcal{D}_0(\Omega)$ 上ではノルム $\|f\|$ と $\sqrt{D[f]}$ とは同値である。このとき Ω は (g_{ij}) に関して正の境界をもつと呼ぼう。

§2. 方程式の解.

以下 Ω と (g_{ij}) は固定して、 Ω は (g_{ij}) に関して正の境界をもつものと仮定する。

今 $a = (a^i)$ 及び $b = (b^i)$ を二つの反対称ベクトルで、各座標近傍上で有界可測であるとし、 g を Ω 上非負な函数で局所的に有界可測とする。形式的に次の方程式を考える：

$$Lu = \Delta u - \sum a^i \frac{\partial u}{\partial x_i} + \frac{1}{\sqrt{G}} \sum_j \frac{\partial}{\partial x_j} (\sqrt{G} b^j u) - gu = 0,$$

T_2 なし

$$\Delta u = \frac{1}{\sqrt{G}} \sum_j \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\sum_i \sqrt{G} g^{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \right).$$

このように与えられた L (或は a, b, g) に対して

$$\mathcal{D}_L(\Omega) (= \mathcal{D}_{a,b,g}(\Omega)) = \left\{ f \in \mathcal{D}(\Omega); \int_{\Omega} (|a|^2 + |b|^2 + g) f^2 dV < \infty \right\}$$

とおく。このとき $|a|^2 = \sum g_{ij} a^i a^j$, $|b|^2 = \sum g_{ij} b^i b^j$.

$|a|=|b|=g=0$ (a.e.) のときは $\mathcal{D}_L(\Omega) = \mathcal{D}(\Omega)$ である。このときは $\|f\|_L = \|f\|$ とする。

$|a|+|b|+g \neq 0$ (a.e.) のときは, $\mathcal{D}_L(\Omega)$ のノルム $\|f\|_L$ を

$$\|f\|_L^2 = D[f] + \int_{\Omega} (|a|^2 + |b|^2 + g) f^2 dV$$

で定義する。 $\mathcal{D}_L(\Omega)$ は明らかに Hilbert 空間である。 $\mathcal{D}_{L,0}(\Omega)$ を $C_0^1(\Omega)$ の $\mathcal{D}_L(\Omega)$ における閉包とする。明らかに $\mathcal{D}_{L,0}(\Omega) \subset \mathcal{D}_0(\Omega)$ 。

次に $\mathcal{D}_L(\Omega)$ 上に L (或は a, b, g) によって定まる次の双一次形式を考える:

$$A_L[f, g] (= A_{(a, b, g)}[f, g])$$

$$= D[f, g] + \int_{\Omega} \left(\sum a^i \frac{\partial f}{\partial x_i} g + \sum b^i \frac{\partial g}{\partial x_i} f + g f g \right) dV.$$

$A_L[f, g]$ は $\mathcal{D}_L(\Omega) \times \mathcal{D}_L(\Omega)$ 上連続である。

$u \in \mathcal{D}_L(\Omega)$ があって、すべての $\varphi \in C_0^1(\Omega)$ に対して
 $A_L[u, \varphi] = 0$ をみたすとき, u を $L u = 0$ の解といふ。 $L u = 0$ の解の全体を $\mathcal{H}_L(\Omega)$ で表す。($\Delta u = 0$ の解の全体は単に $\mathcal{H}(\Omega)$ と記す。)

(注) 解の定義は局所的で定義するのが普通であろう。§5 参照。

§3 Dirichlet 問題

$\mathcal{D}(\Omega)$ に属する二つの函数 f_1, f_2 が “同じ境界値をもつ” とは、 $f_1 - f_2 \in \mathcal{D}_0(\Omega)$ なることで定義する。Dirichlet 問題は、“与えられた $f \in \mathcal{D}(\Omega)$ に対して、 f と同じ境界値を持つ $\mathcal{L}u = 0$ の解を求める事” とす。もう少し制限して、我々は $f_0 \in \mathcal{D}_L(\Omega)$ を与えて

問題 $[D_L(f_0)]$: $f_0 - u \in \mathcal{D}_{L,0}(\Omega)$ なる $u \in \mathcal{H}_L(\Omega)$ を求めること。

を考える。Lax-Milgram の定理を適用すれば、次の定理が得られる。

定理1. $A_L[f, g]$ が $\mathcal{D}_{L,0}(\Omega)$ 上で coercive, 且つある $\alpha > 0$ がある、すべての $\varphi \in \mathcal{D}_{L,0}(\Omega)$ に対して

$$A_L[\varphi, \varphi] \geq \alpha \|\varphi\|_L^2$$

とみたす、ならば、問題 $[D_L(f_0)]$ は常に一つの解をもつ。

(注) $a = b = 0$ ならば $A_L[f, g]$ は $\mathcal{D}_L(\Omega)$ 上で coercive である。Lions [4] や Stampacchia [8] 等とは異えて、 $\mathcal{L}u$ が連続となる注意。

§4 一般の境界値問題

一般的な境界条件は次の条件をみたす \mathcal{R} , \mathcal{R}' と $B[u, v]$ とで与えよ:

- (a) \mathcal{R} は $\mathcal{H}_L(\Omega)$ の閉部分空間.
- (b) \mathcal{R}' は $\mathcal{H}_L(\Omega)$ の部分空間で, $\mathcal{R}' \subset \mathcal{R}$.
- (c) $B[u, v]$ は $\mathcal{R}' \times \mathcal{R}$ 上で定義された双一次形式で, $u \in \mathcal{R}'$ と固定すると $v \in L^2(\Omega) \cap \mathcal{R}$ 上連続, $v \in \mathcal{R}$ と固定すると $u \in L^2(\Omega) \cap \mathcal{R}$ 上 (\mathcal{R}' 上でなくてよい) 連続.

更に $u_0 \in \mathcal{R}'$ と \mathcal{R} 上連続な一次形式 l_0 とを与え,
境界値問題を次の形で設定する:

問題 $[B(\mathcal{R}, B; u_0, l_0)]$: \mathcal{R} の (i), (ii) をみたす $w \in \mathcal{H}_L(\Omega)$ を求めるこ:

- (i) $w - u_0 \in \mathcal{R}$
- (ii) すべての $v \in \mathcal{R}$ に対して

$$A_L[w, v] + B[w, v] = l_0(v),$$

この問題の解の存在定理を述べるため次の定義をする:

ある $\alpha' > 0$ があり, すべての $u \in \mathcal{R}$ に対して

$$A_L[u, u] + B[u, u] \geq \begin{cases} \alpha' \|u\|_L^2 & (|a| + |b| + f \neq 0 \text{ a.e.}) \\ \alpha' D[u] & (|a| = |b| = f = 0 \text{ a.e.}) \end{cases}$$

をみたすとき, (\mathcal{R}, B) は $(L^2 \text{ 針對 } \mathcal{R})$ coercive である

と呼ぼう。

定理 2. $A_L[f, g]$ が \mathbb{R} 上 coercive で (R, B) が L に対して coercive であると仮定する。

(i) $|a|+|b|+g \neq 0$ (a.e.) が, $|a|=|b|=g=0$ (a.e.) の場合は $1 \notin R$ かつ $1 \in R$ で $B[1, 1] > 0$ であるならば, 向題 $[B_L(R, B; u_0, l_0)]$ は一つの解をもつ。

(ii) $|a|=|b|=g=0$ (a.e.), $1 \in R$ で, すべての $u \in R$ に対して $B[u, 1] = 0$ のときは, 向題 $[B_L(R, B; u_0, l_0)]$ が解をもつための必要且十分な条件は $l_0(1) = B[u_0, 1]$ などとてあり, このとき解は定数の差を除いて一意的に定まる。

この定理の証明は, Lax-Milgram の定理による。

(注) 上の向題では, $u_0 \in \mathbb{R}'$ としたが, $A_L[f, g]$ が $\mathcal{D}_{L, 0}(\Omega)$ 上 coercive のときは, $f \in \mathcal{D}_L(\Omega)$ で $[\mathcal{D}_L(f)]$ の解 u_f が \mathbb{R}' に属するようなものを与えて, (ii) の条件を $w - u_f \in \mathbb{R}$ で置きかえてもよい。

§5 仮想境界を与えた場合の Dirichlet 向題

ω を Ω 内の任意の領域とし,

$$H(\omega) = \left\{ u \in C(\omega); \begin{array}{l} \text{ } \omega \text{ 内の任意の相対コンパクトな} \\ \text{領域 } \omega' \text{ に属し, } u \in H(\omega') \end{array} \right\}$$

とおくと、 $\{H(\omega)\}_\omega$ は Ω 上に M.Brelot の意味の調和構造([1])を定義する (Herré [3] 参照). この調和構造は、テンソル (g_{ij}) によって定まるものである. 我々は (g_{ij}) を固定しておきたいので、 $H(\omega)$ の元を単に ω 上の調和函数と呼び、 $\{H(\omega)\}$ から定まる ω 上の優調和函数を単に ω 上の優調和函数と呼ぶことにする.

今 Ω^* を Ω の一つのコンパクト化とする. 仮想境界 $\Gamma = \Omega^* - \Omega$ 上に函数 φ を与えて、Perron-Brelot の方法で Dirichlet 問題を論ずることが出来る ([1], [5], [6] 参照). 即ち,

$$\bar{H}_\varphi = \inf \left\{ u ; \begin{array}{l} \text{Ω 上優調和, 下から有界} \\ \lim_{x \rightarrow \Gamma} u(x) \geq \varphi(x) \quad \forall x \in \Gamma \end{array} \right\},$$

$H_\varphi = -\bar{H}_{-\varphi}$ と定義し、 $\bar{H}_\varphi = H_\varphi$ でこれが有限のとき φ は可解であるといへ、共通の函数を H_φ と記す. このとき $H_\varphi \in H(\Omega)$ で、これが境界値 φ に対する $\Delta u = 0$ の解である. Γ 上の任意の連続函数が可解のとき、コンパクト化 Ω^* は可解であるといふ. Ω^* が可解なコンパクト化のときは、一長 $x_0 \in \Omega$ を固定して $\int \varphi d\omega = H_\varphi(x_0) \quad (\forall \varphi \in C(\Gamma))$ をみたす Γ 上の正測度 ω が存在する. これを調和測度と呼ぶ.

一般の方程式 $L u = 0$ に対しては、可解なコンパクト化

Ω^* に対し

$$\mathcal{R}_L(\Gamma) = \{\varphi; \Gamma \text{ 上の可解な函数で}, H_\varphi \in \mathcal{D}_L(\Omega)\}$$

とおく。 $A_L[f, g]$ が $\mathcal{D}_{L,0}(\Omega)$ 上 coercive ならば、 $\varphi \in \mathcal{R}_L(\Gamma)$ に対し、問題 $[D_L(H_\varphi)]$ は解を持つ。これを H_φ^L で表す。これが境界値 φ に対する $Lu=0$ の Dirichlet 問題の解である。

(注) $Lu=0$ の解に対して、直接 Perron-Brelot の方法で Dirichlet 問題を論ずることも可能であろう。

§6 仮想境界を与えた場合のオニ、オミ境界値問題

Ω^* を Ω の可解なコンパクト化とし、 $A_L[f, g]$ は $\mathcal{D}_{L,0}(\Omega)$ 上 coercive であると仮定する。前節より $\varphi \in \mathcal{R}_L(\Gamma)$ に対し $H_\varphi^L \in \mathcal{H}_L(\Omega)$ が対応する。 $\mathcal{H}_L(\Gamma) = \{H_\varphi^L; \varphi \in \mathcal{R}_L(\Gamma)\}$ とおけば $\mathcal{H}_L(\Gamma)$ は $\mathcal{H}_L(\Omega)$ の部分空間である。

今、 $\hat{\mathcal{R}} \subset \mathcal{R}_L(\Gamma)$ の部分空間で、 $\hat{\mathcal{H}} = \{H_\varphi^L; \varphi \in \hat{\mathcal{R}}\}$ が $\mathcal{H}_L(\Omega)$ の部分空間であるものを号えよう。例えば“調和測度” ω に対して可測な Γ の部分集合 Λ ととり

$$\mathcal{R}_L(\Lambda) = \{\varphi \in \mathcal{R}_L(\Gamma); \Gamma - \Lambda \models \varphi = 0 \text{ w-a.e.}\}$$

とおけば、 $\mathcal{D}_{L,0}(\Omega) = \mathcal{D}_0(\Omega)$ の仮定の下で、 $\mathcal{H}_L(\Lambda) = \{H_\varphi^L;$

$\varphi \in R_L(\Lambda)$ は $H_L^L(\Omega)$ の内部空間 \mathcal{H} と三分する ([5], [6] 参照).

次に, Γ 上 ω -可測な非負函数 β で, $H_\beta^L \rightarrow \int \beta \varphi^2 d\omega$ が $\hat{\mathcal{R}}$ 上連続なものとす ($[6]$ 参照). それに対し, $\hat{\mathcal{R}}_1 = \{\varphi \in R_L(\Gamma); \int \beta \varphi^2 d\omega < \infty\}$, $\hat{\mathcal{R}}_1 = \{H_\beta^L; \varphi \in \hat{\mathcal{R}}_1\}$ とも $H_\beta^L \in \hat{\mathcal{R}}_1$, $H_\beta^L \in \hat{\mathcal{R}}$ は \mathcal{H}

$$B_\beta[H_\beta^L, H_\beta^L] = \int \beta \varphi \varphi d\omega$$

と定義する. もし $A_L[f, g]$ が $\hat{\mathcal{R}}$ 上 coercive なれば, $(\hat{\mathcal{R}}, B_\beta)$ は coercive である. 従って, 更に $\varphi_0 \in \hat{\mathcal{R}}$ と Γ 上の ω -可測な函数 γ_0 で, $l_{\varphi_0}(H_\beta^L) = - \int \varphi_0 \gamma d\omega$ が $\hat{\mathcal{R}}$ 上連続なものを与えると, 問題 $[B_L(\hat{\mathcal{R}}, B_\beta, H_\beta^L, l_{\varphi_0})]$ は定理2が適用出来る.

特に $\hat{\mathcal{R}} = R_L(\Lambda)$ の場合は, β, γ は Λ 上の函数でよく, 問題 $[B_L(R_L(\Lambda), B_\beta, H_\beta^L, l_{\varphi_0})]$ の解 u は次の二つの条件 1), 2) を定まる:

1) $\Gamma - \Lambda = \varphi_0 = \gamma$. ω -a.e. すなは $\varphi_0 \in R_L(\Gamma)$ かつ $u = H_{\varphi_0}^L$.

2) 任意の $\varphi \in R_L(\Lambda)$ に対し

$$A_L[u, H_\beta^L] + \int_\Lambda \beta \varphi_0 \varphi d\omega = - \int_\Lambda \varphi \gamma d\omega.$$

1) は φ_0 "P- Λ 上で与えられた境界値 φ_0 をとることを意味し, 2) を変形すると, 形式的に

$$\int (\Delta u) H_\varphi dV + D[u, H_\varphi] = - \int_{\Lambda} (\beta \varphi_0 + \gamma) \varphi d\omega$$

となる, u が Λ 上で "normal derivative" $\beta \varphi_0 + \gamma$ を持つことを意味する ([5], [6] 参照). すなはちこの問題は, 仮想境界に対する第三境界値問題 ($\Lambda = \Gamma$, $\beta = 0$ のときは, Neumann 問題) とみなすことができる.

§7 (R, B)による境界挙動.

この節では, $A_L[f, g]$ は $\mathcal{D}_{L,0}(\Omega)$ 上 coercive であると仮定する. Ω 内のエンパクト集合 K で $\Omega - K$ が領域であるものをとり, $\{f \in C_D^1(\Omega); f$ は K の近傍で 0, $\|f\|_L < \infty\}$ の $\mathcal{D}_L(\Omega)$ における閉包を \mathcal{D}_L^K と記す. $L \in \mathcal{D}_L^K$ ならば, K は negligible³⁾ とする. 以下 K は negligible ではないと仮定する. 境界条件 (R, R', B) が §4 におけるようになされたとき

$$R^K = \{u \in \mathcal{H}(\Omega - K); \exists u^* \in \mathcal{D}_L^K \text{ s.t. } u^* = v + g, v \in R, g \in \mathcal{D}_{L,0}\}$$

$$R'_1 = \{u \in \mathcal{H}(\Omega - K); \exists v \in R', g \in \mathcal{D}_{L,0} \text{ s.t. } u = v + g \text{ on } \Omega - K\}$$

とおき, $u_1 \in R'_1$, $u_2 \in R^K$ が与えられたとき, $u_i = v_i + g_i$

$(i=1,2)$, $v_1 \in \mathbb{R}'$, $v_2 \in \mathbb{R}$, $g_i \in \mathcal{D}_{L,0}(\Omega)$ ($i=1,2$), と書けば
そのとて

$$B^K[u_1, u_2] = B[v_1, v_2]$$

と定義すると, $\Omega-K$ における境界条件 (R^K, R^K_1, B^K) が定まる.

次に任意の $f \in \mathcal{D}_L(\Omega)$ に対して, $f-g \in \mathcal{D}_L^K$, $g|_{\Omega-K} \in \mathcal{H}(\Omega-K)$ なら $g \in \mathcal{D}_{L,0}(\Omega)$ が一意的に定まる(定理1).

$R_f^K = g|_{\Omega-K}$ は R^K_1 に属するから, $\Omega-K$ に対して, 問題 $[B_L(R^K, B^K, R^K_1, 0)]$ を考えることが出来る. 定理1により
この解が存在すれば一意的に定まる. それを $B_L^K f$ と記す.

$B_L^K f$ は K の境界で f という値をとり, 仮想境界で境界条件 (R, B) によって定まる挙動をとる $\int u=0$ の $\Omega-K$ 上の解
となることはなる. 対応 $f \rightarrow B_L^K f$ によって, Sarco の
normal operator を一般化したもののが得られる([7] 参照). この operator B_L^K に対する主函数⁴⁾を求める問題も
論ずるこれが出来るが, こゝでは省略する.

[備註] 1) 産業近傍は相対ユニバクトなもののみを考える.

2) of positive boundary. Riemann面の hyperbolic に相当する.

3) 容量(capacity)ゼロに相当する.

4) principal function; [7] 参照,

引用文献

- [1] M. Brelot, Axiomatique des fonctions harmoniques, Université de Montréal, 1966.
- [2] J. Deny and J.L. Lions, Les espaces du type de Beppo Levi, Ann. Inst. Fourier 5(1955), 305-370.
- [3] R.-M. Hervé, Un principe du maximum pour les sous-solutions locales d'une équation uniformément elliptique de la forme $Lu = -\sum_i \frac{\partial}{\partial x_i} (\sum_j a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_j}) = 0$, Ann. Inst. Fourier 14-2(1964), 493-508.
- [4] J. Lions, Problèmes aux limites dans des équations aux dérivées partielles, Université de Montréal, 1967.
- [5] F-Y. Maeda, Normal derivatives on an ideal boundary, J. Sci. Hiroshima Univ., Ser. A-I, 28(1964), 113-131.
- [6] F-Y. Maeda, Boundary value problems for the equation $\Delta u - qu = 0$ with respect to an ideal boundary, Ibid., 32(1968), 85-146.
- [7] B. Rodin and L. Sario, Principal functions, Van Nostrand, Princeton, 1968.
- [8] G. Stampacchia, Le problème de Dirichlet pour les équations elliptiques du second ordre à coefficients discontinus, Ann. Inst. Fourier 15-1 (1965), 189-258.