

$u_{tt} - \Delta u + u^p = 0$ の弱解の構成法について

東大理 井上淳

§1. 序

Ω を滑らかな境界 $\partial\Omega$ をもつ \mathbb{R}^3 の中の有界領域とする。

ここでは

$$\begin{aligned} \text{(I. V. P.)} \quad & u_{tt} - \Delta u + u^p = 0 \quad \text{in } \Omega \times (0, \infty) \\ & \left. \begin{aligned} & u(x, 0) = \varphi(x) \\ & u_t(x, 0) = \psi(x) \\ & u(x, t)|_{\partial\Omega} = 0 \end{aligned} \right\} \quad \text{for } t \geq 0 \end{aligned}$$

なる問題を考える。

最近 W.A. Strauss [6] は (I.V.P.) に対し、後に定義する、弱解で energy 不等式をみたすものを構成した。彼の方法は 函数 u^p を Lipschitz 連続函数で近似した方程式を用い、その解の中から compact argument で望みの弱解を作るというもので、その意味で (I.V.P.) に対する J.E. Sogal [5] の考えに沿うものであるといつてよいであろう。

我々の目的は、Strauss と同じ結果を別の近似法、即ち、方程式に $\varepsilon \Delta u_t$ なる項を付け加えるという操作

で近似解をつくり、あとは Strauss と同様の compact argument で証明しようというわけである。この小文では近似解の構成法をのみ述べようと思う。

さて、弱解の定義及び Strauss の定理を述べよう

定義. 各 t に対し、 Ω のほとんど到る所定義された函数 $u(x, t)$ が (I.V.P.) の弱解とは

(i) u (resp. u_t) は 値を $H^1(\Omega) \cap L^{p+1}(\Omega)$ (resp. $L^2(\Omega)$) に
もつ、 t の弱連続函数

(ii) 任意の $\Phi(x, t) \in C_0^\infty(\Omega \times (0, \infty))$ に対し

$$\int_0^\infty \int_\Omega (-u_t \Phi_t + \nabla u \cdot \nabla \Phi + u^p \Phi) dx dt = 0$$

をみたす。但し、空間 $X = H^1(\Omega) \cap L^{p+1}(\Omega)$ の位相 $\|\cdot\|_X$ は $\|u\|_X = \|u\|_{H^1(\Omega)} + \|u\|_{L^{p+1}(\Omega)}$ で与えられているものとする。

定理 (I.V.P.) の弱解 $u(x, t)$ が存在する。

更に、任意の t に対し

$$\int_\Omega \left(\frac{1}{2} u_t^2 + \frac{1}{2} |\nabla u|^2 + \frac{u^{p+1}}{p+1} \right) dx \leq \int_\Omega \left(\frac{1}{2} |\phi|^2 + \frac{1}{2} |\nabla \phi|^2 + \frac{\phi^{p+1}}{p+1} \right) dx$$

なる energy 不等式が成り立つ。

注意. Strauss [6] と同様、 u^p はもと一般の $F(x, u)$, また他の境界条件、たとえば Neumann 或いは

が三種境界条件についても成立する。

§2. 近似方程式に対する古典解の構成

この節では Leray-Schauder の定理を用いて

$$(2.1) \quad \begin{cases} U_{tt} - \Delta U + U^p - \varepsilon \Delta U_t = 0 \\ U(x, 0) = \varphi(x) \\ U_t(x, 0) = \psi(x) \\ U(x, t)|_{\partial \Omega} = 0 \end{cases}$$

に対する解をつくる。以下の方法は本質的に Pafermus [1] による。

定理を述べる前に、函数空間を定義しよう。

定義 $0 < \beta < 1$ とする。 $C^{k+\beta}(\bar{\Omega})$, $k=0, 1, 2, \dots$ ($\bar{\Omega} = \Omega$ の閉包) とは、 k 回連続微分可能な函数で、 k 回微分したものが指数 β の Hölder 連続なるものである。

$$\|w(x)\|_{k+\beta} \Rightarrow \sum_{|\alpha| \leq k} \sup_{x \in \bar{\Omega}} |D^\alpha w(x)| + \sum_{|\alpha|=k} \sup_{x, x' \in \bar{\Omega}} \left\{ \frac{|D^\alpha w(x) - D^\alpha w(x')|}{|x - x'|^\beta} \right\}$$

は $C^{k+\beta}(\bar{\Omega})$ の norm を定める。

$H^{\beta, \frac{\beta}{2}}(\bar{Q}_T)$, $\bar{Q}_T = \bar{\Omega} \times [0, T]$ は $Q_T = \Omega \times [0, T]$ で連続で以下の量が有限な函数 $v(x, t)$ のなる Banach 空間である

$$\|v(x, t)\|_\beta \Rightarrow \sup_{\bar{Q}_T} |v(x, t)| + \sup_{\substack{(x, t) \\ (x', t') \in \bar{Q}_T}} \left\{ \frac{|v(x, t) - v(x', t')|}{(|x - x'|^2 + |t - t'|)^{\frac{\beta}{2}}} \right\} < \infty$$

$\|\cdot\|_\beta$ を用いて。

$$\|v\|_{1+\beta} \equiv \sum_{|\alpha| \leq 1} \|D_x^\alpha v\|_\beta$$

$$\|v\|_{2+\beta} \equiv \sum_{|\alpha| \leq 2} \|D_x^\alpha v\|_\beta + \|v_t\|_\beta$$

$$\|v\|_{1+\beta} \equiv \|v\|_{1+\beta} + \|v_t\|_{1+\beta}$$

$$\|v\|_{2+\beta} \equiv \|v\|_{2+\beta} + \|v_t\|_{2+\beta}$$

なる norms を定義し、それぞれの norm が定義され有限な
 函数空間を $H^{1+\beta, \frac{\beta}{2}}(\bar{Q}_T)$, $H^{2+\beta, \frac{\beta}{2}}(\bar{Q}_T)$, $B^{1+\beta}(\bar{Q}_T)$, $B^{2+\beta}(\bar{Q}_T)$ と記す。

定理 $\varphi, \psi \in C_0^\infty(\Omega)$ とする。このとき (2.1) の一意解 $u(x, t) \in B^{2+\beta}(\bar{Q}_T)$, $0 < \beta < \frac{1}{2}$ が存在する。更に u は超函数的
 微分 $D_x^\alpha u_{tt} \in L^2(Q_T)$, $|\alpha| = 1$ をもつ。

定義 \bar{Q}_T で定義された函数 $u(x, t)$ は $u_t, u_{tt}, D_x^\alpha u$ ($|\alpha| \leq 2$)
 $D_x^\alpha u_t$ ($|\alpha| \leq 2$) が $C^0(\bar{Q}_T)$ に属し (2.1) をみたすとき 解 と
 えられる。

命題 2.1 (2.1) の解は高々一つである。

補題 2.2 $g(x, t) \in H^{\beta, \frac{\beta}{2}}(\bar{Q}_T)$, $0 < \beta < 1$, $f(x, t) \in H^{\beta, \frac{\beta}{2}}(\bar{Q}_T)$
 $f(x, 0)|_{\partial\Omega} = 0$ とする。更に $\varphi, \psi \in C_0^\infty(\Omega)$ 。 $u(x, t) \in B^{2+\beta}(\bar{Q}_T)$
 と

$$(2.2) \quad \begin{cases} u_{tt} - \Delta u + a(x, t)u - \varepsilon \Delta u_t = f \\ u(x, 0) = \varphi(x) \\ u_t(x, 0) = \psi(x) \\ u(x, t)|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

なる解とする. このとき, β, ε, T に依存する定数 C があって

$$(2.3) \quad \|u\|_{2+\beta} \leq C (\|f\|_{\beta} + |\varphi|_{2+\beta} + |\psi|_{2+\beta})$$

が成立する.

(注意) $\varphi, \psi \in C_0^\infty(\Omega)$ を仮定したが, 単に φ, ψ, f が compatibility condition をみたすならばよい.

(証明) ここでは割愛する. ただし Ladyzhenskaya-Solonnikov-Ural'tseva [4] p. 320 の定理を用いることに注意しておく.

補題 2.3. 上の補題 2.2 の仮定がみたされているとき

(2.2) の一意解 $u \in B^{2+\beta}(\overline{Q_T})$ が存在する

(証明) いわゆる continuity method を用いる.

即ち $L_\lambda(u) \equiv u_{tt} - \varepsilon \Delta u_t - \lambda(\Delta u - a(x,t)u)$ と定義し, $S \in \lambda$ の場合 $L_\lambda u = f$ が解 $u \in B^{2+\beta}(\overline{Q_T})$ で $u|_{\partial\Omega} = 0$, $u(x,0) = \varphi(x)$, $u_t(x,0) = \psi(x)$ をみたすものとする. $0 \in S$ は明らか.

あと, 上の補題を用いて, S の開かつ閉なることを証明し, これより $1 \in S$ を示す.

さて mapping $\mathcal{U}_\lambda: H^{\beta, \frac{\beta}{2}}(\overline{Q_T}) \rightarrow H^{\beta, \frac{\beta}{2}}(\overline{Q_T})$ を

次のように定める.

即ち $v \in H^{\beta, \frac{\beta}{2}}(\overline{Q_T})$ に対し $\mathcal{U}_\lambda v$ を次の方程式の

解 $w = U_\lambda v$ として定める

$$(2.4) \quad \begin{cases} w_{tt} - \varepsilon \Delta w_t - \Delta w + v^{p-1} w = 0 \\ w(x, 0) = \lambda \varphi(x) \\ w_t(x, 0) = \lambda \psi(x) \\ w(x, t)|_{\partial \Omega} = 0 \end{cases}$$

以下、 U_λ が Leray-Schauder の定理 の 仮定 を みたすことを check する。

補題 2.3 より U_λ は well-defined 2" compact operator なることは明らか。

補題 2.4. v が $H^{p, \frac{p}{2}}(\overline{Q_T})$ の 有界集合 を 動くとき $U_\lambda v$ は λ に 関し 一様連続

補題 2.5. 各 $\lambda \in \text{fix}$ するごとくに、 U_λ は $H^{p, \frac{p}{2}}(\overline{Q_T})$ の 中 の 連続作用素。

さて v を ある λ に 関し U_λ の 不動点 i.e. $U_\lambda v = v$ とする
以下 2" v の λ に independent な a priori 評価を 求める

補題 2.6.

$$\max_{0 \leq t \leq T} \int_{\Omega} \left(\frac{1}{2} |v_t|^2 + \frac{1}{2} |\nabla v|^2 + \frac{v^{p+1}}{p+1} \right) dx \leq M_1$$

$$\varepsilon \int_0^t \int_{\Omega} |\nabla v_t|^2 dx dt \leq M_1 \quad \text{for any } 0 \leq t \leq T$$

以下 $\varepsilon \in (0, T)$ に 依り λ に 無関係な 定数を $M_\#$ と 記す。

補題 2.7

$$\int_{\Omega} |\Delta v(t)|^2 dx \leq M_2 \quad 0 \leq t \leq T$$

補題 2.8

$$\max_{\overline{Q_T}} |v(x,t)| \leq M_3$$

補題 2.9. $v(x,t)$ は超函数的微分 $v_{x_j t}$ $j=1,2,3$
 $\in L^2(Q_T)$ をもつ. 更に

$$\int_0^T \int_{\Omega} |\nabla v_t|^2 dx dt \leq M_4$$

$$\int_{\Omega} v_t^2 dx \leq M_5 \quad \text{for each } t$$

補題 2.10

$$\int_{\Omega} |\Delta v_t|^2 dx \leq M_6$$

以上の条件より

補題 2.11. $0 < \beta < \frac{1}{2}$ なる β に $\exists T_L$.

$$\|v\|_{\beta} \leq M_7$$

この補題より, Leray-Schauder を用いて我々の
 定理をうる.

詳しい証明及び, compact argument については [3]
 をみられたい.

文献

- [1] C.M. Dafermos: The mixed initial-boundary value problem for the equations of non-linear one-dimensional viscoelasticity
J. of Diff. Eq. 6 71-86 (1969)
- [2] J.M. Greenberg, R.C. MacCamy & V.J. Mizel: On the existence, uniqueness, and stability of solutions of the equation $\sigma'(u_x)u_{xx} + \lambda u_{xt} = \rho_0 u_{tt}$
J. Math. Mech. 17 707-728 (1968)
- [3] A. Inoue: Another construction of a weak solution for $u_{tt} - \Delta u + u^p = 0$ to appear
- [4] O.A. Ladyzhenskaya, V.A. Solonnikov & N.N. Ural'eva
Linear and quasi-linear equations of parabolic type
vol 23 American Math. Soc. Providence 1968
- [5] I. F. Segal: The global Cauchy problem for a relativistic scalar field with power interaction
Bull. Math. Soc. France 91 129-135 (1963)
- [6] W. A. Strauss: On weak solutions of semi-linear hyperbolic equations to appear