

On the 2-part of Artin exponent of
finite groups.

東京教育大学大学院

山内 憲一

§ 1. Introduction

定義 π 有限群, \mathbb{Q} 有理数体

$G(\mathbb{Q}\pi)$ the Grothendieck ring of all rational
representations of π .

$G_c(\mathbb{Q}\pi)$ the ideal in $G(\mathbb{Q}\pi)$ generated by
rational representations of π induced
from cyclic subgroups.

このとき $G(\mathbb{Q}\pi) / G_c(\mathbb{Q}\pi)$ の smallest exponent
を Artin exponent といい, 記号 $A(\pi)$ で示す。

Artin の induction theorem により $A(\pi) \mid |\pi|$.

Example.

S_n : symmetric group on n elements.

D_8 : dihedral group of eight elements.

Q_8 quaternion group of eight elements.

とすると、各 group の Artin exponent は下のようになる。

π	$[\pi : 1]$	$A(\pi)$
S_4	24	2
S_5	120	4
D_8	8	2
Q_8	8	2
π cyclic	$[\pi : 1]$	1

Artin exponent については、T. Y. Lam [1] に相当くわしく研究されている。しかしながら、Artin exponent の 2-part (これを今後 $A_2(\pi)$ とする) についてはふれてはいない。それでここでは Artin exponent の 2-part を求めることにした。


話しの順序として上記の Lam の論文にある定理を引用しながら説明を進める。なお、この introduction で述べる定理の番号は Lam の論文に書かれている定理の番号を示すものである。

定理 7.4

p : odd prime, π finite group

$\pi^{(p)}$: π の p -Sylow subgroup, non cyclic

$$[\pi^{(p)} : 1] = p^n,$$



(a) $A_p(\pi) = p^n$ if \exists a cyclic p -free group $D \subset \pi$ normalized by $\pi^{(p)}$, on which the conjugate action of $\pi^{(p)}$ is faithful

(b) $A_p(\pi) = p^{n-1}$ if otherwise

Remark 1 $p=2$ で $\pi^{(2)} \neq D, Q, SD$ ならば上の定理はそのまま通用する。ただし D, Q, SD はそれぞれ dihedral group, quaternion group, semi-dihedral group (くわしい定義は後に述べる) とする。

Remark 2 p : prime number, $\pi^{(p)}$: cyclic group のとき $A_p(\pi)$ の値は知られている。特に $p=2$ でもよい。

定理 3.1 (Witt induction theorem)

$$A(\pi) = \text{l.c.m. } A(\pi') \quad \text{where the l.c.m.}$$

is taken over all hyperelementary subgroups π' of π .

Witt の induction theorem によって $A(\pi)$ の決定は本質的には hyperelementary subgroups のそれに帰着される。それゆえ、定理 7.4 に注目して、 π : semidirect product of 2-free cyclic group $C = \langle c \rangle$ with one of D, Q, SD とするとき、 $A_2(\pi)$ を求めることにした。

§ 2. Preliminaries

この節では Lam の論文 [1] に書かれている基本的な事項を列挙して後の参考にする。もう基本的な notation および定義をかかげる。

π : 有限群

$\pi_1 = 1, \pi_2, \dots, \pi_g$: a full set of nonconjugate cyclic subgroups of π .

1_j : a principal character of π_j

μ_j : induced character 1_j^* on π

このとき $\{\mu_j\}$ を Artin character と呼ぶ。

補題 2.1

μ_1, \dots, μ_g は \mathbb{Q} (有理数体) 上 1 次独立である。

定義 2.2 π : a finite group

χ を π の任意の rational character とするとき

$$m\chi = \sum_{k=1}^g a_k \mu_k, \quad a_k \in \mathbb{Z}$$

と書ける最小の正の整数 m を π の Artin exponent といい、これを $A(\pi)$ と書く。また $A(\pi)$ の倍数も Artin exponent といふことがある。

補題 2.3

1 : π の principal character, $d \in \mathbb{Z}$

このとき次の条件 (P) が成立すれば, d は Artin exponent である。

条件 (P) $d1 = \sum_{k=1}^g a_k \mu_k$ となるような整数 a_k が存在する。

また a_1, \dots, a_g に公約数がなければ, $d = A(\pi)$

[証明] χ any rational character of π とする。

$$d1 = \sum_{k=1}^g a_k \mu_k, \quad a_k \in \mathbb{Z} \quad \text{の両辺に } \chi \text{ を掛け}$$

$$\chi, \quad d\chi = \sum_{k=1}^g a_k \mu_k \chi = \sum_{k=1}^g a_k (1_{\pi_k} \cdot \chi|_{\pi_k})^*$$

$$\begin{aligned}
 & (\because \text{Frobenius reciprocity}) \\
 & = \sum_{k=1}^g a_k \mu'_k, \quad \mu'_k = (1_{\pi_k} \cdot \chi|_{\pi_k})^* \text{ a character on } \pi \\
 & \text{induced from some character of } \pi_k.
 \end{aligned}$$

π_k : cyclic group だから $A(\pi_k) = 1$

transitivity of the induction procedure から

$$\mu'_k = \sum_{j=1}^g b_{kj} \mu_j, \quad b_{kj} \in \mathbb{Z} \quad \text{と書ける}$$

したがって

$$d\chi = \sum_j \left(\sum_k a_k b_{kj} \right) \mu_j$$

ゆえに d は Artin exponent of π である。 [証明終]

補題 2.4

π' : a subgroup of a finite group π

$$\implies A(\pi') \mid A(\pi)$$

[証明] Artin exponent の定義から

$$A(\pi) 1 = \sum_{k=1}^g a_k \mu_k, \quad a_k \in \mathbb{Z}$$

Let i^* denote taking restriction of characters from π to π' .

$$i^*(A(\pi) 1) = \sum_{k=1}^g a_k i^*(\mu_k) \quad (1)$$

Mackey's subgroup theorem から

$i^*(\mu_k) =$ an integral combination of characters induced from trivial representations

of $x\pi_k x^{-1} \cap \pi'$

\therefore 各 $x\pi_k x^{-1} \cap \pi'$ は cyclic group であるから

(1) の右辺 = an integral combination of Artin characters on π' .

(1) の左辺 = $A(\pi) 1_{\pi'}$ where $1_{\pi'}$: principal character of π' .

ゆえに前補題より $A(\pi)$ は Artin exponent of π' .

したがって $A(\pi') \mid A(\pi)$ [証明終]

定義 2.5

$\pi \triangleright \pi'$. π' cyclic group

π/π' : p -group for some prime p

このとき π を hyperelementary group とする。

定理 2.6 (Witt induction theorem)

$$A(\pi) = \text{l.c.m. } A(\pi')$$

\therefore l.c.m. は π のすべての hyperelementary subgroup π' についてとられる。

[証明] 前補題より $\text{l.c.m. } A(\pi') \mid A(\pi)$ は明らか。

次に $d = \text{l.c.m. } A(\pi')$ とおいて $A(\pi) \mid d$ を証明する。

χ : 任意の rational character とする。

Witt の induction theorem (Swan [3]) から

$$\chi = \sum_j a_j \chi_j^* \quad , \quad a_j \in \mathbb{Z} \quad , \quad \chi_j \text{ characters on hyper-} \\ \text{elementary subgroups } \pi_j'$$

また $A(\pi_j') \mid d$ だから, $d\chi_j =$ an integral combination
of Artin characters on π_j' .

transitivity of operation $*$ によって

$d\chi =$ an integral combination of Artin characters
on π .

$$\therefore A(\pi) \mid d.$$

[証明終]

§3 Brauer coefficient theorem

π : 有限群

χ : π 上の任意の rational character とすれば,

Artin の induction theorem から

$$\chi = \sum_{\pi'} c_{\pi'} 1_{\pi'}^* \quad (1)$$

ここで π' は π のすべての cyclic subgroup を動く.

$c_{\pi'}$: 有理数

しかしながら Brauer によれば formula (1) はもっと
と精密化できる。

定理 3.1 (Brauer [2])

$$C_{\pi'} = \frac{1}{[\pi : \pi']} \sum_{\pi''} \mu([\pi'' : \pi']) \chi(x'')$$

where μ : Möbius function defined on the natural numbers. \sum is $\pi'' = \langle x'' \rangle \supseteq \pi'$

for cyclic subgroup π'' such that $\pi'' \supseteq \pi'$.

[証明] 式(1)の右辺を χ^* とおいて $\chi = \chi^*$ であることを証明する。

$\pi \ni \forall \alpha$ を取れば

(i) α が π' のどの element とも共役でないとき

$$1_{\pi'}^*(\alpha) = 0$$

(ii) α が π' の element と共役であるとき

$$1_{\pi'}^*(\alpha) = \frac{[N(\langle \alpha \rangle) : 1]}{[\pi' : 1]}$$

$$\text{ゆえに } \chi^*(\alpha) = \sum_{\pi'} C_{\pi'} 1_{\pi'}^*(\alpha)$$

$$= \frac{[N(\langle \alpha \rangle) : 1]}{[\pi' : 1]} \cdot \frac{1}{[\pi : \pi']} \sum'_{\pi'} \sum_{\pi'' \supseteq \pi'} \mu([\pi'' : \pi']) \chi(x'')$$

$$= \frac{[N(\langle \alpha \rangle) : 1]}{[\pi : 1]} \sum'_{\pi'} \sum_{\pi'' \supseteq \pi'} \mu([\pi'' : \pi']) \chi(x'')$$

ただし和 \sum' は、 α と共役な element を含むような π の cyclic subgroup π' について取られる。

さて $\langle \alpha \rangle$ に共役な group は $[\pi : N(\langle \alpha \rangle)]$ 個存在する。それらを $\langle \alpha \rangle, \langle \alpha' \rangle, \langle \alpha'' \rangle, \dots$ とする。

上の和 \sum' における π' は (高々) 1個のそのような $\langle \alpha \rangle$ を含むことができる。したがって

$$\chi^*(\alpha) = \sum_{\pi'} \sum_{\pi''} \mu([\pi'' : \pi']) \chi(x'')$$

ここで和 \sum'' は $\langle \alpha \rangle$ を含む cyclic subgroup π' についてのみとられる。

さらに次のように変形できる。

$$\chi^*(\alpha) = \sum_{\pi''}^* \chi(x'') \sum_{\pi'}''' \mu([\pi'' : \pi'])$$

$$\text{in } \sum^*, \pi'' \supseteq \langle \alpha \rangle \quad ; \quad \text{in } \sum''', \pi'' \supseteq \pi' \supseteq \langle \alpha \rangle.$$

x'' の order = m , α の order = q とすれば,

$$\sum_{\pi'}''' \mu([\pi'' : \pi']) = \sum_{d | \frac{m}{q}} \mu(d) = \begin{cases} 0 & m \neq q \\ 1 & m = q \end{cases}$$

$$m = q \text{ のとき } \pi'' = \langle x'' \rangle = \langle \alpha \rangle$$

$$\therefore \chi(x'') = \chi(\alpha) \quad (\text{Artin の定理})$$

$$\therefore \chi^*(\alpha) = \chi(\alpha) \quad [\text{証明終}]$$

定理 3.2 (Brauer coefficient theorem)

$$1 = \sum_{j=1}^q b_j \mu_j \quad \text{where } b_j = \frac{1}{[N\pi_j : \pi_j]} \sum_{\pi'} \mu([\pi' : \pi_j])$$

和 \sum は $\pi' \supseteq \pi_j$ である cyclic subgroup π' すべてに

わたり取られる。

[証明] The number of π' conjugate to a fixed π_j
 $= [\pi : N(\pi_j)]$

そして $\pi' \sim \pi_j$ (i.e. conjugate) $\implies 1_{\pi'}^* = 1_{\pi_j}^* = \mu_j$

ゆえに定理 3.1 を使用すれば上の結論を得る。 [証明終]

定理 3.3

π_1, π_2 有限群 $(|\pi_1|, |\pi_2|) = 1$
 $\implies A(\pi_1 \times \pi_2) = A(\pi_1)A(\pi_2)$

[証明] T.Y. Lam [1] 参照.

Example (Brauer の定理の応用)

$SD = \langle a, b \rangle$ semi-dihedral group

$a^{2^n} = 1, b^2 = 1, bab^{-1} = a^{-1+2^{n-1}}, n \geq 3$

とすれば, $A(SD) = 4$

注 Lam [1] では $A(SD) = 2$ となっていてはこれば
 間違いである。

以下に $A(SD) = 4$ の証明を述べる。

SD の構造を調べる。その cyclic groups が共役である
 ことを " \sim " の記号で表わせば,

$\langle b \rangle \sim \langle a^2 b \rangle \sim \dots \sim \langle a^{2^n - 2} b \rangle$ 2^{n-1} 個の
 order 2 の cyclic group

$\langle a^{2^{n-1}} \rangle$ order 2 の cyclic group でこれのみで共役類をなす。

$\langle ab \rangle \sim \langle a^3b \rangle \sim \dots \sim \langle a^{2^{n-1}-1}b \rangle$: 2^{n-2} 個の order 4 の cyclic group.

• 包含関係 $\langle a^{2^{l+1}}b \rangle \supset \langle a^{2^{n-1}} \rangle$

$$\langle a^{2^{l+1}}b \rangle = \langle a^{2^{n-1}+2^{l+1}}b \rangle$$

次の5つの場合に分けて $A(SD)$ を求める。任意の cyclic subgroup π_j を取る。

(i) π_j の generator が $\langle a \rangle$ に含まれていないとき

$[\pi_j : 1] = 2$ or 4 , とこが π_j と共役なもの個数はそれぞれ 2^{n-1} or 2^{n-2} であるから $[N\pi_j : \pi_j] = 2$

(ii) $\pi_j = \langle a^{2^{n-1}} \rangle$ のとき

まづ $[N\pi_j : \pi_j] = 2^n$. π_j に対応する Brauer 係数の分子を考えると, それは

$$\sum_{\pi'} \mu([\pi' : \pi_j]) = 1 - (2^{n-2} + 1) = -2^{n-2}$$

\therefore 和 \sum は $SD \supset \pi' \supset \pi_j$ なるすべての cyclic group π' について取られる。

$$\text{ゆえに Brauer 係数} = -2^{n-2} / 2^n = -\frac{1}{4}$$

(iii) $\pi_j \subset \langle a \rangle$ but $\pi_j \neq 1, \langle a^{2^{n-1}} \rangle, \langle a \rangle$ のとき

$[\pi_j : 1] \geq 4$ より, $SD \supset \pi' \supset \pi_j$ とする cyclic group π' はすべて $\langle a \rangle$ に含まれる。従って π_j に対応する

Brauer 係数の分子は, $\sum_{\pi'} \mu([\pi' : \pi_j]) = \mu(1) + \mu(2) = 0$

(iv) $\pi_j = \langle a \rangle$ のとき 明らかに $[N\pi_j : \pi_j] = 2$

(v) $\pi_j = \langle 1 \rangle$ のとき

order 2 の cyclic groups の個数は $2^{n-1} + 1$. $\therefore \pi_j$ に
対応する Brauer 係数は, $\{1 - (2^{n-1} + 1)\} / 2^{n+1} = -\frac{1}{4}$

以上 (i) ~ (v) により $A(SD) = 4$

§ 4 On the 2-part of Artin exponent of finite groups

定義

$D = \langle a, b \rangle$ dihedral group

$$a^{2^n} = 1, \quad b^2 = 1, \quad bab^{-1} = a^{-1}, \quad n \geq 2$$

$Q = \langle a, b \rangle$ quaternion group

$$a^{2^n} = 1, \quad b^2 = a^{2^{n-1}}, \quad bab^{-1} = a^{-1}, \quad n \geq 2$$

$SD = \langle a, b \rangle$ semidihedral group

$$a^{2^n} = 1, \quad b^2 = 1, \quad bab^{-1} = a^{-1+2^{n-1}}, \quad n \geq 3$$

補題 4.1

$a^2 \in [G, G]$ for any $G = D, Q, SD$

The factor commutator group of G is of

type $(2, 2)$.

[証明] $a^2 = aba^{-1}b^{-1}$ for $G = D, Q$
 $a^2 = (aba^{-1}b^{-1})^{1-2^{n-2}}$ for $G = SD$.

後半は明らか。

補題 4.2

π : 有限群

π_j : π の nonmaximal 巡回群

π_0 : π_j を含む π の maximal 巡回群

$$\implies \sum_{\pi'} \mu([\pi' : \pi_j]) = 0$$

和 \sum は $\pi_0 \supseteq \pi' \supseteq \pi_j$ なるすべての巡回群 π' についてとられるものとする。

[証明] $[\pi_0 : \pi_j] = h$ とすれば, $\sum_{\pi'} \mu([\pi' : \pi_j]) = \sum_{d|h} \mu(d)$
 とこのが $\sum_{d|h} \mu(d) = \begin{cases} 1 & \text{if } h=1 \\ 0 & \text{if } h>1 \end{cases}$

π_j : nonmaximal 巡回群であるから $[\pi_0 : \pi_j] = h > 1$

$$\therefore \sum_{\pi'} \mu([\pi' : \pi_j]) = 0 \quad \text{[証明終]}$$

補題 4.3

$G = D, Q (n \geq 3), SD$

$C = \langle c \rangle$ 2-free cyclic group on which G operates.

$\pi = C \cdot D, C \cdot Q, C \cdot SD$ semidirect product

\implies

$\langle ca^2 \rangle = \langle c \rangle \langle a^2 \rangle$: a normal maximal cyclic subgroup of π , if $ac \neq ca$.

[証明] a^2 を含む G の cyclic subgroup は $\langle a^2 \rangle$ および $\langle a \rangle$ だけである。もし $\langle d \rangle \ni ca^2$ とすれば $\langle d \rangle / C \ni a^2$. 仮定から $\langle d \rangle / C \not\ni a$
 $\therefore \langle d \rangle / C = \langle a^2 \rangle \quad \therefore \langle d \rangle = \langle ca^2 \rangle$

また明らかに $\pi \triangleright \langle ca^2 \rangle = \langle c \rangle \langle a^2 \rangle$ [証明終]

定理 4.4 $C = \langle c \rangle$ 2-free cyclic group on which D operates.

$\pi = C \cdot D$ semidirect product.

$$\implies A_2(\pi) = \begin{cases} 2 & \text{if } ac = ca. \\ 4 & \text{if } ac \neq ca. \end{cases}$$

まづ次の補題を証明する。

補題 4.5

$$\langle c^i a^{2^l} \rangle \not\subseteq \langle c^r a^t b \rangle \text{ for } 1 \leq l \leq 2^{n-1} - 1$$

[証明] $(c^r a^t b)^2 = c^r (a^t b) c^r (a^t b)^{-1} \in C$ [証明終]

さて定理 4.4 の証明にとりかかる。任意の cyclic subgroup $\pi_d \subseteq \pi$ を取る。

Step 1. $\pi_d = \langle c^i a^j b \rangle, i \geq 0, j \geq 0 \implies$

2-part of $[N\pi_d : \pi_d] = 2$.

Denote natural hom $\pi = C \cdot D \xrightarrow{\psi} \pi/C = D$
 $\psi \circ \alpha \longmapsto \bar{\alpha} \circ \psi$

もし $x \in N(\pi_d)$ ならば $\bar{x} \in N_D(\langle a^j b \rangle)$.

$N_D(\langle a^j b \rangle)$ は $1, a^{2^{n-1}}, a^j b, a^{j+2^{n-1}} b$ の4つの element からなる group である。

ゆえに 2-part of the order of $N(\pi_d) = 4$

したがって 2-part of $[N\pi_d : \pi_d] = 2$

Step 2. On the Brauer coefficient at $\pi_d = C' C C$

$\rho_{\pi}^{C'} = \sum_{\pi''} \mu([\pi'' : C'])$ とおく。ただし π'' は 2-regular component が C' に等しい π の cyclic group すべてを動く。

補題 4.6 $2^{n-1} \mid \rho_{\pi}^{C'}$

特に $a \in \text{centralizer of } C' \implies 2^n \mid \rho_{\pi}^{C'}$

[証明] centralizer of C' を $\text{Cent}(C')$ と書く。

明らかに $\text{Cent}(C')$ の中で $\rho_{\pi}^{C'}$ を求めればよい。そこで

$\pi'' = C' \times Y$ (Y : a 2-group) と書いておこう。

$\pi'' = C' \times Y$ が $\rho_{\pi}^{C'}$ に影響するのは, Y の order が 1 または 2 のときだけである。 $a^{2^{n-1}}$ を除いて order 2 の element は $y = c^i a^j b$ の形のものばかりである。

$$y \in \text{Cent}(C') \implies a^2 y \in \text{Cent}(C')$$

\therefore number of possible Y of order 2 $\equiv 1 \pmod{2^{n-1}}$

$$\therefore P_{\pi}^{C'} = 1 - \text{number of } Y \equiv 0 \pmod{2^{n-1}}$$

次に $a \in \text{Cent}(C') \implies$ all $a^2 y \in \text{Cent}(C')$
for any $y \in \text{Cent}(C')$

$$\therefore P_{\pi}^{C'} = 1 - \text{number of } Y \equiv 0 \pmod{2^n} \quad [\text{証明終}]$$

cyclic subgroup $C' \subseteq C$ に対して $P_{\pi}(C') =$

$$\sum_{\pi''} \mu([\pi'' : C']) \text{ とおく. ここで } \pi'' \text{ は } \pi'' \supseteq C' \text{ なる } \pi$$

の cyclic subgroup π'' すべてを動くとする。

すなわち $P_{\pi}(C')$ は C' における Brauer 係数の分子を表わす。

補題 4.7 $2^{n-1} \mid P_{\pi}(C')$

特に $ca = ac \implies 2^n \mid P_{\pi}(C')$

[証明] $P_{\pi}(C') = \sum_{C''} P_{\pi}^{C''} \mu([C'' : C'])$, where C'' runs
over all subgroups between C' and C .

ゆえに前補題より上の結論を得る。

Step 3. On the Brauer coefficient

$$\text{at } \pi_d = \langle c^i a^j \rangle, \quad i \geq 0, j \geq 1$$

もし j が奇数ならば, 2 -part of $|\langle c^i a^j \rangle| = 2^n$

$\therefore 2\text{-part of } [N\pi_d : \pi_d] \leq 2$

それゆえ、今後は $j = 2l$ (偶数), $1 \leq l \leq 2^{n-1} - 1$ と仮定する。

Case 1 $ca = ac$

$$\langle c^i a^{2l} \rangle = \langle c^i \rangle \langle a^{2l} \rangle \subset \langle ca \rangle = \langle c \rangle \langle a \rangle$$

且 $\langle ca \rangle$: maximal cyclic subgroup

補題 4.5 から, $\langle c^i a^{2l} \rangle$ を含む π のすべての cyclic subgroup は $\langle ca \rangle$ に含まれる。ゆえに補題 4.2 より

$$\text{Brauer coefficient at } \pi_d (= \langle c^i a^{2l} \rangle) = 0$$

Case 2 $ca \neq ac$

(i) $\pi_d = \langle ca^2 \rangle$ のとき

補題 4.3 から $\pi_d = \langle ca^2 \rangle$: a normal maximal cyclic subgroup of π .

$$\therefore [N\pi_d : \pi_d] = 4$$

(ii) $\pi_d = \langle c^i a^{2l} \rangle$ non maximal のとき

$$\pi_d = \langle c^i a^{2l} \rangle \subset \langle c \rangle \langle a^2 \rangle = \langle ca^2 \rangle \text{ (maximal)}$$

$$\therefore \rho_\pi(\pi_d) = \sum_{\pi \supseteq \pi' \supseteq \pi_d} \mu([\pi' : \pi_d]) = \sum_{\langle ca^2 \rangle \supseteq \pi' \supseteq \pi_d} \mu([\pi' : \pi_d])$$

が成立することを示す。補題 4.5 から, $\pi_d = \langle c^i a^{2l} \rangle$ を含み, $\langle ca^2 \rangle$ には含まれないような cyclic group は $\langle c^{\alpha} a^{2k+1} \rangle$ のような type のものにかぎる。

2-part of $|\langle c^\alpha a^{2^k+1} \rangle| = 2^n$,

2-part of $|\pi_d| \leq 2^{n-2}$ ($\because \pi_d$: non maximal)

ゆえに 2-part of $[\langle c^\alpha a^{2^k+1} \rangle : \pi_d] = 2^2$ の倍数

もし $\pi' = \langle c^\alpha a^{2^k+1} \rangle$ ならば, π' は $p_\pi(\pi_d) = \sum_{\pi \supset \pi' \supset \pi_d} \mu([\pi' : \pi_d])$ に影響を与えない。つまりこのように $\pi' = \langle c^\alpha a^{2^k+1} \rangle$ は除外してよい。すなわち

$$p_\pi(\pi_d) = \sum_{\langle ca^2 \rangle \supset \pi' \supset \pi_d} \mu([\pi' : \pi_d])$$

ゆえに補題 4.2 から $p_\pi(\pi_d) = 0$

以上 Step 1 ~ Step 3 から, 定理の証明は完結する。

[証明終]

これから Q_n と書いたとき, quaternion group of n elements を表わすものとする。同様にして以下を得る。

定理 4.8

$\pi = C \cdot Q_{2^{n+1}}$, $n \geq 3$ semidirect product

$$\implies A_2(\pi) = \begin{cases} 2 & \text{if } ac = ca \\ 4 & \text{if } ac \neq ca \end{cases}$$

定理 4.9

$\pi = C \cdot Q_8$ semidirect product

$$\implies A_2(\pi) = \begin{cases} 2 & \text{if one of } a, b, ab \text{ commutes with } c \\ 4 & \text{if otherwise} \end{cases}$$

定理 4.10

$$\pi = C \cdot SD \text{ semidirect product} \implies A_2(\pi) = 4$$

References

- [1] Lam, T. Y. Artin exponent of finite groups
Journal of algebra 9. 94-119 (1968)
- [2] Brauer, R. Beziehungen zwischen Klassen-
zahlen von Teilkörpern eines galoisschen
Körpers. Math. Nachr. 4 (1950-51) 158-174
- [3] Swan, R. Induced representations and
projective modules. Ann. Math 71
(1960) 552-578
- [4] Swan, R. The Grothendieck ring of a finite
group. Topology 2, (1963) 85-110.
- [5] Curtis, C and Reiner, I. Representation
theory of finite groups and associate
algebras. Wiley (Interscience)
New York 1962.