

自由双対棒構成の非輪状性 (Free Cobar Construction)

東大 教養 青本和彦

1. 添加写像 $\varepsilon: \Lambda \rightarrow \mathbb{Z}$ を持つ結合環 Λ の生成系と関係式達が与えられているとする。すなわち射

$$(0) \rightarrow L \xrightarrow{\iota_0} \Lambda^f \xrightarrow{\kappa_0} \Lambda \rightarrow (0)$$

が与えられているとする。ここに Λ^f は自由結合環 L は Λ の関係式達を決定する両側イデアル (Λ^f の) である。

[問題] Λ^f の両側モジュールの系列 $\{A_j\}$ $j \geq 0$,
 $A_0 = \Lambda^f$ で $A = \sum_{j=0}^{\infty} A_j$ は自由結合環,
射 $A_j \xrightarrow{\delta_j} A_{j-1}$ ($j \geq 1$), L による A
は複体, 且つ $\delta_1 A_1 = L$

となるものが存在するか? 存在するならばそれは
いかくして構成されるか?

この問題において環 Λ の代わりに群 G をとり
且つ A_j をすべて自由群ととった場合にはこれは
よくより知られている (K. Reidemeister, R. Pfeiffer

P. A. Smith [1], D. M. Kan [2] など)。

これを環にして考えた場合 近年 イリノイ大学の K. T. Chen 氏^[3] によって研究されている 微分型式の反復積分 又その双対概念である J. Adams の棒構成 と密接な関係にあることを示すのが本稿の目的である (K. Aomoto [4])

左 Λ -加群複体 (X, ∂) に対し

Assump. I. i) 左 Λ^f -加群の2系列 (X^f, ∂^f) と $(L \otimes_{\Lambda^f} X^f, 1 \otimes_{\Lambda^f} \partial^f)$ と添加写像 ϵ^f

$$(0) \longrightarrow (\Lambda^f)^+ \longrightarrow \Lambda^f \xrightarrow{\epsilon^f} \mathbb{Z} \longrightarrow (0)$$

が次の可環図式を持つとする。

$$\begin{array}{ccccccc}
 (0) & & (0) & & (0) & & (0) & & (0) \\
 \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 \rightarrow X_p & \xrightarrow{\partial_p} & X_{p+1} & \rightarrow \dots & \rightarrow & X_1 & \xrightarrow{\partial_1} & \Lambda & \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow (0) \\
 \uparrow \kappa_p & & \uparrow \kappa_{p+1} & & & \uparrow \kappa_1 & & \uparrow \kappa_0 & \\
 \rightarrow X_p^f & \xrightarrow{\partial_p^f} & X_{p+1}^f & \rightarrow \dots & \rightarrow & X_1^f & \xrightarrow{\partial_1^f} & \Lambda^f & \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow (0) \\
 \uparrow \iota_p & & \uparrow & & & \uparrow \iota_1 & & \uparrow \iota_0 & \\
 \rightarrow L \otimes_{\Lambda^f} X_p^f & \xrightarrow{1 \otimes \partial_p^f} & L \otimes_{\Lambda^f} X_{p+1}^f & \rightarrow \dots & \rightarrow & L \otimes X_1^f & \xrightarrow{1 \otimes \partial_1^f} & L & \\
 \uparrow & & \uparrow & & & \uparrow & & \uparrow & \\
 (0) & & (0) & & & (0) & & (0) &
 \end{array}$$

ここに κ_p は全射, X_p と X_p^f は 各々 $\Lambda \otimes S_p$ と $\Lambda^f \otimes S_p$

に同型, S_p は自由アーベル群, で $L = X_2^f \otimes \Lambda^f$.

ii) ∂_p^f は単射, $p \geq 1$.

$X^f = \left(\sum_{p=2}^{\infty} X_p^f \right) \oplus \Lambda^f$ とおき $T(X^f)$ を X^f のテンソル環としこれを A とおく. すると A の任意の元は $u_1 [u_2 | \dots | u_{m-1}] u_m$, $u_j \in X_{p_j}^f$ ($p_j \geq 2$), $j \leq m-1$, $u_m \in \Lambda^f$ の線型合成で得られる. この形の元の次数を $\sum_{j=1}^{m-1} (p_j - 1)$ とおくことにより A は階級環: $A = \sum_{s=0}^{\infty} A_s$ となる. 明らかに $A_0 = \Lambda^f$, $A_1 = L$ である.

$\{u_\gamma^p, \gamma \in \Gamma_p\}$ を S_{p+1} の順序づけられた基底とし $\{u_\gamma^0, \gamma \in \Gamma_0\}$ を $(\Lambda^f)^+$ の順序づけられた生成系とする. このとき A は $u_\gamma^p, \gamma \in \Gamma_p, p \geq 0$ で生成された自由結合環である.

[定義 1] $u_\alpha^p, \alpha \in \Gamma_p$ 対し $u_\beta^q, \beta \in \Gamma_q$ より
 “大きい” とは $p > q$ 又は $p = q, \alpha > \beta$ のときである.
 並び $u_{\alpha_1}^{p_1} \dots u_{\alpha_m}^{p_m}$ 対し $u_{\beta_1}^{q_1} \dots u_{\beta_n}^{q_n}$ より “大きい” とは
 $p_m = q_n, \alpha_m = \beta_n, \dots, p_{m-k+1} = q_{m-k+1}, \alpha_{m-k+1} = \beta_{m-k+1}$

\exists $P_{m-k} > Q_{m-k}$ 又は $P_m = Q_m, \alpha_m = \beta_m, \dots, P_{m-k+1} =$
 $= Q_{m-k+1}, \alpha_{m-k+1} = \beta_{m-k+1}, P_{m-k} = Q_{m-k}$ \exists $\alpha_{m-k} > \beta_{m-k}$
 となるときである。 $A(p_1, p_2, \dots, p_m)$ を $u_{p_1}^{p_1} \dots u_{p_m}^{p_m}$,
 $\gamma_v \in \Gamma_{p_v}, p_v \geq 1$ で生成される A の Λ^f -左加群
 とする。又 $\mathcal{O}(p_1, \dots, p_m)$ を $\sum_{(q_1, \dots, q_m) \in \mathcal{K}(p_1, \dots, p_m)} A(q_1, \dots, q_m)$ と

おこ。

このときさらに次の仮定をおく。

Assump II. i) 境界作用素の系列 $\delta = \{\delta_s\}$,
 $\delta_s: A_s \rightarrow A_{s-1}$ が存在して i) $\delta_s u^s \equiv \partial_{s+1}^f u^s$
 mod. $\mathcal{O}(s-1)$, $u^p \in S_{p+1}$
 ii) $\delta u_1[u_2 | \dots | u_{m-1}]u_m =$
 $= \sum_{j=1}^m (-1)^{\sum_{i=1}^{j-1} \deg u_i} \cdot u_1[u_2 | \dots | u_{j-1} | \delta u_j | \dots | u_{m-1}]u_m$

iii) $\delta|_{A_1}$ は ι_0 と一致する。

この仮定の仮定をみたす時 複体 (A, δ)

$$\rightarrow A_s \xrightarrow{\delta_s} A_{s-1} \xrightarrow{\delta_{s-1}} \dots \xrightarrow{\delta_2} A_1 \xrightarrow{\iota_0} \Lambda \xrightarrow{f \chi_0} \Lambda \rightarrow (0)$$

のことを 自由双対棒構成 と呼ぶ。

[主定理] 左 Λ -加群複体 (X, ∂) が Λ の自由分解となるための必要十分条件は A のホモロジーに対して

$$\begin{cases} H_p(A) = 0 & p \geq 1 \\ H_0(A) \cong \Lambda \end{cases}$$

が成立することである。

この定理の下で冒頭の問題のひとつの解答が得られた。

次にいくつかの実例を与える。

② 作用素つき Adams 双対棒構成

M を連結単体的複体, x_0 を M の基底とする。 N を x_0 を含む極大“木”とする。 M/N は x_0 のみを頂点とする CW-複体になる。その複体を $C_*(M/N)$ とおく。 G を $(M/N, x_0)$ の辺道群とすれば G は自然に (M, x_0) の基本群と同型である。 (M, x_0) の簡約閉道全体は自由群の構造を持つ。これを F とおく。 L を簡約 2-単体 $\langle u_0, u_1, u_2 \rangle \rightarrow M/N$ から得られる基本関係

$$\partial_1 T\langle u_0, u_1, u_2 \rangle = T\langle \tilde{u}_0, u_1 \rangle \cdot T\langle u_1, \tilde{u}_2 \rangle - T\langle u_0, \tilde{u}_2 \rangle$$

よって生成される $\mathbb{Z}[F]$ の両側イデアルとする。ここで $T\langle \tilde{u}_0, u_1 \rangle, T\langle u_1, \tilde{u}_2 \rangle, T\langle u_0, \tilde{u}_2 \rangle$ は F の元を定める。

$X_p = \mathbb{Z}[G] \otimes C_p(M/N)$, $X = \sum_{p=0}^{\infty} X_p$ とおく。
 又 $X^f = \mathbb{Z}[F] \otimes C_*(M/N)$ とおき ∂^f を

$$\begin{aligned} \partial_n^f T\langle U_0 U_1 \cdots U_n \rangle &= T\langle \widetilde{U}_0 U_1 \rangle \cdot T\langle U_1 U_2 \cdots U_n \rangle + \\ &+ \sum_{i=1}^n (-1)^i \cdot T\langle U_0 U_1 \cdots U_{i-1} U_{i+1} \cdots U_n \rangle \end{aligned}$$

$T\langle \widetilde{U}_0 U_1 \rangle \in F$. 又 ∂_{n-1} を

$$\begin{aligned} \partial_n T\langle U_0 U_1 \cdots U_n \rangle &= T\langle \widetilde{U}_0 U_1 \rangle \cdot T\langle U_1 U_2 \cdots U_n \rangle + \\ &+ \sum_{i=1}^{n-1} (-1)^i \cdot T\langle U_0 U_1 \cdots U_{i-1} U_{i+1} \cdots U_n \rangle + \\ &+ (-1)^n \cdot T\langle U_0 U_1 \cdots U_{n-1} \rangle \cdot T\langle \widetilde{U}_{n-1} U_n \rangle + \\ &- \sum_{i=2}^{n-2} (-1)^i \cdot T\langle U_0 U_1 \cdots U_i \rangle \cdot T\langle U_i \cdots U_n \rangle, \end{aligned}$$

$T\langle \widetilde{U}_0 U_1 \rangle, T\langle \widetilde{U}_{n-1} U_n \rangle \in F$ により定義すれば
 我々の仮定 I, II を満たす。従って主定理により

[定理 2]. M が $K(\mathbb{Z}, 1)$ 空間であるための
 必要十分条件は $H_p(A) \cong 0, p \geq 1$ で
 $H_0(A) \cong \mathbb{Z}[G]$ となることである。

3. \mathcal{O}_y を \mathbb{Z} 上の Lie 環とする。 $E(\mathcal{O}_y)$ または $T(\mathcal{O}_y)$ を各々 \mathcal{O}_y の展開環又はテンソル環とする。このとき射

$$\mathcal{O} \rightarrow L \xrightarrow{\iota_0} T(\mathcal{O}_y) \xrightarrow{\kappa_0} E(\mathcal{O}_y) \rightarrow \mathcal{O}$$

が存在し L は $x \cdot y - y \cdot x - [x, y]$, $x, y \in \mathcal{O}_y$ で生成される $T(\mathcal{O}_y)$ の両側イデアルである。 (X, ∂) を $E(\mathcal{O}_y)$ の正規標準複体,

(X^f, ∂^f) を $T(\mathcal{O}_y)$ のそれとすれば

$(X, \partial), (X^f, \partial^f)$ は Assump I i) の可環

図式をみたす。ここで $X_p = E(\mathcal{O}_y) \otimes \wedge^p \mathcal{O}_y$,

$X_p^f = T(\mathcal{O}_y) \otimes \wedge^p \mathcal{O}_y$ である。さて

$\langle x_1 x_2 \cdots x_n \rangle \in \wedge^n \mathcal{O}_y$ に対して

$$\partial^f \langle x_1 x_2 \cdots x_n \rangle = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} x_i \langle x_1 \cdots x_{i-1} x_{i+1} \cdots x_n \rangle +$$

$$+ \sum_{1 \leq i < j \leq n} (-1)^{i+j} \langle [x_i x_j] x_1 \cdots x_{i-1} x_{i+1} \cdots x_{j-1} x_{j+1} \cdots x_n \rangle$$

棒構成 (A, δ) に対しては

$$\delta \langle x_1 x_2 \cdots x_n \rangle = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} x_i \langle x_1 \cdots x_{i-1} x_{i+1} \cdots x_n \rangle +$$

$$+ \sum_{1 \leq i < j \leq n} (-1)^{i+j} \langle [x_i x_j] x_1 \cdots x_{i-1} x_{i+1} \cdots x_{j-1} x_{j+1} \cdots x_n \rangle +$$

$$+ \sum_{2 \leq i_1 \leq i_2} \sum_{\substack{i_1 < \dots < i_{i_1} \\ i_{i_1+1} < \dots < i_n}} (-1)^{i_1} \operatorname{sgn} \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n \\ i_1, i_2, \dots, i_n \end{pmatrix} \langle x_{i_1} \dots x_{i_{i_1}} \rangle \langle x_{i_{i_1+1}} \dots x_{i_n} \rangle +$$

$$+ \sum_{i=1}^n (-1)^i \langle x_1 \dots x_{i-1} x_{i+1} \dots x_n \rangle x_i, \quad n \geq 3$$

$$\delta \langle x_1 x_2 \rangle = x_1 x_2 - x_2 x_1 - [x_1, x_2] \quad n=2$$

とおく。すると Assump I, II をみたし

$$[\text{定理 3}] \quad H_p(A) \cong 0, \quad p \geq 1$$

$$H_0(A) \cong \mathbb{C}(\mathfrak{g}) \quad p=0$$

4. しかし抽象的に生成元と基本関係式が与えられた群 G に対して冒頭の問題が具体的に構成出来るというものではない。これを特に Artin 群について説明した。

$\Pi = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\ell\}$ を半単純 Lie 環 \mathfrak{g} の基本根基底とする。ここで ℓ は rank. $\Delta = \Delta^+ \cup \Delta^-$ を正根、負根の和集とする。 $\mathfrak{g} = \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{m}^+ \oplus \mathfrak{m}^-$ (Cartan 分解), Π の Weyl 群 W の各 α_j に対応する鏡映を σ_j とするとき

$$W = \{ \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_\ell \mid \sigma_j^2 = 1 \}$$

$$\underbrace{\sigma_i \sigma_j \sigma_i \dots}_{m_{ij}} = \underbrace{\sigma_j \sigma_i \sigma_j \dots}_{m_{ij}}$$

この $M = (m_{ij})$ は Coxeter 行列である。 Π の Artin 群 \hat{W} は

$$\hat{W} = \{ \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_\ell \mid \underbrace{\sigma_i \sigma_j \sigma_i \dots}_{m_{ij}} = \underbrace{\sigma_j \sigma_i \sigma_j \dots}_{m_{ij}} \}$$

によって定義される (Brieskorn-Saito [5])。従って完全列

$$\{1\} \rightarrow K \rightarrow \hat{W} \xrightarrow{\lambda} W \rightarrow \{1\}$$

がある。しかも \hat{W}^+ (\hat{W} の正語のみなる部分 monoid) $\cong W$ 。

Π の任意の部分図形 Π' に対してその根系 Δ' , 正根・負根 Δ^+ , Δ^- , 対応する簡約部分環 $\mathfrak{g}(\Delta')$ の Cartan 分解を

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}(\Delta') \oplus \mathfrak{m}^+ \oplus \mathfrak{m}^-$$

とする。ここに \mathfrak{m}^+ は正根ベクトル $\subset \mathfrak{m}^+$, \mathfrak{m}^- は負根ベクトル $\subset \mathfrak{m}^-$, Π' に対応する Weyl 群を

$W(\Pi')$ とおくと $\forall \sigma \in W$ に対して
 $\Phi_\sigma = (-\sigma \Delta^+) \cap \Delta^+$ と記すと

$$W^*(\Pi) = \left\{ \sigma \in W \mid \Phi_\sigma \subset \Delta(\mathfrak{h}^+) \right\}$$

($\Delta(\mathfrak{h}^+)$ は \mathfrak{h}^+ に含まれる正根基集合)

よく知られているように

Lemma 1. $W(\Pi') \setminus W = W^*(\Pi')$

よかも $\forall \sigma \in W^*(\Pi')$, $\tau \in W(\Pi')$ に対して

$$l(\tau\sigma) > l(\sigma)$$

($l(\sigma)$ は σ の長さ)

今 Π の部分図形で nk が $(l-1)$ のものを
 すべて考える。それらを

$$\Pi_j = \left\{ \alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_l \right\}$$

$1 \leq j \leq l$

とおき 対応する Weyl 群 W_j , 根基系 Δ_j など
 記すとき, \hat{W} の u の自由分解が次のように
 して得られる (Deligne [6], 中村(得) [7] など
 参照): Π の部分図形全体で生成され
 る自由アーベル群を S とおく. して $\dim \langle \Pi' \rangle =$
 $nk \Pi'$ とおき, \hat{W} の 棒環解 $\mathcal{B}(\hat{W}) = \mathbb{Z}[W] \otimes S$

は

$$\langle \pi' \rangle = \sum_{i=1}^{l'} \sum_{\omega \in \bar{\lambda}^{-1}(W^*(\pi'_i) \cap \hat{W}^+)} \text{sgn } \lambda(\omega) \cdot \omega \langle \pi'_i \rangle$$

∴ π'_i は $\pi' = \{\alpha'_1, \dots, \alpha'_{l'}\}$ に対して

$$\pi'_i = \{\alpha'_1, \dots, \alpha'_{i-1}, \alpha'_{i+1}, \dots, \alpha'_{l'}\}$$

$\{B[\hat{W}], \partial\}$ は非輪状である。従って $B[\hat{W}]$ は \hat{W} の自由添字を与える。

π_1, π_2 を π の互いの部分図形とし, W_1, W_2 を対応する W の互いの部分群とする。Cartan分解を各々 $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_1 \oplus \mathfrak{u}_1^+ \oplus \mathfrak{u}_1^- = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{u}_2^+ \oplus \mathfrak{u}_2^-$ とおく。

$${}^1W^2 = \left\{ \sigma \in W \mid \begin{array}{l} (-\sigma\Delta^+) \cap \Delta^+ \subset \Delta^+(\mathfrak{u}_1) \\ (-\sigma\Delta^+) \cap \Delta^+ \subset \Delta^+(\mathfrak{u}_2) \end{array} \right\}$$

とおくと ${}^1W^2 \cong W_1 \backslash W / W_2$

$$\begin{array}{l} L(\tau_1 \sigma \tau_2) > L(\sigma \tau_2) > L(\sigma) \\ > L(\tau_1 \sigma) > \end{array}$$

$\tau_1 \in W_1, \tau_2 \in W_2, \sigma \in {}^1W^2$; ${}^1W^2 = W(\pi_1, \pi_2)$ と記す。 $\langle \pi' \rangle$, $1 \leq \text{rk } \pi' \leq l$ により生成される自由結合環を A とおくと

$\text{rk } 1$ の π' を $\langle \alpha_1 \rangle, \dots, \langle \alpha_l \rangle$ とし $\langle \alpha_1 \rangle, \dots, \langle \alpha_l \rangle$

で生成される自群を F とおくと

$$0 \rightarrow L \rightarrow \mathbb{Z}[F] \xrightarrow{\mu} \mathbb{Z}[\hat{W}] \rightarrow 0$$

なる完全列があり L は $\mathbb{Z}[\hat{W}]$ を決めるイデアルである。

A k 次の境界作用素 δ を導入して

$$|\pi'| = k' \in \mathbb{Z}$$

$$\delta \langle \pi' \rangle = \sum_{|J|=|\pi'-1} \sum \text{sgn } \lambda \circ \mu(u_1) \cdot u_1 \cdot \langle \pi'_J \rangle \cdot u_2 +$$

$$\mu(u_1) \in \bar{\chi}^1(JW) \wedge \hat{W}^+$$

$$\mu(u_2) \in \bar{\chi}^1(W^J) \wedge \hat{W}^+$$

$$+ \sum_{|J_1|+|J_2|=|\pi'-2} \sum \text{sgn } \lambda \circ \mu(u_1, u_2) \cdot (-1)^{|J_1|-1} u_1 \langle \pi'_{J_1} \rangle u_2 \langle \pi'_{J_2} \rangle u_3$$

$$|J_1|-1+|J_2|-1=k'-2$$

$$\mu(u_1) \in \bar{\chi}^1(J_1W) \wedge \hat{W}^+$$

$$\mu(u_2) \in \bar{\chi}^1(J_1W^J_2) \wedge \hat{W}^+$$

$$\mu(u_3) \in \bar{\chi}^1(J_2W^1) \wedge \hat{W}^+$$

$$u_i \in F$$

A は $H_p(A) \cong 0$, $H_0(A) \cong \mathbb{Z}[G]$ をみたすかどうかである。これは閉道空間の抽象から得られるものであるが 証明はまだわからない。

特に A_2 の構成について言えば、次のような単純
だが必ずしもそのような問題を考えることに帰する。

W^+ の任意の元 σ は

$$\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \cdots \sigma_{j_\nu} \quad (\text{簡約表示})$$

と書かれるが、この書き方は一意ではない。そこで
別の方法で

$$\sigma = \sigma_{j_1} \sigma_{j_2} \sigma_{j_3} \cdots \sigma_{j_\nu}$$


と書かれた時 $\{i_1, i_2, \dots, i_\nu\}$ から $\{j_1, j_2, \dots, j_\nu\}$

\wedge 操作 $\sigma_j \sigma_{j+1} \sigma_j \rightarrow \sigma_{j+1} \sigma_j \sigma_{j+1}$ のみ
を何度も繰り返して しかも途中で簡約
表示のまま最短変形 する仕方をすべて数え上げる
事。

群 G が 2 個の生成元 σ_1, σ_2 で生成される
自由アベル群の場合、基本関係式 $\sigma_1 \sigma_2 = \sigma_2 \sigma_1$
を用いて、 G の任意の元 σ を σ のひとつの
簡約表示 $\sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_{j_\nu}$ からもうひとつの
 $\sigma_{j_1} \sigma_{j_2} \cdots \sigma_{j_\nu}$ へ変形する方法の数は
 A_2 の構成と本質的に同値で、これが

対称群の既約表現の次元において与えられることが村瀬氏(東大)によって注意された。

一般に トーラス



を図のように直方体分割した場合に自由双対棒構成 A_2, A_3, \dots の具体的な構成については A_3, A_4, \dots については皆目見当がつかない。
 →高次元 Young 図形?

5. 我々の自由双対棒構成

は K.T. Chen 氏 [8] の簡約棒構成の双対概念であり従って空間の開道空間のホモロジーを反映していることは明らかであるが空間が非単連結のときは実際に π_1 になっているかどうかは知られていない (D. Sullivan [9] 参照)。2. で述べた事は $K(\mathbb{Z}, 1)$ のときはその事を保証するかに見える。特に空間 X がモジュライの空間である場合 いろいろの実例で知られているように X

が $K(\mathbb{P}^n, 1)$ になっているように思われる. とすれば

$K(\mathbb{P}^n, 1)$ 性をこの自由双対極構成によつて記述する方法を微分型式を道具にして考えられないかという問題が生ずる.
 今 D を \mathbb{C}^n の原点を含む重みつき斉次多項式の零点で定義される超曲面とし $X = \mathbb{C}^n - D$ とおく. $\Omega^1(w - \log \langle D \rangle)$ を Saito の意味での D の \log 極の有理型式のつくる微分環とする.

[予想] $X = \mathbb{C}^n - D$ が有理的に $K(\mathbb{P}^n, 1)$ (斎藤(恭) [9])

である $\Leftrightarrow \Omega^1(w - \log \langle D \rangle)$ は 0 で自由;
 今 $\Omega^1(w - \log \langle D \rangle)$ が自由としてその基底を $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_\mu$ とおく. このとき

$$d\varphi_i = \frac{1}{2} \sum a_{ij}^{jk} \varphi_j \wedge \varphi_k$$

$(a_{ij}^{jk} \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}^n})$ (構造方程式)

X_i ($1 \leq i \leq \mu$) を C^{∞} -値 正則関数として 方程式 (積分可能条件)

$$d\left(\sum \varphi_i X_i\right) + \left(\sum \varphi_i X_i\right) \wedge \left(\sum \varphi_j X_j\right) = 0$$

を基本関係とする Lie 環を \mathfrak{g} として複素ホロノミー Lie 環と呼んでおく。このとき

$$\nabla: \mathcal{E}(\mathfrak{g}) \otimes \Omega^*(W - \log \langle D \rangle) \rightarrow \mathcal{E}(\mathfrak{g}) \otimes \Omega^*(W - \log \langle D \rangle)$$

$$\omega \longmapsto d\omega + \varphi \wedge \omega$$

$$(\varphi = \sum \varphi_i X_i)$$

において $(\mathcal{E}(\mathfrak{g}) \otimes \Omega^*(W - \log \langle D \rangle), \nabla)$ は複体の構造を帯び、我々の予想は次の通り。

[予想] X が 有理 $K(\mathbb{H}, 1)$ からは

$(\mathcal{E}(\mathfrak{g}) \otimes \Omega^*(W - \log \langle D \rangle), \nabla)$ は 非輪状 であり 逆も成り立つ。★

文献 [1] P.A. Smith The complex of a group relative to a set of generators, Ann. of Math. 54, 371-424 (1951),

[2] D.M. Kan Abstract homotopy III, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 1956, 411,

- [3] K.T. Chen Reduced bar construction on de Rham complexes, *A collection of Papers in Honor of S. Eilenberg*, Acad. Press, 1976, 19-32.
- [4] K. Aomoto On the acyclicity of free cobar constructions, I, II, *Proc. Japan Acad.* Vol. 53 (1977), 35-36, 78-80,
- [5] E. Brieskorn and K. Saito Artin-Gruppen und Coxeter-Gruppen, *Invent. Math.* 17, 245-271 (1972),
- [6] P. Deligne Les immeubles des groupes de tresse généralisés, *Invent. Math.* 17, 273-302 (1972),
- [7] 中村得之 数理研講究録 (1976)
- [8] D. Sullivan Differential forms and the topology of manifolds, *Proc. of the Conference on manifolds, Tokyo, 1973*,
- [9] 香藤・関口・矢野 to appear ;

★ この非輪状は代数多様体の Lefschetz の定理の類似のもので可換環において藤田隆夫氏の基本関係式の系列を与える理論の類似

を追ってみるこれが面白いかもしれない。これに

ついては

[10] 藤田隆夫 Defining equations for
certain types of polarized varieties, A collection
of papers dedicated to K. Kodaira, 1977,
165-173;