

Grzegorczyk hierarchyについて

名古屋大学 波多野祥二

Cobhan[1]とMuchnik[4]はGrzegorczyk hierarchy(see,[3][5])の \mathcal{E}^n がある空間領域制限のTuring machinesの族と一致することを証明した。本論文では時間領域制限のTuring machinesに対応する族 \mathcal{P}^n を定義し、それらが一致することを証明し、それらのhierarchyの構造を調べる。

§ 1. 記号と定義

記号として以下を使用する。

C_* 特性関数が C に含まれる述語の集合

\mathcal{E}^n Grzegorczyk hierarchyの第 n 番のクラス

P 多項式時間内にdeterministic Turing machinesで計算可能な関数族

NP 多項式時間内にnondeterministic Turing machinesで計算可能な関数族

$i \uparrow_j$ $i \uparrow_j (x_1, \dots, x_n) = x_j \quad \text{for } 1 \leq j \leq n \text{ and } n=1, 2, \dots$.

$\theta(x)$ 定数関数 $\theta(x)=0$.

$s(x)$ $s(x)=x+1$.

$Ack(x, y)$ Peter関数

$Ack(0, y) = y+1, Ack(x+1, 0) = Ack(x, 1), Ack(x+1, y+1) = Ack(x, Ack(x+1, y))$

$|x|$ $|x|=x$ を2進展開した長さ

$x\#y$ smash関数 $x\#y=2^{|x|+|y|}$.

Def.1.1 関数 $f(x_0, \dots, x_{n-1})$ が *increasing* とは、すべての $i < n$ に対して、

$a < b \Rightarrow f(x_0, \dots, x_{i-2}, a, x_i, \dots, x_{n-1}) \leq f(x_0, \dots, x_{i-2}, b, x_i, \dots, x_{n-1})$.

Def.1.2 g, h, j を既に定義された関数とする。その時、次に定義されている関数 f を関数 g, h, j から limited recursionによって得られた関数という。

$$f(0, x_1, \dots, x_n) = g(x_1, \dots, x_n)$$

$$f(y+1, x_1, \dots, x_n) = h(y, x_1, \dots, x_n, f(y, x_1, \dots, x_n))$$

$$f(y, x_1, \dots, x_n) \leq j(y, x_1, \dots, x_n)$$

Def.1.3 g, h_1, h_2, j を既に定義された関数とする。その時、次に定義されている関数 f を関数 g, h_1, h_2, j から bounded recursion によって得られた関数という。

$$\begin{aligned} f(0, x_1, \dots, x_n) &= g(x_1, \dots, x_n) \\ f(2y, x_1, \dots, x_n) &= h_1(y, x_1, \dots, x_n, f(y, x_1, \dots, x_n)) \quad \text{for } y > 0 \\ f(2y+1, x_1, \dots, x_n) &= h_2(y, x_1, \dots, x_n, f(y, x_1, \dots, x_n)) \\ f(y, x_1, \dots, x_n) &\leq j(y, x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$

Def.1.4 f_1, \dots, f_n を関数とする。 $C o m(f_1, \dots, f_n)$ を次の条件を満たす最小の関数族 C とする

- 1) $\theta(x), s(x), i \in C, f_1, \dots, f_n \in C$
- 2) $h, g_1, \dots, g_m \in C \Rightarrow h(g_1(x_1, \dots, x_k), \dots, g_m(x_1, \dots, x_k)) \in C$

Def.1.5 $\mathcal{E}(f_1, \dots, f_n)$ を次の条件を満たす最小の関数族 C とする。

- 1) $\theta(x), s(x), i \in C, f_1, \dots, f_n \in C$
- 2) $h, g_1, \dots, g_m \in C \Rightarrow h(g_1(x_1, \dots, x_k), \dots, g_m(x_1, \dots, x_k)) \in C$
- 3) C は limited recursion について閉じている。

Def.1.6 $\mathcal{P}(f_1, \dots, f_n)$ を次の条件を満たす最小の関数族 C とする。

- 1) $\theta(x), 2x, 2x+1, i \in C, f_1, \dots, f_n \in C$
- 2) $h, g_1, \dots, g_m \in C \Rightarrow h(g_1(x_1, \dots, x_k), \dots, g_m(x_1, \dots, x_k)) \in C$
- 3) C は bounded recursion について閉じている。

定義より次の事実がわかる。

Theorem 1.1

$$\mathcal{E}^n = \mathcal{E}(\text{Ack}(n, x), \max(x, y)) \subseteq \mathcal{E}(\text{Ack}(n, x)) \text{ for } n > 2.$$

$$\mathcal{E}^0 = \mathcal{E}(\text{Ack}(0, x)) = \mathcal{E}(\emptyset) \subseteq \mathcal{E}(\max(x, y)).$$

$$\mathcal{E}^1 = \mathcal{E}(\text{Ack}(2, x), \max(x, y)) = \mathcal{E}(x+y) = \mathcal{E}(2x, \max(x, y)) \subseteq \mathcal{E}(2x).$$

$$\mathcal{E}^2 = \mathcal{E}(x \cdot y) = \mathcal{E}(x^2, \max(x, y)) \subseteq \mathcal{E}(x^2)$$

$$\mathcal{E}^3 = \mathcal{E}(\text{Ack}(3, x), \max(x, y)) = \mathcal{E}(2^{x+y}) = \mathcal{E}(2^x, \max(x, y)) \subseteq \mathcal{E}(2^x)$$

□

Def.1.7 $\mathcal{P}^1 = \mathcal{P}(\emptyset)$, $\mathcal{P}^2 = \mathcal{P}(x^2, \max(x, y))$,
 $n > 2$ のとき、 $\mathcal{P}^n = \mathcal{P}((\text{Ack}(n, x), \max(x, y)))$

Def.1.8 C を関数族とする。

$\text{DTTM}(C) = \{f \mid \exists t \in C (f(x_1, \dots, x_n) \text{を } |t(x_1, \dots, x_n)| \text{ステップで計算可能な deterministic Turing machine が存在する。})\}$

$\text{DSTM}(C) = \{f \mid \exists t \in C (f(x_1, \dots, x_n) \text{を } |t(x_1, \dots, x_n)| \text{空間領域で計算可能な deterministic Turing machine が存在する。})\}$

§ 2 \mathcal{E} と \mathcal{P}

Theorem 2.1 $\mathcal{P}^1 \subseteq \mathcal{P}^2 \subseteq \mathcal{P}^3 \subseteq \dots$

$$\mathcal{P}^1_* \subseteq \mathcal{P}^2_* \subseteq \mathcal{P}^3_* \subseteq \dots$$

proof Gregorczyk hierarchyの場合 ($\mathcal{E}^0_* \subseteq \mathcal{E}^1_* \subseteq \mathcal{E}^2_* \subseteq \mathcal{E}^3_* \subseteq \dots$,

$\mathcal{E}^n \subseteq \mathcal{E}^{n+1}$, see [3]) と同様に証明出来る。□

Theorem 2.2 $\mathcal{P}(f_1, \dots, f_n) \subseteq \mathcal{E}(f_1, \dots, f_n, 2x)$

proof $\mathcal{E}(f_1, \dots, f_n, 2x)$ が bounded recursionについて閉じていることを示せばよい。

$g, h_1, h_2, j \in \mathcal{E}(f_1, \dots, f_n, 2x)$ 、 f を g, h_1, h_2, j から bounded recursionによっ

て得られた関数とする。 f' を次の limited recursionによって得られた関数とする。

$$f'(0, y, \vec{x}) = g(\vec{x})$$

$$f'(s+1, y, \vec{x}) = \begin{cases} h_1(q, \vec{x}, f'(s, y, \vec{x})) & \text{if } |y| \geq s+1, y = (2 \cdot q) \cdot 2^{|y|-s-1} + r \\ h_2(q, \vec{x}, f'(s, y, \vec{x})) & \text{if } |y| \geq s+1, y = (2 \cdot q+1) \cdot 2^{|y|-s-1} + r \\ f'(s, y, \vec{x}) & \text{o.w.} \end{cases}$$

$$f'(s, y, \vec{x}) \leq j(y, \vec{x})$$

従って、 $f(y, \vec{x}) = f'(y, y, \vec{x}) \in \mathcal{E}(f_1, \dots, f_n, 2x)$ 。 □

Theorem 2.3 $a(x) \geq 2^x \Rightarrow \mathcal{P}(a, \dots) = \mathcal{E}(a, \dots)$

proof $a \in \mathcal{P}(a, \dots)$ より、 $2^x \in \mathcal{P}(a, \dots)$ 。 $\mathcal{P}(a, \dots)$ が limited recursionについて閉じていることを示す。 $g, h, j \in \mathcal{P}(a, \dots)$ とし、 f が g, h, j から limited recursionによって得られた関数とする。

$$f'(0, \vec{x}) = g(\vec{x})$$

$$f'(2s, \vec{x}) = f'(2s+1, \vec{x}) = h(|s|, \vec{x}, f'(s, \vec{x}))$$

$$f'(s, \vec{x}) \leq j(|s|, \vec{x})$$

$$f(y, \vec{x}) = f'(2^y - 1, \vec{x}) \in \mathcal{P}(a, \dots)$$

□

Theorem 2.4 $f(x) \geq x^2, f \in \text{DSTM}(Com(\max(x, y), f))$ ならば、

$$\mathcal{E}(\max(x, y), f) = \text{DSTM}(Com(\max(x, y), f))$$

proof 假定より、 $\{x^2\} \cup Com(\max(x, y), f) \subseteq \text{DSTM}(Com(\max(x, y), f))$ 。

(\subseteq) $Com(\max(x, y), f)$ が limited recursion について閉じている。

(\supseteq) $g \in Com(\max(x, y), f), h(x) \in |g(x)|$ 空間領域で計算可能な deterministic Turing machine M が存在するとする。 q を M の内部状態の数とする。 $h(x)$ を計算するために、Turing machine M とテープの取り得る状態はたかだか $m \cdot q \cdot g(x)$ である (m は定数である)。すなわち、 M は $m \cdot q \cdot g(x)$ ステップ以内でとまる。よって、bounded recursion を使用して、関数 $h(x)$ を $\mathcal{E}(\max(x, y), f)$ に属するように定義しなおすことが出来る。 □

Cor. 2.1(Ritchie) $\mathcal{E}^2 = \text{DLBA}$ ($= \text{DSTM}(\{\text{多項式}\})$)

□

Theorem 2.5

(a) $f(x) \geq x^2, f \in \text{DTTM}(Com(\max(x, y), f))$ ならば、

$$\mathcal{P}(\max(x, y), f) \supseteq \text{DTTM}(Com(\max(x, y), f))$$

(b) $f(x) \geq x \# y, f \in \text{DTTM}(Com(\max(x, y), f))$ ならば、

$$\mathcal{P}(\max(x, y), f) = \text{DTTM}(Com(\max(x, y), f))$$

proof (a) 明らか。

(b) (\supseteq) (a) より。 (\subseteq) $Com(\max(x, y), f)$ が bounded recursion について閉じていることを示せばよい。

□

Rose[5] は $\mathcal{P}(x \# y)_* = P$ を示した。

Cor. 2.1 $\mathcal{P}(x \# y)_* = P \subseteq N P \subseteq \mathcal{E}(x \# y)_*$

proof theorem 2.3 より、 $\mathcal{P}(x \# y)_* = P \subseteq \mathcal{E}(x \# y)_*$ 。 $\mathcal{E}(x \# y)_*$ は bounded

quantifiersについても閉じている。よって、 $NP \subseteq \mathcal{E}(x \# y)_*$. \square

§ 3 1変数と多変数

Lemma 3.1 f をincreasing関数とし、 $f(x_0, \dots, x_{n-1}) \geq \max(x_0, \dots, x_{n-1})$, " $f(x_0, \dots, x_{n-1}) < y \in \mathcal{E}(f(x, \dots, x))$, $g \in \mathcal{E}(f(x_0, \dots, x_{n-1}))$ "とする。そのとき、次の条件を満たす関数 $g' \in \mathcal{E}(f(x, \dots, x))$, $j \in Com(f(x_0, \dots, x_{n-1}))$ がある。

$$j(x_0, \dots, x_{m-1}) \leq x_m \Rightarrow g'(x_0, \dots, x_{m-1}, x_m) = g(x_0, \dots, x_{m-1}).$$

proof g の構成に関する帰納法で証明出来る。 \square

Theorem 3.1 f をincreasing関数、 $f(x_0, \dots, x_{n-1}) \geq \max(x_0, \dots, x_{n-1})$ 、そして " $f(x_0, \dots, x_{n-1}) < y \in \mathcal{E}(f(x, \dots, x))$ "とする。そのとき、

$$\mathcal{E}(f(x_0, \dots, x_{n-1}))_* = \mathcal{E}(f(x, \dots, x))_*$$

proof (\subseteq) を証明する。 $g \in \mathcal{E}(f(x_0, \dots, x_{n-1}))_*$, g', j をLemma 3で作られた関数とする。

$$g(x_0, \dots, x_{m-1}) = \begin{cases} g'(x_0, \dots, x_{m-1}, j(x_0, \dots, x_0)) \\ \quad \text{if } x_0 \geq x_0, \dots, x_{m-1} \\ \cdots \cdots \cdots \cdots \\ g'(x_0, \dots, x_{m-1}, j(x_i, \dots, x_i)) \\ \quad \text{if } x_i \geq x_0, \dots, x_{m-1} \\ \cdots \cdots \cdots \cdots \\ g'(x_0, \dots, x_{m-1}, j(x_{m-1}, \dots, x_{m-1})) \\ \quad \text{if } x_{m-1} \geq x_0, \dots, x_{m-1} \end{cases}$$

よって、 $g \in \mathcal{E}(f(x, \dots, x))_*$. \square

Cor.3.1 $\mathcal{E}^0_* = \mathcal{E}(\max(x, y))_*$, $\mathcal{E}(2x)_* = \mathcal{E}^1_*$, $\mathcal{E}(x^2)_* = \mathcal{E}^2_*$,

$\mathcal{E}(Ack(n, x))_* = \mathcal{E}^n_*$ for $n > 2$. \square

Gandyは[1]のなかで $\mathcal{E}^0_* = \mathcal{E}(\max(x, y))_*$ と述べている。

Lemma 3.2 関数 f をincreasingとし、 $f(x_0, \dots, x_{n-1}) \geq \max(x_0, \dots, x_{n-1})$, $\exists k \in Com(f(x_0, \dots, x_{n-1})) \exists f' \in \mathcal{P}(f(x, \dots, x))$

$k(x_0, \dots, x_{n-1}) \leq x_n \Rightarrow f'(x_0, \dots, x_{n-1}, x_n) = f(x_0, \dots, x_{n-1}),$
 $g \in P(f(x_0, \dots, x_{n-1}))$ とする。そのとき、
次の条件を満たす関数 $g' \in P(f(x, \dots, x))$, $j \in \text{Com}(f(x_0, \dots, x_{n-1}))$ が存在する。
 $j(x_0, \dots, x_{m-1}) \leq x_m \Rightarrow g'(x_0, \dots, x_{m-1}, x_m) = g(x_0, \dots, x_{m-1}).$

proof g の構成に関する帰納法で証明出来る。 \square

Theorem 3.2 関数 f を increasing とし、 $f(x_0, \dots, x_{n-1}) \geq \max(x_0, \dots, x_{n-1}),$
 $\exists k \in \text{Com}(f(x_0, \dots, x_{n-1})) \exists f' \in P(f(x, \dots, x))$
 $k(x_0, \dots, x_{n-1}) \leq x_n \Rightarrow f'(x_0, \dots, x_{n-1}, x_n) = f(x_0, \dots, x_{n-1}),$

とする。そのとき、

$$P(f(x_0, \dots, x_{n-1}))_* = P(f(x, \dots, x))_*.$$

proof theorem 3.1 と同様に証明出来る。 \square

theorem 3.2 より、ただちに次のことがわかる。

Cor. 3.2 $P(\cdot)_* = P(x+y)_*, P(x^2)_* = P(x \cdot y)_*, P(x\#x)_* = P$ \square

References

- [1] Alen Cobham, "The intrinsic computational difficulty of functions", in:
Y. Bar-Hillel.(ed.) Proceedings of the 1964 International Conference on
Logic, Methodology and the Philosophy of science, North-Holland Publ. Comp.,
Amsterdam 1965, 24-30
- [2] R.O. Gandy, "Some relations between classes of low computational complexity",
Bull. London Math. Soc. 16(1984)127-134.
- [3] Andrzej Grzegorczyk, "Some classes of recursive functions", Rozprawy
Matematyczne(Inst Mat. Polsk. Akad. Nauk.)IV(1953).
- [4] Steven S. Muchnick, "On two approaches to classical recursive functions",
in: Problems in Mathematical Logic [in Russian], Moscow, pp.123-138(1970)
- [5] H. E. Rose, Subrecursion